H.N. 646

H N 646

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT



Jo Fr. van de Velde 1800 643

Digitized by Google

HENR. BERNH. RVPPII

FLORA IENENSIS

SIVE

ENVMERATIO PLANTARVM,

TAM SPONTE CIRCA IENAM, ET IN LOCIS VICINIS NASCENTIVM, QVAM IN HORTIS OBVIARVM, METHODO CONVENIENTE IN CLASSES DISTRIBVTA, FIGVRISQVE RARIORVM AENEIS ORNATA:

IN VSVM

BOTANOPHILORVM IENENSIVM

EDITA

MVLTISQVE IN LOCIS

CORRECTA ET AVCTA.

FRANCOFVRTI & LIPSIAE,
apud ERNESTVM CLAVD. BAILLIAR,
MDCCXXVI.

BIBLIOPOLA
AD
LECTOREM.

Accipe L. B. placida mente & fronte serena Floram Jenensem B. Dn. HENRICI BERNHARDI RVPPII, Giſſenſ. Med. Cult. recenter editam, opuſculum mole quidem parvum,

ſed opera & labore non leve, ſtudioſisque Medicinæ & in ſpecie rei herbariæ amatoribus admodum conducibile, in quo cum jucundo mentis pabulo, non ſolum illas invenies plantas, charactere conveniente, nominibusque recentiorum ac veterum Botanicorum rite deſignatas, quæ circa Jenam ſub diverſo ſolis ſitu, & fere ubique locorum, v. g. ſylvis, montibus, vallibus, dumetis, pratis, piſcinis, vineis, lacubus, agris, locis lapidoſis, aridis, madentibus aliisque copioſe & ſua ſponte proveniunt; ſed etiam exoticas rariores & pretioſiores, tam in horto noſtro Medico & Sereniſſimi Principis, quam aliis Curioſorum viridariis occurrentes; Præter has recenſitas, (ut & hæc non prætermittam) reperies etiam (quan-

(quantum hæ paginulæ conceſſerint) plantas ſub peregrino ſole creſcentes, quas hujus Floræ Jen. Autor, ad res botanicas quaſi natus, non ſine magnis impenſis, multoque labore & induſtria indefeſſa Gieſſæ, Lipſiæ, Halæ, Vittenbergæ, Lugd. Batav. conquiſivit, illarumque loca nativa, & ante omnia florum characterem, ſecundum methodum hodiernorum Botanicorum exploravit, & in hoc Codice botanico candide Tibi tradidit, ut ita hicce libellus non ſolum Botanophilis Jenenſibus, ſed & dictis in locis vicinis viventibus uſui eſſe poſſit. Et licet adhuc plures plantarum ſpecies in excurſionibus botanicis interdum inveniantur, quæ non extant in hiſce pagellis, tamen nullus putabit, illas à nobis ex

aliqua negligentia prætermiſſus eſſe. Nam nullas ſi quis omittere velit, quas terra Jenenſis alit, illum certe oportet, præ aliis requiſitis, & pedibus & animo bene valere. Hærebam quidem primo, non ſine ratione, an hocce opuſculum levidenſe iterum mereatur lucem publicam; quoniam autem per duos annos (& quod excurrit) à Philobotanis verno præſertim & æſtivo tempore multoties deſideratum fuit, me tandem B. C. D. ad hujus editionem novam accinxi, & licet ex nimia feſtinatione, propter temporis anguſtiam, & inſtantes nundinas Lipſienſes paſchales mendæ quædam irrepſerint, cum errare humanum, nihilominus a Te veniam me impetraturum, minime dubito. Miraberis quidem, quando obſerva-

bis

bis, Supplementum & Præfationem prioris editionis in hac omiſſa, ob quales autem rationes Autor ipſe hæc ita voluerit & juſſerit, mihi plane incognitum eſt. Hoc quidem notiſſimum, illi non fuiſſe mentem, ut talis libellus, quem manu propria conſcripſit, & ad alium divendidit, typis deſcribatur; hoc autem facto & quidem contra ejus voluntatem, autor librum hunc perlegendo & omnia rite examinando, permulta permulta vitia & fere innumera errata typographica inuenit, quæ ſucceſſu temporis ſedulo correxit, & plantas omiſſas numero 285. ad ſua genera & Claſſes adſcripſit. Itaque omnia hæc additamenta, Autoris labores eſſe nemo negabit. Et hæc ſint & ſufficiant, quæ præfationis

nis loco monere volui ac debui. Hinc contractis velis noſtrorum laborum eos, qui aliquid detexerint, quod in hiſce pagellis vel omiſſum vel minus recte ſcriptum dictumve fuerit, amice rogamus, id pro ſuo candore, absque livore colligant nobisque indicent. Tu vero, candide & botanophile Lector, noſtris conatibus fave.

Tabula br ordinem.



CLASSIS I.

DE

PLANTIS FLORE REGVLARI MONOPETALO GAVDENTIBVS.

I. Semine nudo unico.

PRimo plantas flore regulari monopetalo ſemine nudo unico donatas aggredimur, quarum his noſtris in oris nulla facile ſponte naſcens occurrit, in hortis vero frequens eſt.

MIRABILIS Rivini; jalappa Tournefort. Solanum Mexicanum flore magno C. B. P. p. 168. Wunder-Blume. Flores ipſius campaniformes, & ſpecioſi, purpurei, ſeu kermeſini coloris, lateritii, flavi aut pallentes, obſolete rubentes, exalbidi, binis coloribus ex purpureo & luteo mixtis; ſic ex rubro, luteo, albo, in uno flore magna varietas: nonnunquam albo & purpureo ſimul dimidiatim in eodem flore tingitur: ſive inæqualibus vel latis, vel minutis maculis purpureis, tam punctatim, quam virgatim album colorem intercurrentibus, quandoque radiis flavis per longitudinem flores diſtinguentibus, ut recte annotavit C. B. in Pinace. Vid. etiam Car. Cluſ. Pan. & Tournefortius in Inſtitut. qui duplicem calicem huic plantæ generi attribuit, ſed male: embryo enim eſt, quod pro altero calice accepit Clariſſimus auctor, qui non abis in aliud, quam quod ante fuit, uti recte loquitur J. Rajus. Quomodo enim calicis nomen competere poteſt

embryoni, cui flos insidet, adeoque male iridis, gladioli, leucoji, &c. embryonem pro calice venditat Tournef. siquidem hi flores evidenter sunt nudi. Recte vero pro jalappa habuit hanc plantam Tournefort; uti non solum avtoptes Lignonius, sed & figura & virtus radicis nobis persuadent. Quicquid alii dicunt, qui Jalappam pro specie convolvuli in re herbaria incogniti divenditant, vid. Sam. Dale & Carolus Plumerius, nec non Nicol. Pechlini Observationes. Radix in terra relicta, per brumæ rigores corrumpitur; si vero eximatur & reponatur, permanet, uti jam olim annotavit C. Clusius; compendiosius tamen propagatur per semina, quæ copiose suppeditat. Notabilis præterea est salis ad ramorum nodos propullulatio, ut & ramulorum decidentia successiva; in hortis, ceu dictum frequens floret Junio, & inde in bruman usque; natale vero solum est Mexicana, Americæ regio.

II. Seminibus nudis gemellis.

GALLIVM Luteum C. B. in pratis præcipue subudis, v. g. in der Ziske bey Cospida, nach Wintzerla und Ziegenhayn hin; variat quandoque latioribus foliis, præcipue in pratis uliginosis nach Sultze zu, quod Gallium luteum palustre dici posset, cujus flores longe pallidiores sunt, quam vulgaris angustifolii flores. Hæc planta est verum Gallium veterum, v. g. Dioscoridis. Est planta hypnotica, & quodammodo soporifera. vid. Borrichius, qui inde destillavit aquam acidam, lac coagulantem, unde nomen hujus plantæ ἀπὸ τῦ γαλακτὸς h. e. lacte, quod coagulat, derivatum. Floret æstate locis prædictis. Germ. Meyer-Kraut, Lab-Kraut, unser Frauen Bett-Stroh, Wald-Stroh.

GALLIVM album latifolium sylvaticum. Mollugo montana, latifolia ramosa, C. B. P. p. 334. Matrisylvæ secunda Tragi. Nam hodiernum, pessimo errore in officinis nostris pro vera matrisylva s. hepatica stellata, quæ nobis asperula sylvatica audit, divenditur, quamvis virtutibus & odore analeptico, matrisylvæ plane non accedat

cedat; in montibus ſylvoſis & convallibus frequens v. g. im Rauhenthale; floret Majo & Junio.

GALLIVM album, latifolium pratenſe. Mollugo montana, anguſtifolia l. gallium album, latiſolium C. B. P. p. 334. mollugo prima Dodonæi & Tabernæ Montani; mollugo vulgatior herbariorum Lobelii, in pratis & ad ſepes paſſim glabra & molli lanugine obſita variat, floretque Junio & Julio.

GALLIVM album, ſupinum, multicaule in apricis, aſperis, declivibus montibus fonti Principis vulgo dicto oppoſitis (gegen den Fürſten-Brunnen über, in denen Hecken und Püſchen des abgehauenen Waldes) wie auch auf den Forſt, frequens eſt cauliculis per terram ſparſis circumquaque, in quo folia ſtellatim diſpoſita anguſta, perque caulis non recte per medium tranſit, ſed in alterum latus tanquam ſupinus declinat, in ſummitate cauliculorum panicula florum alborum, parvorum, quibus ſuccedunt ſemina nuda, gemella, rotunda, lævia, parva per maturitatem nigricantia; loco prædicto floret Junio & Julio; Hæc planta, quod noverim, nondum eſt exacte deſcripta: Meminit tamen ejusdem Joh. Rajus in hiſt. Plantarum univerſali, an autem ſit eadem planta, valde hæſito.

GALLIVM montanum altiſſimum, foliis anguſtis, albicantibus. Rubia montana, anguſtifolia C. B. Rubia ſylvatica longioribus & anguſtioribus foliis Geſneri in Libro Hortorum Germaniæ vid. Deſcriptio in C. B. Prodromo p. 145. Hæc planta florem habet à reliquis Galliis quadantenus diverſum: ſi quid ſit minus planus ipſius flos, quamvis ſemina ſic ſatis conveniant cum ſeminibus Gallii. In aſperis & apricis, v. g. auf dem Fuchs-Berge und auf dem Forſt. Floret Majo & Junio.

CRVCIATA hirſuta C. B. cruciata herniaria Thalio, quia in herniosis rupturis ſolidandis admodum præſtans habetur; in dumetis & ad ſepes forne im Cluſewitzer Holtze, it. am Kullmsdorffiſchen Wege floret Majo Germ. Gülden Waldmeiſter, gelb Creutz-Kraut, gülden Wald-Meiſter, rauch Meyer-Kraut.

APARINE ſemine coriandri ſaccharati. Park. Theatr. Botan. Lond. In hortis floret cum vulgari.

APARINE vulgaris C. B. P. p 334. Aparine Dioſcoridis & Matthioli. Aparine aſpera Thalii; Ad ſepes paſſim floret Majo & Junio. Tota planta eſt aſpera & veſtium tenax, unde quibusdam cum Plinio Philanthropus dicitur. Communiter, ceu dictum, aſpera habet ſemina & lappacea, occurrit tamen mihi aliquando in agris prope Erffurtum ſeminibus plane glabris. In agris vero noſtris montoſis & aſperis, ubique occurrit ſeminibus minus aſperis, majoribus & teſticulatis, ſupina & per terram ſtrata, cujus mentionem fecit J. Rajus in Hiſtor. Plant. Klebkraut, Zaunreiß, Klebrich.

ASPERVLA ſylvatica. Aſperula ſ. rubeola montana, odora C. B. Matriſylva & hepatica officinarum. vid. Dale Pharm. p. 201. No. V. Germ. Waldmeiſter, Stern-Leber-Kraut. In Thuringia rarior fere eſt, v. g. bey Tautenburg und Städtgen Rotha. In ſylvis Haſſiæ autem frequentiſſima, & vulgo cereviſiæ Majali injicitur; floret Majo; hujus loco, ceu dictum, Officinæ male ſubſtituunt Molluginem montanam, latifoliam, ramoſam, quam ſuperius ad Gallium retulimus. Waldmeiſter.

ASPERVLA lævior acuto quaterno folio. Rubia pratenſis lævis, acuto folio C. B. P. & Prodr. p. 145. Rubia erecta, quadrifolia J. B. apud Chabræum in Sciagraph. ſtirpium p. 546. paſſim in montoſis & apricis, v. g. auf der Wellmeſe und auf den Forſt floret Junio & Julio, flores habet tubuloſos & ſemina ſub aſpera rotundaque, quapropter ad aſperulas referre, nullus dubitavi.

ASPERVLA quadrifolia, paluſtris. Gallium paluſtre, album C. B. in foſſis & ſcrobibus pratisque uliginoſis frequens v. gr. in des Paradieſes Graben, ſo an denen Gärten her gehet, floret Junio; Et hæc planta aſperulæ genuina eſt ſpecies, teſte flore & fructu.

ASPERVLA alpina, quadrifolia. Rubia quadrifolia, ſemine duplici, hiſpido. J. B. apud Chabræum p. 547. Rubia quadrifolia, rotunda, lævis C. B. Prodr. p. 145. In montibus hinter Wagen und Kleinen, nach Schlefreiſſen zu.

ju, aliquando etiam obſervavi prope fortalitium Saxonum Königſtein vulgo dictum, frequentiſſimam. Floret Junio & Julio.

ASPERVLA cœrulea, arvenſis C. B. Pin. p. 334. Rubia cœrulea, erectior, elatiorve J. B. apud Chabræum p. 547. in agris montoſis, aſperis bey dem Rauhenthale und über Ziegenhayn, & alibi floret Junio & Julio. Flores habet tubuloſos, cœruleos, circa imum hirſutos, uti recte annotavit J. Bauhinus.

ASPERVLA hexaphyllos, purpurea C. B. P. p. 334. Rubia parva, flore cœruleo, cauliculos per terram ſpargens J. B. apud Chabræum p. 547. In agris paſſim floret Junio & Julio. Hujus plantæ ſemen aliquantulum recedit a reliquarum aſperularum ſeminibus; Nam, uti recte annotavit J. B. vaſcula fert exigua, gemina, cohærentia, nonnihil oblonga & in ſummo digitata, in quibus ſemen fulvum, altera parte gibbum, altera planum, ſi itaque quiſpiam ad ſequens rubeolæ genus referre maluerit, non repugnabo. Ab hac non differt Rubeola arvenſis, cœrulea, repens C. B. in Prodromo p. 145. qui itaque hanc plantam bis poſuit.

RVBEOLA Tournefortii. Rubia cynanchica J. B. apud Chabr. p. 548. J. Rajus in Methodo plantar. emendata & aucta p. 55. C. B. Pin. p. 333. Gallium album, minus ejusdem & Tabernæmont. uti figuras conferenti patebit, adeoque & hanc plantam C. B. bis propoſuit; In aſperis, apricis, montoſis paſſim floret Junio, Julio & Auguſto v. g. auf dem Fuchs-Berge, ubi floribus albis & purpuraſcentibus, nec non ex albo & purpureo eleganter mixtis variat. Semina habet oblonga, glabra, reniformia. Hujus generis plantas Rajus ſtellatas appellat, propter folia communiter ſtellatim diſpoſita; præſtat vero a flore & fructu notas characteriſticas deſumere, quam ad folia reſpicere Dantur enim adhuc aliæ plantæ ſtellatim diſpoſita habentes folia, quæ tamen ab his, flore & fructu ſatis longe recedunt.

III. Seminibus nudis quaternis.

Cum plantæ flore regulari monopetalo & ſeminibus nudis ternis hactenus nondum innotuerint, vel ſaltim apud nos non proveniant, tranſeo ad gymnotetra ſpermas, quas Rajus pariter a foliorum ſcabritie Aſperifolias appellavit.

CONSOLIDA Rivini. Symphytum Tournefortii. συμφυτὸν μέγα Dioſcoridis. Conſolida major, ſive Symphytum majus offic. Schwartzwurtz und Wallwurtz Germ. noſtra flore eſt albido; in pratis & ad ſcrobes, v. g. im Paradieſe, ſed circa Lipſiam & Wittebergam in pratis frequens pariter eſt purpureo, & purpurro-cœruleo flore, unde & horto noſtro medico illata eſt, & floret cum vulgari plerumque Majo & Junio. Reliquæ conſolidæ officinarum, v. g. media, minor, minima, regularis, ſaracenica, &c. alibi loco convenienti recenſebuntur. Hæc radix deprehenditur tuberoſa, cujus nitida figura vid. in Car. Cluſ. Hiſt. plant. rariorum. vid. etiam Tournef. qui recte annumeravit anchuſas huic plantæ. Germ. etiam audit Beinwelle.

CERINTHE quorundam major, verſicolore flore J. B. 3. pag. 602. Cerinthe ſ. cynogloſſum montanum majus C. B. Pin. p. 258. in hortis floret æſtate, e. g. Ser. Princip. & Medico.

CERINTHE quorundam major, ſpinoſo folio, flavo flore J. B. 3. p. 602. Cerinthe flavo flore, aſperior C. B. Pin. p. 258. cum præcedente.

CERINTHE flore ex rubro purpuraſcente C. B. Cerinthe 3. Cluſii hiſtor. plant. cum præcedente.

CERINTHE minor C. B. P. p. 258. Cerinthe ſecunda Cluſii Hiſpan. hiſt. minor, ſeu quarta eidem in Hiſtor Plantar. rarior; ad ſepes zwiſchen Kunitz und Cullmsdorff, auch weiter an allen Hecken. Floret Julio.

PVLMONARIA folio non maculoſo, ſive 2da Cluſii Hiſt. Plant. Floribus eſt communiter cœruleo-rubentibus, rarius albis; cujus folia maculis autem notantur, uti in hortis paſſim occurrit, Pulmonaria maculoſa officinarum

rum audit. Hæcque planta differt à vulgari ſylvatica, non ſolum foliorum maculis frequentioribus, ſed & foliorum maculatorum ſpecioſa latitudine; errant itaque, qui ſtatuunt has differentias eſſe minime ſpecificas. C. Bauhino vero ſymphytum maculoſum, ſive pulmonaria latifolia in Pin. p. 259. dicitur. In nemoribus frequens v. g. im Rauhenthale floret Martio & Aprili. Lungen-Kraut, fleckigt Lungen-Kraut, Hirſch-Mangollt, blaue Schlüſſel-Blumen.

PVLMONARIA flore albo, im rauhen Thale, und bey Brieſſenitz cum vulgari, ſed raro occurrit.

PVLMONARIA anguſtifolia, flore cœruleo. Symphytum maculoſum, ſive Pulmonaria anguſtifolia, cœrulea C. B. P. Pulmonaria anguſtifolia, cœruleo flore, vel 2da Cluſii Pannon. auf dem Forſt floret Majo & Aprili, und zwar bey den Stein-Kauten in den ſo genandten Tatzen. Naſcitur pariter copioſiſſima in ſylvis juxta Halam Saxonum, & inſpecie in ſylva, quæ illis dicitur die Heyde und Laub-Froſch.

MTOSOTIS paluſtris major. Echium ſcorpioides paluſtre C. B. p. 254. ubi rectè peculiari capite de hac planta agit ſub nomine auriculæ muris, male vero Tournefortius Lithoſpermis admiſcuit, cum non ſolum florum diſpoſitione in ſummis ramulis inſtar heliotropii reflexis, ſed & perianthii & ſeminum conformatione ab iisdem recedat. In locis uliginoſis & ad ſcrobes & ad foſſas paſſim floret Majo & Junio. Germ. Vergieß mein nicht.

MTOSOTIS paluſtris, major, fl. albo. Lithoſpermum paluſtre, minus, fl. albo Tourn. Echium ſcorpioides paluſtre, flore niveo C. B. Pin. p. 254. cum præcedente, v. gr. auf der Walthers-Wieſe.

MTOSOTIS ſylvatica, præcox, latifolia, hiſpida. In ſylva prope Kluſewitz floret Aprili & Majo; Hujus mentio fit in Flora Pruſſica quaſi modo genita, quam Breynius junior edidit. Hanc forſan intellexit C. B. in Pinace, dum dicit echium ſcorpioides arvenſe variare magnitudine, & aliquando vulgato quadruplo majus eſſe, & hiſpidius.

MTOSOTIS minor, arvenſis. Echium ſcorpioides arvenſe C. B. P. p. 254. in agris & cultis paſſim floret Aprili & Majo. Hujus floris umbilicus eſt luteus, & aliquando in agris aridis & lapidoſis occurrit flore fere toto luteo, v. gr. bey der neuen Schencke hinter Lobada, quod Echium ſcorpioides minus floſculis luteis C. B. in prodromo appellat.

LITHOSPERMVM minus, repens, latifolium, C. B. P. p. 258. Lithoſpermum virgatum Thalii. Lithoſpermum repens, majus Cluſii Pannon. & Hiſtor. ubi nitida hujus extat figura; In montibus frequens v. g. auf dem Kunitzer-Berge und im Coſpidaiſchen Holtze, floret Majo; ſemina maturat Auguſto, quæ tota hyeme virgis ipſius exaridis in vepribus adhærent ordinario quaterna, ſæpe tamen unum alterumve deficit. Hujus plantæ ſummi caules ad terram ſe reclinantes, radices agunt, inſtar flagellorum piloſellæ; quod eſt inter plantas rarius contingens, niſi forſan Gramen in horto Malabarico recenſitum ſimul excipias; immerito vero aliqui cum C. B. ad echium vel anchuſas referri poſſe judicant, cum lithoſpermi genuina ſit ſpecies, uti vel ſola ſemina lapidea, ſplendentia, figuræ ovalis, & flos in quinque ſegmenta ſubrotunda expanſus nos docere poteſt. Stein-Saame, Strin-Hirſe.

LITHOSPERMVM majus, erectum C. B. P. in horto Medico, & Sereniſſ. Principis floret Majo & Junio; hujus flores ſunt albicantes, præcedentis vero purpureo-cœrulei. Officinæ hujus ſemen milium ſolis appellant, cum potius milium ſoler dicere debuiſſent, a loco in quo Arabes legebant lithoſpermum, nempe montibus Soler, uti teſtatur Georgius a Turre p. 466. & ex eo P. Ammannus in Charact. Plantar. p. 476. Spontaneum deprehendi bey Kloſter-Lütſchen in Saxonia inferiori vid. C. B. In Catalogo Plant. circa Baſilæam provenientium.

ASPERVGO Tournefortii. Bugloſſum ſylveſtre, caulibus procumbentibus C. B. P. Cynogloſſa forte topiaria Plinio, Echium lappulatum quibusdam J. B. apud Chabræum p. 520. vid. & F. Columna in Ecphraſi plant. rari-

or.

or. ubi καρποχνοτόφορα cognominat, nempe a figura perianthii; habet enim perianthium compreſſum, triquetrum, dentatum, bivalve, ad foliorum ternorum vel quaternorum ſimul naſcentium alas, in quo ſemina quaterna, parva, compreſſa, fuſca, ſeſamoidea. Nonniſi floris colore ab hoc differre videtur minor & tenerior hujus ſpecies, quam Menzelius in Pugillo Tab. VII. exhibuit; & bugloſſum caulibus procumbentibus, tenerius, floribus albis, vocavit; ad murum portæ quam vocant S. Johannis, & ad ſæpes bey Zwetzen und alten Berge Majo & Jun. floret.

BVGLOSSVM auguſtifolium, majus C. B. P. p. 256. Bugloſſum officinarum noſtrarum; floris color cæruleus, albus, rubeus, interdum variegatus: folia modo latiora, modo anguſtiora ſunt, uti bene obſervavit C B. P. in pratis paſſim, v. g. auf der Inſul, auf den Wieſen nach Lobſtädt zu, floret Majo & Junio. Germ. Ochſen-Zunge.

BVGLOSSVM latifolium, ſemper virens C. B. Bugloſſum fol. Borraginis Hiſpanicum J. B. in hortis floret cum præcedente.

CYNOGLOSSVM majus, vulgare C. B. P. p. 257. Cynogloſſum & Cynogloſſa officinarum; Germanis Hundes-Zunge. Hoc primo anno ſine caule reperitur, quod tamen a caulifero non diverſum; hinc duæ figuræ apud Matthiolum, Lobelium, Dodonæum, qui ad mentem Dioſcoridis, qui cynogloſſæ florem negaverat, hanc plantam effinxerunt. Rarius flore occurrit albo, rariſſime flore ex albo & puniceo variegato; ad vias & ſepes paſſim floret Majo & Junio. Hunds-Zunge.

PAPPVLA Rivini, Lappula ruſticorum: Lugdunenſ. Cynogloſſum minus C. B. P. & J. B. Cujus figura & deſcriptio non concordant. Plantæ hujus ſemina a ſeminibus veri cynogloſſi plane differunt, uti conferenti patebit, nec concordant cum ſeminibus bugloſſi, unde male a Tournefortio ad Bugloſſum refertur; Satius itaque eſt peculiare plantæ genus ex hac conſtituere, quam alie-

nis generibus admiſcere; ad ſepes & in muris paſſim floret Junio & Julio.

LAPPVLA fl. albo cum præcedente, ſed rarius. Nam ſolis æſtibus ex agitata, tantummodo vel quaſi flore albo occurrit, ſed vix ac ne vix quidem differt a fulgatiſſima.

OMPHALODES Tourneſortii: Linum umbilicatum J. Raji in methodo plant. emendata & aucta, ut & Parkinſoni; hoc quidam ad bugloſſum, alii ad cynogloſſum retulerunt, ſed neutri accenſeri pote ſt; In horto Sereniſſ. Principis floret Majo & Junio.

OMPHALODES pumila, verna, ſymphyti folio Tourneſortii. Symphytum minus, borraginis facie C. B. P. p. 259. Symphytum pumilum, repens, borraginis facie Lobelii: In hortis variis frequens floret Martio & Aprili. Semina raro maturantur, ſunt tamen præcedentis ſeminibus ſimillima, ſed longe minora.

BORRAGO officin. Bugloſſum latifolium, Borrago C. B P. p. 256. Bugloſſum forte Dioſcoridis; In hortis variorum frequens floret Junio & Julio, flore cœruleo & albo variat. Germ. Borragen, Borretſch.

IV. Seminibus nudis plurimis.

MALVA ſylveſtris, folio rotundo C. B. P. pag. 314. Malva ſylveſtris minor Tabernæm. variat foliis rotundioribus & latioribus; Ad ſepes & ad vias paſſim floret Junio. Pappeln, Pappel-Kraut, Roß-Pappeln.

MALVA ſylveſtris folio ſinuato C. B. P. Malva ſylveſtris major Tab. cum præcedente; aliquando flore albo variat. Haſen-Pappeln.

Huic multum ſimilis MALVA MAVRITIANA dicta, foliis variis Bauhini, flore ruberrimo Hoffmanni in Flora Altorffina, quæ familiaris hortis noſtris eſt, & floret Junio Julio & Auguſto, quin in brumam usque. Videtur vero Hoffmannus confuſus eſſe in nominibus harum duarum malvarum, ſiquidem malva illa Mauritiana flore ruberrimo non ſit malva folio vario C. B. ſed malva folio ficus ejusd. in Prodromo p. 137. ut deſcriptionem, figuram, & plantas ipſas conferenti patebit. Mauritianæ

ritianæ enim huic noſtræ malvæ folia revera ſunt nigricantia, aſpera & craſſa; præterea ad amuſſim quadrat, quod habeat ſcapum ſive caulem ſimplicem aliquot cubitorum. Quamvis vero florem & ſemen Bauhinus non viderit, ſatis tamen ex his dictis apparet, quod Mauritiana malva flore ruberrimo ſit malva folio ficus, non vero malva folio vario C. B. cui poſteriori folia nonnihil lanuginoſa & flores purpuraſcentes, ſtaminibus in umbilico pallidis, & ſemen in capitulis foliaceis ſemicirculare, caulemque cubitalem in plures ramos brachiatum tribuit Bauhinus l. c. quæ omnia ad amuſſim quadrant malvæ in hortis noſtris pariter quandoque obviæ, quam J. B. malvam ſtellatam appellavit, & quæ ſemina ſub umbone quodam foliaceo quaſi recondita gerit, quamque forſan Hoffmannus loc. cit. intellexit ſub nomine malvæ mauritianæ, foliis variis flore incarnato pallido; tales enim ſunt revera hujus elegantioris malvæ flores, quæ æſtate floret cum præcedentibus. Eadem fruteſcit in horto Altenbergenſi.

MALVA criſpa ſive laciniosa, flore dilute purpureo J. B. apud Chabræum p. 299. Malva criſpa ſive meſenterica vulgo, quia fimbriatum menſenterii ambitum folia criſpa pulchrè referunt. In hortis floret Junio & Julio; quandoque & inter hortorum rejectamenta vegetat; flores habet parvos & copioſos, veluti verticillatim diſpoſitos.

MALVA arborea, veneta dicta, parvo flore, C. B. P. p. 315. Flos eſt cœruleus, nec multo major quam malvæ equinæ flos, annotante C. B. ſemina nuda communiter quina poſt ſingulum florem gerit, Junio & Julio.

MALVA roſea folio ſubrotundo. C. B. P. p. 315. malva roſea offic. Germ. Stock-Roſen, Mund-Roſen; flores ſunt candidi, rubentes, modo ſaturatiùs, modo dilutiùs, alias purpuræ modo relucentes, ex rubro nigricantes, hinc tres figuræ in horto Eyſtettenſi, & in hortis aliis paſſim Junio & Julio floret.

MALVA roſea, folio ſubrotundo, flore pleno C. B. cum præcedente frequens occurrit. Flos pariter colore variat,

variat albo, incarnato, rubro, puniceo, nigricante, non ſecus ac ſimplicis; floret cum præcedente.

MALVA paluſtris, mollis & incana P. Herman. Althæa Dioſcoridis & Plinii C. B. P. p. 315. Althæa offic. in hortis colitur. Spontanea vero provenit bey Halle und Wittenberg nach Roßla hin, ad ſcrobes, fl. Jul. & Aug. Wie auch an der Saltzigen See bey Gulßdorff und der Unſtruth bey Laucha, it. nach Erdeborn hin, ubi ſimul naſcitur murrubium anguſtifolium peregrinum, verſus Patriam B. Lutheri Islebiam, in quo itinere copioſum pariter deprehendi raphaniſtroides Chriſt. Knauthii, nec non Otites Tabern. ſive Seſamoides Salmanticum majus. C. Cluſ. hiſt. Plantarum per Hiſp. naſcentium p. 344.

MALVA paluſtris, mollis & incana, laciniato folio. Althæa laciniato folio C. B. P. p. 316. & Cluſ. Pan. pag. 502. cum præcedente.

MALVA montana mollis & incana, flore majore. Althæa flore majore C. B. P. p. 316. Althæa pannonica II. Cluſ. Pannon. Althæa Thuringiaca Camer. Eyſtett. In montoſis ad ſepes nach Sultze und Eckards-Berge zu floret Julio & Auguſto.

MALVA fruteſcens, folio rotundiore, incano. Althæa fruteſcens, folio rotundiore incano C. B. P. Althæa frutex Cluſii Hiſp. in horto Medico floret Julio.

MALVA ſylveſtris, altiſſima, folio cannabino, flore amplo. Alcea vulgaris major C. B. P. p. 316. Alcea officinarum Siegmarswurtz, oder Fellriß Germanis, quod pannos oculorum diſcutiat; ad ſepes præcipue in aſperis v. g. zwiſchen Coſpida und Cluſewitz in agrorum & vinearum marginibus, auch bey Wage floret Julio & Auguſto. Eadem flore albo cum præcedente inveni, ſed rarius. In horto Medico.

ALCEA folio rotundo, laciniato. C. B. Pin. Malva montana ſ. alcea rotundifolia laciniata Columni Part. 1. p. 148. In ruderatis bey Gießen, hinter den Dießberg, um die alten Eiſen-Hämmer ꝛc. floret cum præcedente.

V. Semi-

V. Seminibus tectis capſula.

Tranſimus nunc ad plantas flore regulari monopetalo, quæ ſemina non nuda, ſed tecta gerunt. Teguntur vero vel capſula ſicca, vel cortice molli, qui, ſi minor, bacca, ſi vero major, pomum commode dici poteſt, quamvis termini inter pomum & baccam non adeo ſint definiti. Prius igitur diſponendæ ſunt illæ, quæ fructu gaudent ſicco, ſive capſula, & quidem

(1) SIMPLICI, ſive nullis loculamentis ſeptisve interius diſcreta.

ANDROSACE vulgaris, latifolia, annua Tournefort. Androſacee altera Camerar. Epit. Matth. p. 400. in hortis Curioſorum aliquando occurrit, floretque Jun. & Jul. iſt häuffig wild in aruis zwiſchen Mäyntz und Oppenheim.

PRIMVLA veris major, floribus luteis, odoratis Dodon. Primula veris flavo flore elatior Cluſ. hiſt. Verbaſculum pratenſe odoratum C. B. P. p. 241. Primula veris Matthioli & officin. Arthritica Geſn. In pratis ſiccioribus frequens v. g. wo man nach Löbſtädt gehet, floret Martio & Aprili. Hujus radicem aniſum ſpirare docet Nebelius in Diſſertat. de plantis vernis Marpurgi habita. Germ. Schlüſſel-Blumen, Himmels-Schlüſſel.

PRIMVLA PRATENSIS inodora, luteo-pallida Lobelii; Primula veris pallido flore elatior Cluſ. Hiſtor. Verbaſculum pratenſe, vel ſylvaticum, inodorum, C. B. P. p. 241. In pratis & ſylvis v. g. im rauhen Thal ꝛc. floret cum præcedente, a qua floribus pallidioribus & majoribus, nec non odore longe remiſſiore facile diſtinguitur.

PRIMVLA veris hortenſis, perianthio colorato floris æmulo. Verbaſculum proliferum C. B. P. p. 242. Primula veris flore gemino altero alteri innato Lobel. Lugd. Primula veris prolifera Tabernæm. Sed falluntur hi viri egregie, quia non eſt prolifera, ſed ſaltim perianthio colorato & inſtar floris expanſo cingitur floris ipſius tubus, alias flos eſſet nudus, quod primulæ characteri repugnat, & præterea rugæ hujus exterioris tubi perianthium eſſe

esse satis indicant; In hortis frequens varie ludit, floretque Martio & Aprili non secus ac

PRIMVLA veris Constantinopolitana Cornuti s. Carchichec Turcarum, quæ flores modo solitarios, modo plures in singuli caulículi summitate gerit carneo-purpureos, vel etiam albos, perianthio pariter colorato, amplô, & florem mentiente cinctos. J. B.

AVRICVLA ursi flore luteo. Sanicula alpina lutea C. B. P. Auricula ursi prima, vel luteo flore Clus. Pannon. p. 344. In hortis variorum floret Martio & Aprili, foliis & floribus mirum in modum variat, uti recte observavit C. B. Germ. Bären-Oehrlein, Berg-Schlüssel-Blumen.

AVRICVLA ursi, flore purpureo Lobelii in Icon. Sanicula Alpina purpurea C. B. Auricula ursi 2da Clus. Pan. p. 346. flore est purpurascente, rubescente sanguinis modo & atro colore, uti recte annotavit C. B. In hortis cum præcedente. Has duas auriculas recensuisse sufficiat, tanquam magis obvias; qui vero plures species insigniter quotidie variantes nosse desiderat, hortos adeat, præcipue Celeberr. Deckeri in Batavia, qui magnam hujus floris non sine voluptate colit varietatem.

AMARANTHOIDES Indicum monospermon, foliis ocymastri, capitulis purpureis Part. Bot. Prodr. fl. in horto Seren. Princ. Aug. & Septembr.

NVMMVLARIA erecta Rivini Lysimachia lutea major, quæ Dioscoridis; C. B. P. p. 245. Lysimachia Matthioli & officinarum; foliis nunc ternis nunc quaternis nunc binis reperitur, ex quibus Tournefort. diversas species efficit. Ad fluviorum ripas & scrobes bey Wenigen-Jena, und wo man nach Cunitz gehet, floret Julio & Augusto.

NVMMVLARIA supina, sive nummularia officin. Nummularia major lutea C. B. P. p. 309. In pratis & ad scrobes passim serpit: Floret Junio & Julio. Germ. Wiesen-Geld, Egel-Kraut, Pfennig-Kraut.

ANAGALLIS flore phœniceo C. B. P. p. 252. Anagallis mas Dioscoridis & Matthioli. Variat floris colore, communiter est phœniceo, est & purpurascente, sive obso-

obſolete purpureo, cui phœniceum quippiam permiſtum conſpicitur, monente Cluſio in Hiſt. ubi ipſius figuram exhibet; Et hæc aliquando in agris, v. gr. bey Wittenberg nach Teichel zu, ſæpius vero in horto Medico occurrit; variat non ſecus ac ſequens foliis ternis. Germ. Gauch-Heil, Grund-Heil, Heil aller Welt.

ANAGALLIS cœruleo flore C. B. P. p. 252. Anagallis fœmina Dioſcoridis & Matthioli. Anagallis cærulea fœmina Lob. & Cluſ. Hiſt. cum præcedente. In agris & cultis paſſim cum præcedente floret Majo, Junio & Julio.

ANAGALLIS LVTEA nemorum C. B. P. p. 252. Anagallis luteo flavoque flore Cluſ. Pannon. p. 492. & Hiſtor. Tournefortius ad Lyſimachiam retulit, ſed immerito; nam & flos & fructus magis ad anagallidem accedit, quam lyſimachiam, bey Scheitz im Walde, und in denen Holtzſchlägen zwiſchen der frölichen Wiederkunfft und Hummels-Hahn. v. g. im grünen Schlag und Hirſchs Sprung floret Jun.

ANAGALLIS ſpuria, ſive minima, arvenſis, tetrapetaloides. Alſine minima, fructu coriandri exiguo Menzelii in Pugillo plantarum. Cujus figura non eſt nimis accurata. Mihi genuina anagallidis videtur eſſe ſpecies, a reliquis nullatenus differens, niſi quod habeat florem in quatuor ſaltem ſegmenta diſſectum, præterea parvitate totius plantulæ & foliis alternatim poſitis, nec non caule triangulari, qui in vulgari anagallide quadrangularis; copioſa provenit in agris arenoſis zwiſchen der neuen Schenck und Zölnitz; qui vero hanc plantam propter rationes dictas a reliquis anagallidis ſpeciebus ſeparare voluerit, ei non repugnabo, floret Junio, Julio & Auguſto.

TRIENTALIS Cordi & Rivini. Pyrola alſines flore, europæa major C. B. Pr. p. 100. ubi elegans extat figura. Tournefortius hoc genus non habet, adeoque definitionem ſubjicere placuit: Trientalis eſt herba flore regulari monopetalo, plano ſive rotato, & multifido, ſpecioſo, fugaci; ſeminibus anguloſis ternis quaternisque calyptra mem-

membranacea obvolutis, & tectis capsula sphærica, membranacea tribus carinis per maturitatem dehiscente. Hinter Schlefreisen im Walde, und um die Teiche herum floret Julio & Augusto.

GLAVCOIDES maritima, sive potius Thuringica, latiore folio. Glaux latiore folio, Thuringiaca C. B. P. p. 215. Bey der saltzigten See, und an der Sultzke bey Kelme und Langenbogen floret Junio.

MTRIOPHTLLVM Rivini. Millefolium aquaticum, sive viola aquatica caule nudo C. B. P. p. 241. Fœniculum aquaticum secundum Tabernæmontani. Bey Gera im Voigtlande, wo man nach Eisenberg reiset, in pratis, & in scrobibus circa Lipsiam & Wittebergam auch in denen Sümpffen bey Closschwitz und Litzeroda, cum sparganio minore, sed rarius floret Junio & Julio Wasser-Fenchel.

GENTIANELLA alpina, verna, major C. B. Gentiana alpina, flore magno, cœruleo violæ Marianæ J. B. In horto Sereniss. Principis floret Aprili.

GENTIANELLA cœrulea, oris pilosis C. B. P. Gentianella cœrulea, fimbriata, angustifolia, autumnalis Fab. Column. Gentianella lanugine ad singulas florum lacinias donata, flore quadripartito J. B. apud Chabræum p. 504. In sylvis & pratis editioribus v. g. um Jena-Priessenitz floret Septembri, ultima fere inter omnes plantas, cum colchico.

GENTIANELLA perennis, radice cruciatim pertusa. Gentiana minor, seu vulgi cruciata J. B. apud Chabr. p. 503. Gentiana cruciata C. B. P. p. 188. radice pertusa & non pertusa variat. In apricis & asperis v. g. hinter Ziegenhayn auf dem Fuchs-Berge floret Jul. & Aug. Germ. Klein Entian, Sperenstich, Himmel-Stengel.

GENTIANELLA autumnalis, annua, foliis centaurei. Gentiana autumnalis, angustifolia, minor, floribus ad latera pilosis C. B. P. p. 186. Pneumonanthe Cord. In ericetis & pratis siccioribus atque pascuis frequens floret Septembri.

GEN-

GENTIANA anguſtifolia, autumnalis, major C. B. Pin. p. 188. gentianæ ſpecies, calathiana quibusdam, radice perpetua, ſive paluſtris J. B. 3. p. 524. Pneumonanthe Tabern. icon. 787. in ericetis uliginoſis bey Wittenberg floret Septembri.

CENTAVREVM flore phœniceo. Centaureum minus C. B. P. p. 278 Tauſend Gülden-Kraut.

CENTAVREVM flore albo, a præcedente parum differt, niſi floris colore. Minime autem centaureum bicapſulare eſt, uti quidem hactenus opinati ſunt Botanici, ſed unicapſulare & bivalve; In ericetis & ſylvis variis v. g. im rauhen Thale und im Wald über Jena-Prieſenitz, auch häuffig im Wäldern bey Naumburg und Hamburg floret Julio & Auguſto.

CENTAVREVM purpureum minimum Moriſ. H. R. Bleſ. & Hiſtor. Oxon. P. 2. p. 566. In pratis juxta vias & ſemitas cum junco bufonio frequens v. g. im groſſen Paradieß, und zwiſchen Borſtendorff und Dornburg floret cum præcedente, a quo differt, quod ſtatim à radice in ramos brachietur dichotomia alias valerianellæ familiari, & quod caules habeat anguloſos & quaſi alatos, nec non parvitate ſua, quamvis naſcatur in paluſtribus, cum alias Botanici tradant, centaureum in udis locis longe majus provenire.

MENTANTHES Tournefort. & Rivini. Trifolium fibrinum Tabernæmont & officin. Trifoliata paludoſa, ſ. acopa Dioſcoridis Moriſ. Trifolium paluſtre C. B P. pag. 327. Menyanthes paluſtre Lugdun. duplici figura; variat enim ratione loci, majus datur & minus, rotundiore & acutiore folio, uti bene annotavit C. B. P. uti etiam videre licet in pratis udis, bey Ruttersdorff, und in der Zisle bey Coſpida floret Majo. Biberklee, Sumpff-Klee, Scharbocks-Klee, Drey-Blat.

NYMPHOIDES Tournef. Nymphæa lutea, minor, flore fimbriato C. B. P. in ſtagnantibus aquis floret Julio & Aug. Bey Dehoy im Cleviſchen Lande, auch auf der Inſel im Rhein, wo die Schenckens-Schantz drauf iſt, und anderswo in Teutſchland, v. g. bey Mannheim.

PLANTAGINELLA. Plantaginella paluſtris J. R. Method. p. 112. & C. B. P. p. 190. Plantago aquatica, minima Cluſ. Hiſtor. plant. rarior. Hujus figuram exhibet Menzelius in pugillo, cur vero plantaginellæ ſimilem dixerit, cum plane eadem ſit, non video. Rajus & Volckamerus p. 22. florem ipſius dicunt pentapetalum, mihi vero autopſia perſuaſit, ipſum eſſe monopetalum & quinquifidum; Provenit in locis, ubi per hyemem aquæ ſtagnarunt, v. g. am Wege, wo man nach Lichtenhayn und Ammerbach gehet. it. zwiſchen Zwätzen und Borſtendorff am Wege, & alibi, floretque Junio & Julio. vid. Plukenetii Phytograph. fig. 24.

ACACIA Indica, Farneſiana Aldini 2. (in honorem Carolis Farneſii, cujus horticultor fuit Aldinus, plantasque rariores in ejusdem horto obſervatas, ſingulari libro complexus eſt.) Acacia Indica foliis ſcorpioidis leguminoſæ, ſiliquis fuſcis, teretibus, reſinoſis Hort. Lugdun. Bat. In hortis variis floret Majo. Germ. Judian. Schleh-Dorn.

AMARANTHOIDES Indicum, monoſpermum, foliis ocymaſtri, capitulis purpureis prodr. parad. bat. amarantho affinis, Indiæ orientalis, floribus conglomeratis, ocymoidis folio Breyn. cent. 1. in hortis floret æſtate & autumno.

(2) CAPSVLA BIPARTITA.

STRINGA flore cæruleo major. Lilac Matthioli & Tournefort. vulgo Germ. Spaniſchen Holunder und Huck auf die Magd; item Sirenien, corrupte a Syringa; item Nägelein-Baum. In hortis & ſepibus frequens floret Majo.

STRINGA major, flore albo; cum præcedente. Sic in horto Medico in una eademque arbore flores cærulei & albi deprehenduntur ex inſitione.

STRINGA liguſtri folio, Lilac liguſtri folio Tournef. Jaſminum Perſicum, foliis non laciniatis Hort. Edinburg. In horto Medico & Sereniſſ. Principis floret Majo. Flores magis rubent & magis diſperſi ſunt in ramoſioribus paniculis. Hæc eſt illa planta, quam C. B. in Prodromo p. 158. Liguſtrum myrtifolium appellavit,

STRIN-

STRINGA laciniato folio. Lilac laciniato folio Tournef. Agem lilac Perſarum Corn. 189. Liguſtrum foliis laciniatis C. B. Pr. p. 158. In hortis floret Majo & Junio. Hanc plantam C. B. l. c. deſcripſit ſub nomine liguſtri foliis laciniatis. Sed differt liguſtrum a Syringo, quod habeat baccas veluti bipartitas, Syringa vero capitulas habet lignoſas & bipartitas. Propterea a Jaſmino differt bacca communiter gemella, veluti teſticulata, aliquando vero ſaltim monopyrena.

NICOTIANA major, latifolia C. B. P. p. 169. Nicotiana major ſive tabacum majus J. B. 3. 629. Hyoſciamus Peruvianus Dodon. Pempt. 452. ſeritur in plurimis Germaniæ regionibus frequentiſſima, circa Jenam bey der Naſen-Mühle floret Julio & Auguſto. Toback.

PETVM Rivini. Nicotiana minor C. B. Pin. 170. Priapeja quibusdam, Nicotiana minor J. B. 3. 630. Dubius hyoſcyamus luteolus, ſolanifolius Lobel. icon 269. Hæc diſtinguitur a Nicotiana communi, floribus ſegmentis obtuſis, & capſula glande penis referente, unde Geſnero Priapeja dicta fuit; in hortis hinc inde floret Aug. Germ. Türckiſcher Toback.

APOCYNVM erectum, incanum, latifolium, ægyptiacum, floribus croceis Parad. Batav. Apocynum Ægyptiacum lacteſcens, ſiliqua aſclepiadis C. B. Pin. 303. Beidelſar (rectius Beid-el-oſſar, quaſi ovum ex Oſſar, quia fructus ipſius lanugine fœtus, ovum refert) ſive Apocynum Syriacum J. B. 2. 136. Beidelſar P. Alpini Ægypt. 36. An ab hoc aliter quam floris colore differat ſequens planta, me ignorare fateor. De hac planta varia nugatus eſt Heicherus in ſuis proventibus plantar.

APOCYNVM erectum, latifolium, ſyriacum, incanum, floribus parvis, obſolete purpuraſcentibus Par. Bat. Apocynum majus, ſyriacum, rectum, Cornut. 90. Apocynum ſyriacum Cluſii in Hiſt. Plantar. rarior. pag. 87. Beid-el-oſſar Veslingii in P. Alpini 28. In horto Sereniſſ. Principis floret Julio.

APOCYNVM Æthiopicum fruteſcens, folio ſalicis, flore ochroleuco Volckammero pag. 39. dicitur Apocy-

mum Curaſſavicum fibroſa radice, floribus aurantiis, Chamenærii foliis anguſtioribus, in hortis floret Majo & Junio.

VINCETOXICVM Dodon. Pempt. 407. & Hirundinaria officinarum. Aſclepias albo flore C. B. P. 303. Aſclepias ſive vincetoxicum multis floribus albicantibus J. B. 2. 138. in montoſis, aſperis & ad ſepes vinearum frequens, floret Junio & Julio. Germani Schwalben-Wurtzel appellant, & differt ab Apocyno, non tam ſiliqua ſolitaria, ſed potius floris ſtructura, non ſecus ac Aſclepias Rivini hac ratione a vulgari Vincetoxico diſtinguitur.

VINCETOXICVM flore nigricante; Aſclepias nigro flore C. B. Aſclepias nigro flore quorundam J. B. 2. 140. Apocynum Columnæ in Phytobaſano III. Floret Jul. & Auguſto in horto Medico, Sponte autem provenit prope Lipſiam, in monte vulgo der Sand-Berg dicto, nec non circa Monſpelium & in aliis Galliæ, Italiæque locis.

VINCETOXICVM maritimum, ſalicis folio, flore albo Tournefort. Tithymalus maritimus, ſive eſula rara e Lio Venetorum Inſula Lobelii Icon. 372. C. B. in Pin. p. 291. dicitur Tithymalus maritimus floribus purpuraſcentibus, ſiquidem flore albo & purpureo variat. In horto Medico floret Majo.

VINCETOXICVM fruticoſum, folio ſubrotundo populneo. Apocynum folio ſubrotundo C. B. Apocynum folio rotundiore, flore ex albo palleſcente J. B. 2. 134. Apocynum I. latifolium Cluſii in Hiſtor. p. 124. In horto medico floret cum præcedente.

VINCETOXICVM volubile, foliis acutioribus. Periploca monſpeliaca foliis acutioribus Tournefort. Scammoneæ monſpeliacæ affinis, foliis acutioribus C. B. Pin. 294. Apocynum latifolium amplexicaule J. B. 2. 135. Apocynum III. latifolium Cluſii in Hiſtor. p. 125. In horto medico floret Junio. Hæ tres plantæ, nec cum apocynis, nec cum periploca quoad floris ſtructuram conveniunt, ſed potius cum vincetoxico officinarum, adeoque merito ad illud reponuntur.

CRASSA Rivini. Fritillaria craſſa capitis bonæ ſpei

Stapeli

Stapelii in Theophraſtum 335. Apocynum humile, ſiliquis erectis, africanum Hort. Lugdun. Batav. in hortis variis floret æſtate.

CRASSA minor. Aſclepias africana aizoides, longioribus foliis, minus dentatis Tournefort. Apocynum humile aizoides, cauliculis longiſſimis, denticulis rarioribus donatum Plukenet. Almageſt. Botan. 37. cum præcedente.

PERIPLOCA Tornef. Periploca ſcandens vulgo; in hortis Curioſorum floret Julio.

NERION Indicum, anguſtifolium, floribus odoratis, ſimplicibus, Hort. Lugdun. Batav. In horto medico flor. Aug. & Sept. Unholden-Kraut, Lorbeer-Roſen.

NERIVM floribus rubeſcentibus C. B. Nerium ſ. rhododendron flore rubro J. B. 241. Oleander, laurus roſea Lobelii icon. 364. In hortis floret cum præcedente.

NERIVM latifolium flore rubro pleno. Nerium Indicum, latifolium, flore variegato, odorato, pleno Hort. Amſtelod. im Fürſten-Garten floret cum vulgari.

NERION floribus albis C. B. Pin. cum præcedentibus.

VINCA Rivini. Pervinca Tournef. Vinca pervinca officinarum; Clematis daphnoides major, flore cæruleo J. B. 2. 132. Ad ſepes, variis in locis & in dumetis v. g. auf dem Kunitzer Schloß-Berg, an denen Hecken um Cloſewitz floret Martio & Aprili. Winter-Grün, Todten-Violen.

VINCA fl. albo. Cum præcedente, ſed rarius.

VINCA fl. purpureo, pleno, in hortis floret cum vulgari.

VINCA foliis, variegatis; Wintergrün mit verſilberten, und mit vergüldten Blättern in hortis variis occurrit, ſed rarius floret.

CVSCVTA major C. B. Pin. 219. Caſſutha ſive Cuſcuta J. B. variis plantis adnaſcitur in variis locis, hinc magnitudine variat, & hinc varia ſortitur nomina, inter quæ maxime celebre nomen Epithymi, h. e. cuſcutæ thymo adnatæ; hic ſæpius adnaſcitur chamædryi, quæ forſan pariter non ſpernenda. In vineis & montibus v. g. wo man nach dem Jäger-Hauſe gehet, & ad ſepes paſſim. flor. Junio.

CVSCVTA minor. Epithymum, ſive Cuſcuta minor

C. B. P. In locis gramineis v. g. auf dem Fuchs-Berge & alibi floret Jun. Germ. Flachs-Seide, Frauen-Haar.

(3) CAPSVLA TRIPARTITA.

CONVOLVVLVS major, albus C. B. P. p. 294. Semen hujus nigrum eſt, aliquando ruffeſcens annotante Bauhino; huic perſimilis eſt convolvulus Syriacus, ex quo Scammoneum officinarum provenit, hinc Hoffmannus in Floræ Aldorffinæ deliciis ſylveſtribus, hunc noſtrum dumetorum album convolvulum, ſcammoneum Germanicum nominat: große Winde, Zaun-Glocke Gallis Liſeron. Frequens eſt ad ſepes & dumeta v. g. auf der Inſul & alibi floretque Junio & Jul.

CONVOLVVLVS minor, arvenſis, flore roſeo C. B. P. p. 294. Helxine ciſſampelos multis, ſive convolvulus minor J. B. 2. 157. floris colore variat, ſiquidem modo candidus ſit, modo roſeus, modo albus cum purpureo umbilico, vel punicantibus lineis aſperſus, vel purpureus radiis albis pictus; quin & foliis variat, ſiquidem aliquando folia auriculata & ſagittæ æmula gerit oblonga, qualia D. Dent obſervavit apud Rajum; & Tournefortius in corollario inſtitutionum rei herbariæ convolvulum græcum, ſagittæ foliis, flore albo exhibet, quem tamen in hortis ſatum faciem mutare, & ad convolvulum minorem arvenſem C. B. P. plurimum accedere teſtatur; vid. Plükenet. in Phytographia Tab. 24. Fig. 3. talis plane occurrit convolvulus in via Lichtenhaynam verſus, per acclivia ducente; vulgaris vero minor arvenſis convolvulus, paſſim inter ſegetes obvius, floret Julio. Winde.

CONVOLVVLVS purpureus, folio ſubrotundo C. B. P. p. 295. Campanula Indica J. B. 2. 165. Convolvulus Indicus, flore violaceo Eyſtett. Flore dilute ac intenſe purpureo variat. In horto medico & S. Principis frequens floret Jul. & Aug.

CONVOLVVLVS Indicus, flore purpuraſcente ſemine albo H. R. Monſpel. cum præcedente.

CONVOLVVLVS Luſitanicus flore cyaneo Broſſ. Convolvulus peregrinus, cœruleus, folio oblongo. C. B. P.

p. 295.

p. 295. J. B. 2. 166. Campanula exotica Aldini. Pulcherrimus hic convolvulus vulgo hortulanorum convolvulus non convolvulus dicitur. Flore pallidiore variat, qui color Botanicis aquatus dicitur. Occurrit in hortis variis, floretque Junio & Julio.

CONVOLVVLVS orientalis, flore coccineo minore, a Commelino ſub nomine Quamoclit deſcriptus, paries nonnunquam horti medici Principisque incola eſt.

CAMPANVLA vulgatior, foliis urticæ, vel major & aſperior C. B. P. p. 94. Campanula major & aſperior, folio urticæ J. B. 2. 805. Cervicaria major. Dodon. Pempt. 164. In ſylvis frequens v. g. im rauhen Thale, floris colore variat. Junio.

Eadem fl. pleno in hortis.

CAMPANVLA pyramidata, altiſſima Tournefort. Campnula lacteſcens, fœtidior Cluſii Hiſt. CLXXII. Pyramidalis lævis J. B. 2. 808. Rapunculus hortenſis, latiore folio, ſeu pyramidalis C. B. P. p. 93. In hortis variis frequens ſub nomine pyramidalis; floret Junio & Julio. Germ. Glöcklein.

CAMPANVLA foliis echii C. B. Pr. p. 36. ubi elegans figura, ut & in Chabræo Sciagraph. p. 265. ſub titulo trachelii altiſſimi, hirſuti; copioſe occurrit in pratis bey Butbeck und Waldeck; nonnunquam etiam im Walde bey Coſpida, floretque Julio & Auguſto.

CAMPANVLA hortenſis, folio & flore oblongo C. B. P. p. 94. Viola mariana Geſn. Floris colore aliquando variat, in hortis floret Jul. & Aug.

CAMPANVLA pratenſis, flore conglomerato C. B. P. p. 94. Trachelium minus multis J. B. 2. 800. In pratis montoſis aridis, v. g. auf dem Jentzig- und Hauß-Berge Jun. & Jul.

CAMPANVLA media, foliis inferius candida lanugine veſtitis C. B. P. p. 94. Cervicaria media Thalii; nach Bebera zu ad ſepes floret Jun. & Jul. Hæc planta, ut & præcedens Campanula foliis echii, aliquando capſula ſpartita variat, uti recte obſervavit Tournef. Elem. Bot. ſed cum hoc non ſit perpetuum, præſtat reliquæ campanularum

familiæ cum eodem Tournefortio utramque plantam, præcipue propter ſummam convenientiam, quo ad partes reliquas, admiſcere.

CAMPANVLA hortenſis, rapunculi radice C. B. P. p. 94. Trachelii genus, mollioribus foliis Cluſii Pannon. & Hiſtor. Campanula repens, flore minore, cœruleo J. B. 2. 804. variat quoque flore albo, præcipue über den Steiger auf ſteinigten Aeckern, flore cœruleo vero in vineis & agris paſſim obvia eſt, floretque Jun. & Jul.

CAMPANVLA perſicæ folio Cluſ. Hiſtor. CLXXI. Campanula anguſtifolia, cœrulea J. B. 2. 803. Rapunculus perſicifolius, magno flore C. B. P. p. 93. In montoſis & ſylvis paſſim floret Jun. & Jul.

CAMPANVLA nemoroſa, anguſtifolia, parvo flore Tournefort. Rapunculus nemoroſus, anguſtifolius, parvo flore C. B. loc. cit. Rapunculus nemoroſus III. Tabernæm. Icon. 412. cum præcedente, ſed rarius.

CAMPANVLA radice eſculenta, flore cœruleo H. L. Batav. Rapunculus eſculentus C. B. Pin. 92. Rapunculus vulgaris, campanulatus J. B. 1. 795. Variat etiam foliorum longitudine, pariter ac multitudine. In locis gramineis & ad ſepes foliis glabris pariter atque hirſutis variat, Majo & Junio. v. g. im Fürſten-Garten, wo man nach Kunitz gehet.

CAMPANVLA minor, rotundifolia, alpina C. B. P. Campanula minor rotundioribus imis foliis Cluſ. Hiſtor. CLXXIII. flore albo & aquato variat. In pratis paſſim v. g. im Paradieß und auf der Inſul, it. auf denen Wieſen bey Lobſtädt. Junio.

RAPVNTIVM capitulis ſcabioſæ, quod C. B. P. p. 92. dicitur Rabunculus ſcabioſæ capitulo cœruleo, & a quibusdam ſcabioſa ovina. Flore albo variat, ſed rarius, nec non foliis glabris & hirſutis. Provenit copioſe in agris ſterilibus verſus Rotham urbeculam, & locum die frölliche Wiederkunfft dictum.

POLEMONIVM flore cœruleo & albo. Valeriana græca Dodon. Valeriana cœrulea C. B. P. p. 164. qui pſeudovalerianam dici poſſe judicat. Ego cum Tournefort.

fort. & S. Dahlen in Pharmacolog. Polemonium dicere malui; In hortis Majo & Jun.

SPECVLVM flore cœruleo arvenſe, ſpeculum veneris. Gerh. Anglis & hortulanis Onobrychis arvenſis, vel Campanula arvenſis, erecta C. B. P. pag. 215. In Hort. Ser. Princ. & aliis floret æſtate. Spontanea provenit copioſa inter ſegetes bey Franckfurt am Mäyn, wo man nach Bockenheim gehet. Flore albo quandoque variat.

IRIS VVLGARIS germanica ſive ſylveſtris C. B. P. pag. 30. Iris vulgaris, violacea, ſive purpurea, ſylveſtris J. B. 2. 709. Iris ſylveſtris Tabern. Icon. 648. Iris officinarum noſtrarum. Schwertel, oder blaue Lilien, blaue Schwert-Lilien. Hæc eſt, quam in tectorum culminibus, vinearum maceriis & muris plantare conſueverunt, & quæ in hortos translata, cultura ſpecioſior redditur, uti recte annotavit C. B. Frequens eſt per totam Thuringiam & Saxoniam locis indicatis, floretque Majo; Adeoque ab hac non differt hortenſis latifolia iris ejusdem C. B. niſi loco natali. De iride florentina quomodo ab hac differat, vid. Joh. Rajus in hiſtoria plantarum univerſali.

IRIS lutea, ſativa C. B. P. 32. Iris ſativa, floribus aureis Matthioli. In horto Sereniſſ. Principis floret cum præcedente.

IRIS lutea variegata Camerarii C. B. P. 32. Iris variegata ex luteo & purpureo Camerarii. In horto medico floret cum præcedentibus.

IRIS pratenſis, anguſtifolia, humilior C. B. P. Iris tenuifolia Michelfeldenſis Chabræi Sciagr. p. 243. In pratis bey Bubeck und Waldeck, auch bey Leipzig auf denen Wieſen im Roſenthal floret cum præcedentibus.

IRIS graminea, cui pereunt quotannis folia flore variegato J. B. apud Chabræum p. 243. In horto Principis floret Majo; Hujus capſula admodum anguloſa eſt.

IRIS tenuifolia major, flore cœruleo & ſtriato Cluſii J. B. apud Chabræum p. 243. Im Fürſten-Garten cum præcedentibus.

CHAMÆIRIS flore ſaturate violaceo C. B. P. p. 33. In horto Medico floret Aprili & Majo.

CHAMÆIRIS minor, flore varie picto C. B. Chamæiris minor, latifolia VII. Cluſ. Hiſtor. In horto Sereniſſ. Principis ſub nomine iridis perſicæ; Floret Aprilis & Maji initio.

IRIS paluſtris, lutea Tab. Acorus adulterinus C. B. P. p. 34. Gelbe Waſſer-Lilien, hujus & alteram ſpeciem naſci prope Gymnaſium die Schul-Pforte dictum, teſtatur Camerarius in ſuo Matthiolo p. 3. præterea & quandam ſpeciem iridis anguſtifoliæ reperi in montibus Schmonenſibus inter dumeta & virgulta, cujus florem cum non conſpexerim, plura de illa dicere non licet. Im groſſen und kleinen Paradieß, in Gräben und Sümpffen. Majo.

XYPHIVM Tournef. Iris bulboſa tota violacea, vel cœrulea J. B. Chabr. p. 239. In horto Sereniſſ. Principis floret Majo. Hæc & reliquæ irides bulboſæ, Tournef. Xyphia dicuntur.

CROCVS vernus, anguſtifolius, magno flore Moriſon C. B. P. Crocus vernus, anguſtifolius I. Cluſii. Crocus vernus, anguſtifolius, floribus cœruleis ſive violaceis J. B. floret menſe Martio in viridariis noſtris.

CROCVS vernus, latifolius, flavus C. B. P. Crocus vernus, flavo flore Cluſii cum præcedente floret Martio.

CROCVS vernus, latifolius, albus, variegatus, Moriſon C. B. P. Crocus vernus, latifolius, albo flore, J. B. cum præcedentibus.

CROCVS ſativus C. B. Crocus autumnalis, ſativus, floridus; & ſine flore Moriſ. Crocus verus, ſativus, autumnalis, Parkinſon, floret Septembri in horto Medico; Seritur quoque a ruſticis prope pagum Luther, hinter Winzerla. Piſtillum elegantiſſime criſtatum a Tournefort. depictum conſtituit crocum officinarum. Germ. Saffran.

NARCISSVS major, totus luteus, calice prælongo C. B. Bulbocodium Hiſpanicum J. B. Pſeudonarciſſus Hiſpanicus, aureus, maximus Parkinſ. Germ. Gelbe Hornungs-Blume, oder gelber Jacobs-Stab. In hortis frequens floret Februario & Martio.

Idem flore pallide luteo ſ. ochroleuco.

NARCIS-

NARCISSVS multiplex, totus flavus C. B. Pin. cum præcedente.

NARCISSVS flore ſimplici, medio purpureo Moriſ. Hiſtor. 2. Narciſſus albus circulo purpureo C. B. P. In hortis floret Majo. Narciſſen.

NARCISSVS juncifolius. Gallis Joncquilles, hic etiam aliquando in hortis obvius.

LILIO-narciſſus, ſeu narciſſus liliflorus, flore albo ſingulari, cum rubedine diluto. Pluckener. Phytograph. Tab. 42. Fig. 3. An narciſſus Japonicus ſ. Virginianus, flore albo, colchicum æmulante Hoffm. de quo vid. ejus Flor. Alt. Hort. p. 44. In horto S. Principis floret Majo & Junio.

LILIO-aſphodelus phœniceus Park. Parad. 148. Lilium rubrum, radice aſphodeli C. B. P. p. 80. Lilium radice aſphodeli, phœniceum, ſive lilio-aſphodelus quibusdam J. B. 2. 701. In hortis frequens floret Majo & Jun.

LILIO-aſphodelus luteus, odoratior, & minor rarior eſt in hortis noſtris; occurrit tamen aliquando, & a præcedente non niſi floris colore, totius plantæ magnitudine & teneritate diſtinguitur.

ALOE ſputia ſ. Metl Americanorum. Aloë falio in oblongum aculeum abeunte C. B. Pin. 286. Guajaco viribus ſimilis indica C. B. Pin. p. 448. Mel ſive Magnei ejusdem in pinace p. 20. potius Metl ſive Maguei. vid. Carolus Cluſius in hiſt. hiſp. pag. 442. ſeqq. ubi refert, ex hac planta Americanos & vinum & chartam & lintea parare, eademque illos uti contra lucem Veneream; floruere aliquot hujus aloës ſtirpes in horto Schleebenſi, quarum caules in porticu iſtius horti adhuc conſpiciuntur, æque ac in atrio horti Boſiani.

HÆMANTHVS Africanus pag. 657. in Inſtit. Tournef. Tulipa Capenſis vulgo in hortis Curioſorum floret autumno & hyeme.

COLCHICVM commune C. B. P. 67. Colchicum J. B. 2. 649. ab hoc colchicum album purpuraſcentibus lineis J. B. 2. 651. Colchicum commune, folio lineis albis picto H. R. Colchicum vulgare atropurpureum Pariſienſium,

um, flore ſimplici H. R. Pariſ. ut & colchicum Vere & Autumno florens C. B. P. p. 68. Colchicum biflorum J. B. Cluſii Hiſtor. 202. non differre videntur; ſiquidem colchicum bis florens apud Germanos ſæpius occurrat, floret ultimo autumno, & fructum tricapſularem fungoſum, ſeminibus ovalibus, ſubrugoſis (Germ. Bettlers-Läuſe dictis) fœtum demum altero anno perficit. Flos Germanis vocatur Zeitloſen, nackende Huren, Herbſt-Blumen, Wieſen-Zeitloſen, oder Spinn-Blumen, quia eo tempore floret, quo telas ſuas repetunt puellæ. De hujus radicis virtute vid. Celeb. Wedelii Propempticon de colchico veneno & alexipharmaco, & Chriſtoph. Ludov. Wilhelm. Doct. Med. Tract. Germ. in 4to de Colchico & aliis amuletis. Aliquando & vere floret.

COLCHICVM fl pleno. In hortis Curioſorum floret cum præced.

HTACINTHVS orientalis, caule maculato C. B. P. Hyacinthus orientalis Matthioli, Dodon. Geſneri. In hortis frequens floret Martio & Aprili; Magnitudine totius plantæ & præcipue florum variat, nec non colore, qui nonnunquam albus, quin & geminatus, ſive alter alteri innaſcens. Hyacinth).

HTACINTHVS indicus, tuberoſus, flore hyacinthi orientalis C. B. P. p. 47. ſub nomine tuberoſæ (der Tuberoſen) ubique proſtans in hortis præcipue pentilibus frequens floret Jun.

MVSCARI Cluſii Hiſt. Hiſpan. & Pannon. Turcarum Camerarii. Hyacinthus racemoſus, moſchatus C. B. P. p. 43. Bulbus vomitorius Matthioli, floris colore variat vid. C. B. c. l. apud nos vulgatius eſt muſcari majus obſoleto albo flore. In hortis floret Majo.

MVSCARI minus, cœruleum racemoſum, juncifolium. Hyacinthus racemoſus, cœruleus, minor juncifolius C. B. P. p. 43. Hyacinthus cœruleus minor vel VI. Tabernæm. In hortis frequens Aprili & Majo.

MVSCARI nemorenſe, comoſum. Hyacinthus comoſus, major, purpureus C. B. P. p. 42. In ſylvis præcipue cæduis nach Sultze und Eckardsbergen zu floret Majo

Majo & Jun. Hæc planta duplex eſt, arvenſis latiore folio, & nemorenſis anguſtiore folio, uti recte obſervavit Car. Cluſius in hiſt. pannon. arvenſis copioſa eſt in agris Weſteraſiæ prope Moguntiam.

MVSCARI paniculatum, monſtroſum. Hyacinthus Sanneſius F. Columnæ in Ecphraſ. plant. rar. Hyacinthus uva ramoſa, major C. B. P. p. 42. Hanc aliquando ſponte ſuum deprehendi, copioſiſſimam, in ſylva Francofurto ad Mœnum vicina, ſed, cum ſit origani ſ. americanæ, vix credere licet, quod ſua ſponte ibidem exorta fuerit. Siquidem eſſe poſſit, ſemina a quodam fato ibidem progerminaſſe, ſed aliquando pariter hanc plantam deprehendi ad ripam Salæ, quod me facit dubium, ſed dantur & aliæ tales plantæ, v. g. Aſter conyzoides ſ. conyza, thyrhoides Jungermanni, quæ Americanæ eſt omnino originis, & pappo ſuo in Europa undique diffuſa, vel ipſis Europæis plantis eſt vulgatior. Vid. Paulus Boccone in hiſt. Plant. rariorum per Siciliam naſcentium, ſocietati Regiæ in Anglia dicata. In horto S. Principis Maj.

(4) CAPSVLA QVATRIPARTITA.

ONAGRA Tournefort. & Rivin. Lyſimachia lutea, corniculata C. B. in App. in Pin. Lyſimachia lutea, ſiliquoſa, Virginiana Parkinſon. Lyſimachia lutea, corniculata, non pappoſa, Virginiana major Moriſ. In hortis frequens, ut & aliquando in campis, floret Jun. & Jul.

CHAMÆNERION altiſſimum, ſylvaticum. Lyſimachia ſpecioſa, quibusdam onagra dicta, ſiliquoſa J. B. Lyſimachia chamænerion dicta, latifolia C. B. Chamænerion & Epilobion Geſneri ad Cordum; quod nomen Epilobii placuiſſet, niſi Gallorum Botanicorum fidus Tourneforcius jam elegans chamænerii nomen impoſuiſſet. In ſylvis præcipue montoſis copioſum pullulat v. g. gegen dem Fürſten-Brunnen über. Junio. Weiderich-Röſlein.

CHAMÆNERION paluſtre, folio ſaligno, molli & anguſto. Tournef. Lyſimachia ſiliquoſa, ſpecioſa, anguſtifolia, flore purpuraſcente J. B. Lyſimachia chamænerion dicta, anguſtifolia C. B. Delphinium buccinum Dioſcoridis Lobel. Auf ſumpfigten Wieſen bey Querl. Jun. & Jul.

CHA-

CHAMÆNERION glabrum, latifolium, majus. Lyſimachia ſiliquoſa, glabra, major. C. B. P. p. 245. Inter frutices & dumeta denſiora auf der Wellmeſe gegen dem Furſten-Brunnen über, nec non ad ripas Salæ bey Cunitz, floret Jun. & Jul.

CHAMÆNERION glabrum, latifolium, minus. Lyſimachia ſiliquoſa, glabra, minor C. B. P. p. 245. An denen Felſen bey Hain-Büchen und auf der Wellmeſe. floret Jun. & Jul.

CHAMÆNERION paluſtre, hirſutum, magno flore. Lyſimachia ſiliquoſa, hirſuta, magno flore C. B. P. p. 245. Lyſimachia ſiliquoſa, hirſuta, flore purpureo majore J. B. apud Chab. p. 286. Ad ſtagna & foſſas zwiſchen dem Johannis- und Löber-Thor. Jun. & Jul.

CHAMÆNERION paluſtre, hirſutum, parvo flore. Lyſimachia ſiliquoſa, hirſuta, parvo flore C. B. P. pag. 245. Major eſt & minor, utraque in C. B. Prodromo p. 116. eleganter deſcripta; occurrit vero utraque cum præcedente, wo man nach Ziegenhayn gehet. Floret Jun. & Jul. Hujus loci eſt XYLON ſ. Gloſſypium offic. quod ex ſeminibus in officinis obviis prodit, ſi non nimis fuerint vetuſta.

STRAMONEVM ſive Datura. Stramonea, ſive Datura major, fœtida, pomo ſpinoſo oblongo Hort. Acad. Lugd. Bat. Solanum fœtidum, pomo ſpinoſo, oblongo. C. B. Nucimetellæ congener planta Datura Camer. in Epitom. Matth. pag. 168. Datura Turcarum Eyſtett. In hortis variis floret Julio. Wächſt überall wild bey Wittenberg v. g. in der Fiſcherey, und um die Dörffer cum xanthio. De noxis ſtramonei vid. Sam. Dahle in pharmacologia: an Solanum manicum Theophraſti Ereſii?

STRAMONEVM flore purpurante majore. Hæc ſpecies a Parkinſon. in Raji Hiſtoria deſcripta eſt. In horto S. Principis floret Julio.

STRAMONEVM fructu rotundo, deorſum ſpectante, & aſpero F. Colum. Solanum pomo ſpinoſo, rotundo, flore longo C. B. P. Solanum multis dictum, ſeu pomum ſpinoſum J. B. Nux metella Matthiol. floret cum præcedentibus

præcedentibus im Fürſten ; Garten, Julio & Auguſto.

ERICA ſpuria ſive TETRALIX. Erica ex rubro nigricans, ſcoparia C. B. Pin. p. 468. Erica Brabantica, folio coris hirſuto, quaterno J. B. 1. 358. Erica XIII. Cluſ. Hiſt. 46. in ericetis & carectis udis bey Wittenberg, & in Weſtphalia atque ducatu Juliacenſi frequens floret æſtate & autumno. Hæc aliæque plantæ a Tournefortio Ericis accenſitæ non merentur cum vulgari erica tetrapetala confundi.

(5) CAPSVLA QVINQVE PARTITA.

KETMIA Syrorum quibusdam C. B. P. p. 3 6. Alcea arboreſcens, ejusdem ibidem. Alcea arboreſcens, glabra, Ketmia dicta J. B. 2. 957. In hortis variis flore purpuro violaceo & ex albo- & rubro-mixto variat; Huc ſpectat Abelmoſch, quod pariter aliquando ex ſeminibus terræ commiſſis ortum in hortis noſtris occurrit, cujus nomina ſunt.

KETMIA ægyptiaca, ſemine moſchato Tournefort. p. 100. Alcea ægyptiaca, villoſa C. B. Althæa ægyptiaca, moſchata, Abelmoſch dicta Moriſ. Hiſtor. Oxon. P 2. p. 533. De reliquis Ketmiæ ſpeciebus vid. Tournefortius.

Bammia Rivini, Ketmia veſicaria vulgaris Tournefort. Alcea veſicaria C. B. P. p. 317. Alcea ſoliſequa, multis veneta J. B. 2. 1068. in hortis floret Jun. & Julio. Wetter-Röſlein, Morgen-Stern, Stunden-Blume, quia flos ipſius cito defluit.

COTTLEDON Dioſc. umbilicus Veneris vulg. Umbilicus Veneris major Camer. Epit. p. 394. in hottis Curioſorum, ſed rarius, floret æſtate.

COTTLEDON æthiopicus, folio volæ manus magnitudine, per limbum purpureo, ſedum tale vulgo cum præcedentibus.

(6) CAPSVLA MVLTIPLICI.

ABVTILON Dodon. Pempt. 656. Althæa Theophraſti, flore luteo C. B. Pin. p. 316. Althæa lutea ſ. Abuti-

Abutilon Avicennæ putatum Park. In horto Sereniſſ. Principis & aliis aliquando occurrit.

VI. Seminibus tectis, bacca, ſive fructu molli.

(1) MONOPYRENA.

LAVREOLA folio deciduo, ſive Meſereon Germanicum J. B. 1. 566. Chamelæa Germanica. Dodon. Pempt. 364. Thymelæa folio deciduo, flore purpureo, officinis laureola fœmina C. B. Pin. p. 464. Thymelæa lauri folio deciduo, ſive laureola fœmina Tournefort. 595. Daphnoides flore purpureo Tabern. p. 1482. In Wäldern, v. g. im rauhen Thale, Cunitzer-Berge, und bey Jena-Prieſſenitz. Flore occurrit dilute purpureo, inſtar floris mali perſicæ, unde vulgo laureola flore perſico dicitur. Floret Martio. Germ. Seidelbaſt, Kellerhalß.

LAVREOLA folio deciduo, flore albo, officinis laureola fœmina C. B. P. p. 462. Thymelæa lauri folio deciduo, flore albido, fructu flaveſcente Tournefort. In horto Medico floret cum præcedente.

LAVREOLA alpina, linifolia, humilior, flore purpureo, odoratiſſimo. Thymelæa alpina, linifolia, humilior, flore purpureo, odoratiſſimo Tournef. Thymeleæ affinis facie externa C. B. Pin. 463. in hortis Curioſorum, ubi cum Matthiolo Cneorum appellant. Sponte provenit prope Francofurtum ad Mœnum, & prope Auguſtam Vindelicorum. Floret Martio.

VIBVRNVM Matthioli 217. Tournefort. p. 607. tab. 376. Lantana vulgo, aliis viburnum J. B. 1. 557. In ſepibus & ſylvis floret paſſim Majo. Schling-Baum, baccæ comeduntur & virgultæ loco ſalicum uſurpantur.

TINVS prior Cluſii Hiſt. 49. Laurus ſylveſtris, corni fœminæ foliis ſubhirſutis C. B. P. p. 461. Laurus Tinus, ſeu ſylveſtris prior J. B. 1. 418. Hæc a veteribus lauro fuit admiſta, ſed cum lauri flos fructusque longe diſtat ab hujus flore atque fructu, præſtat eandem a lauro ſeparare, vid. Car. Cluſ. in hiſt. plant. per Hiſp. naſcentium

in

In hortis Curioſorum floret Majo; nonnunquam & in hybernaculo ſemperviret floretque.

OPVLVS Ruellii p. 281. Tournefort. p. 607. Tab. 306. Sambucus aquatica, flore ſimplici C. B. P. p. 564. Sambucus aquatica J. B. 1. 552. Sambucus paluſtris Dodon. Pempt. 846. In ſylvis humidioribus & ſepibus frequens floret Majo. Hirſch-Holder. Flores hujus umbellæ laterales, longe ſunt majores, quam ii, qui meditullium occupant, & ſteriles; ſi vero & medium occupantes, ſint æque magni, tunc dicitur.

OPVLVS flore globoſo Tournefort. Sambucus aquatica, flore globoſo pleno C. B. P. 456. Sambucus roſea, ſive aquatica Lobelii Icon. 201. Germ. Schnee-Bälle, Schwelcken.

VISCVM baccis albis C. B. P. p. 423. Viſcum Dodon. Pempt. 826. In variis arboribus v. g. in fraxino, ſalice, oxyacantha, tilia, pyro, malo &c. apud nos occurrit præcipue im Rauhen-Thale, floretque Martio. Germ. Miſtel. NB. Viſcum duplicis generis habet flores, alteros quidem ſteriles & majores, alteros vero fœcundos & minores, & hos quidem totâ plantâ ab invicem remotos.

VISCVM polycoccon Camerarii non ſolum in Helvetiæ, ſed & Pannoniæ altis montibus frequens eſt, ut adeoque Rajus immerito cum vulgari pro eadem planta habeat; Iſt auch in denen Gebürgen zwiſchen dem Vogtlande und Böhmen.

STCIOIDES americana, fructu echinato, foliis angulatis Tournefort. Cucumis canadenſis, monoſpermos, fructu echinato Parad. Bat. Bryonioides canadenſis, villoſo fructu, monoſpermos eidem. Hundes-Gurcken vulgo. In horto medico, Altenbergenſi &c. floret Julio, Auguſto, & hinc in brumam usque.

(2) BACCA DIPYRENA.

JASMINVM vulgatius, flore albo C. B. Pin. pag. 327. Jaſminum, ſive Gelſeminum flore albo J. B. 2. 101. Gelſeminum vulgatius, Jaſminum Lobel. Icon. 105. In hortis variis floret Majo & Junio. Jeßmin, Schaſmin.

Jaſminum in genere habet baccas dipyrenas, ſed obſervavit Tournef. dari & Jaſminum, bacca monopyrena, quod potius alio referre præſtat, & ſeparatum ex illo genus conſtituere.

JASMINVM Hiſpanicum, flore majore, externe rubente J. B. 2. 101. Jaſminum humilius, magno flore C. B. P. p. 398. Jaſminum candiflorum Tabernæm. icon. 885. cum præcedente.

JASMINVM, ſive Gelſeminum luteum J. B. 2. 102. Jaſminum humile, luteum C. B. P. 397. Jaſminum luteum Lobel. icon. 106. In horto medico floret cum præcedentibus.

JASMINVM luteum, vulgo dictum bacciferum C. B. Trifolium fruticans, quibusdam Polemonium flore luteo J. B. 1. 374. Trifolium fruticans Dodon. Pempt. 571. In hortis variis floret Jun. & Jul. Hujus baccæ per maturitatem ſunt nigræ, & ſemina communiter bina fovent in bacca ſimplici, ſequens vero indicum, baccas poſt ſingulum florem veluti gemellas gerit, pariter tamen nigras.

JASMINVM indicum, flavum, odoratiſſimum Ferrarii. In hortis variis frequens floret Junio; Hujus fructus communior eſt, quam reliquorum, conſtanter fere geminus, unde & reliqua, quorum fructum nondum vidi, propter convenientiam in reliquis partibus, huc retuli.

RVBIA tinctorum ſativa C. B. P. p. 333. Rubia ſativa J. B. 3. 714. Rubia Dodon. Pempt. 352. In horto medico floret Junio & Julio; Ex hujus radice contrita paratur Grap officinarum, quo utuntur tinctores. Färber-Wurtzel, Färber-Röthe. Copioſa colitur in agris Sileſiæ. Hæc planta quo ad florem, & naſcendi modum fere convenit cum plantis, quas Rajus ſtellatas vocat, v. g. Cruciata, Gallio, Mollugine, Rubeola &c. Sed cum ipſius fructus ſit bacca, præſtat eandem huc reponere, quam ſolum propter foliorum convenientiam ad ſtellatas reliquas, ſuperius recenſitas referre.

FRANGVLA Dod. Pempt. 787. Alnus nigra, bacciferа C. B. P. p. 428. J. B. 1. 560. In ſepibus & ſylvis frequens floret Majo, quandoque & Autumno. Germ. Faul-

Baum

Baum und Pinnholtz. Hæc planta dubium inter Botanicos charactere habet, ſiquidem in floris tubulo habet quaſi lamellas, a Tournef. eleganter depictas; ſed cum non ſint deciduæ, præſtat cum Rivino ad Monopetala referre, cujus ſpecies eſt genuina ſeq.

FRANGVLA polycarpos, Alnus nigra polycarpos C. B. Pin. pag. 428. in ſepibus & ſylvis bey Arnſtadt floret cum præcedente. Vid. Elsholzii flora marchica. Hanc plantam dictis locis creſcere, refert etiam Illuſtr. noſter Wedel. in Colleg. de Mat. Medica.

(3.) BACCA TRIPYRENA.

ALATERNVS I. Cluſii Hiſpan. 56. Phylica elatior C. B. In horto Medico & aliis hortis floret Jun. & Jul. occurrit & aurea, ſeu foliis ex luteo variegatis H. R. Pariſ.

SAMBVCVS fructu in umbella nigro C. B. P. p. 456. Sambucus vulgaris J. B. In ſepibus frequens floret Junio. Holder, Holler, Holunder, Flieder-Baum, Fliedern.

SAMBVCVS fructu in umbella viridi C. B. Pin. Sambucus fructu albo Lobelii icon. 162. Occurrit aliquando in denen Wein-Bergen nach Zwetzen zu, im Lerchen-Felde, floretque cum præcedente.

SAMBVCVS foliis laciniatis inſtar azadaracht. In hortis Curioſorum floret cum præcedente.

SAMBVCVS racemoſa, rubra C. B. P. p. 456. Sambucus racemoſa, acinis rubris J. B. 1. 551. Sambucus montana, racemoſa Lobel. Icon. 163. In montoſis ſylvis v. g. bey Tautenburg und Rode, it. bey dem Fürſten-Brunnen. Germ. Hirſchholder. Hujus baccæ vulgo pro baccis Ebuli divenduntur. Floret Aprili & Majo.

SAMBVCVS humilis, ſive Ebulus C. B. P. Ebulus, ſive ſambucus herbacea J. B. 1. 546. In agrorum limitibus occurrit hinc inde, ſed circa Jenam rarius. v. g. bey der alten Gieſſe, und bey Rabs. Germ. Attich, Nieder-Holder, Kraut-Holder, uti Græcis χαμαιάκτη in pari ſignificatu. Nam vocula χαμαὶ in compoſitis humilem, ἀκτὴ vero Græcis Sambucum notat.. Floret Junio.

(4) BACCA TETRAPYRENA.

AQVIFOLIVM Tournefortii p. 60. Tab. 371. Aquifolium,

folium, ſive agrifolium vulgo J. B. 1. 114. Ilex aculeata, baccifera, folio ſinuato C. B. P. 425. In hortis variis; Floret Majo & Junio. Foliis pariter reperitur deauratis. Stech-Eiche, Stech-Palmen. Spontaneum eſt frequens in ſylvis vaſtioribus Weſtphaliæ & des Weſter-Walds.

LIGVSTRVM J. B. 1. 528. Liguſtrum Germanicum C. B. P. p. 475. Phyllirea Dodon. Pempt. 775. qui propterea a Matthiolo notatur; qui tamen ipſe reprehenſionem magis meretur, ſiquidem more ſuo fictitiam & ad Dioſcoridis textum concinnatam figuram propoſuit; quin & Liguſtrum Latinorum pro cypro Græcorum habuit, quod eſt falſiſſimum; Alkana enim Arabum eſt cyprus Græcorum, de quo videatur C. B. in Matthiolum. In ſepibus paſſim floret Junio. Kingerten, Bein-Holtz, Mund-Holtz.

(5.) BACCA POLYPYRENA.

SOLANVM officinarum, acinis nigricantibus C. B. P. 166. Solanum vulgare acinis nigris J. B. In hortis & cultis locis frequens floret Junio & Julio. Foliis inſigniter variat, aliquando ad Chenopodium accedentibus. Nacht-Schatten, Sau-Kraut.

SOLANVM officinarum, acinis luteis C. B P. p. 166. Solanum hortenſe, ſive vulgare acinis luteis J. B. Recte hanc plantam a prima diſtinxit Bobartus & Moriſon. Cum præcedente, ſed rarius, reperitur nonnunquam auf der Inſul und in ſcrobibus zwiſchen Borſtendorff und Dornburg, cum Xanthio; auch vor den Johannis- oder Erfurtiſchen-Thor ad parietes hortorum & ſcrobes floret æſtate & autumno in brumam usque; iſt überall bey Wittenberg. Caules hujus aſperi, veluti ſpinoſi.

SOLANVM ſcandens, ſeu dulcamara C. B. P. p. 187. Glycypicros, ſive amara dulcis J. B. 2. 109. Dulcamara Dodon. Pempt. 402. Dulcamara foliis ad baſin auriculatis variat, quæ a Matthiolo ſub tit. vitis ſylveſtris exhibita eſt. In ſepibus & ſalicetis floret Junio & Julio. German. Je länger, je lieber. Hindſch-Kraut.

SOLANVM ſcandens, ſeu Dulcamara flore albo C. B. P.

B. P. 167. cum præcedente; ſed rarius v. g. bey der neuen Schencke.

SOLANVM ſcandens, foliis variegatis H. R. Par. præcedentis eſt varietas, & occurrit in horto Medico.

SOLANVM fruticoſum, bacciferum C. B. P. p. 166. Strychnodendros J. B. 3. 614. Pſeudo-capſicum Dodon. Pempt. 718. In hortis, ubi amomum Plinii, vel momum plenum corrupte vulgo dicunt. Floret Julio.

SOLANVM tuberoſum, eſculentum C. B. P. 167. Prodr. p. 87. Papas americanum J. B. 3. 621. Germ. Tartuffeln, oder Erd-Aepffel. In hortis variis totius Germaniæ floret Julio & Auguſto. Inepte a quibusdam hæc planta, nec non ſol radice tuberoſa, cum cyclamine confunditur.

SOLANVM ſpinoſum, indicum, flore borraginis H. R. Pariſ. Solanum foliis, & caule ſpinoſis Moriſ. H. R. Bleſ. In horto Medico & aliis floret æſtate. Ab hoc ſolanum indicum, folio ſinuoſo, aculeis atro-purpurris inſtructo Tournefort. Inſtit. p. 149. parum vel nihil differt.

MANDRAGORA Mas Camer. Epit. Matth. pag. 379. Germ. Alraun-Männlein. Mandragora off. in hortis Curioſorum aliquando occurrit, ſed raro florens conſpicitur.

LYCOPERSICVM Galeni Anguill. 217. Solanum pomiferum, fructu rotundo, ſtriato, molli C. B. P. p. 167. Mala aurea, odore fœtido, quibusdam Lycoperſicon J. B. 3. 620. Aurea mala Dodon. Pempt. 448. In hortis variis, ubi vulgo poma amoris dicuntur, floret æſtate.

LYCOPERSICON fructu rubro, non ſtriato Tournefort. Inſtitut. 156. cum præcedente frequens floret æſtate. Ab hoc minime differt Lycoperſicon fructu ceraſi rubro Tournef. Solanum racemoſum, ceraſorum forma C. B. Pin. 167. J. B. 3. 623.

CAPSICVM ſiliquis longis, propendentibus Tournefort. p. 152. Piper indicum, vulgatiſſimum C. B. P. p. 102. In hortis variis floret Junio & Julio. Germani Spaniſchen Pfeffer appellant; De hoc videatur Frater Gregorius de Rhegio, qui integrum Tractatum de hac planta, ejusque ſpeciebus conſcripſit.

ALKEKENGI Tournefort. Halicacabum Rivini Germ. Jüden-Kirſchen, oder Boborellen. Solanum veſicarium C. B. P. p. 166. In vineis paſſim floret Junio & Julio. Solanum halicacabum vulgare J. B. 609. Prope Alkekengi ſpectat Solanum ſomniferum, de quo vid. Sam. Dale pag. 139. in Suppl. & Proſp. Alpin. de plantis Ægypti.

ALKEKENGI foliis chenopodii.

ALKEKENGI foliis ſtramonei, hæ ſpecies, vel potius varietates occurrunt prope ſepes zu Lichtenhayn.

ALKEKENGI indicum, majus Tournefort. Solanum veſicarium C. B. P. p. 166. Solanum, ſive halicacabum indicum J. B. 3 609. Halicacabum, ſive ſolanum indicum Camerarii Hort. Tab. XVII. In horto medico floret Junio & Julio.

ALKEKENGI majus, floribus & fructibus verticillatis. Solanum ſomniferum Veterum & Camerar. Epit. Matth. p. 377. in hortis Curioſorum floret Julio.

LILIVM convallium Tournefort. & officinarum. Flos convallium Rivini. Lilium convallium album C. B. P. p. 304. Lilium convallium vulgo J. B. 3. 531. Germ. Mayen-Blümlein. Naſcitur copioſum im rauhen Thale & aliis nemoribus.

LILIVM convallium, flore rubente C. B. P. 304. J. B. 3. 533. Lilium convallium, floribus ſuave rubentibus Lobel. Icon. 173. In hortis variis floret cum præcedente.

POLTGONATVM latifolium, vulgare C. B. P. p. 303. Polygonatum, vulgo Sigillum Salomonis J. B. 3. 529. & officinarum. Germani Weiß-Wurtz appellant. In ſylvis frequens v. g. bey Cluſewitz floret Majo.

POLTGONATVM latifolium, flore majore, C. B P. p. 303. Polygonatum floribus ex ſingularibus pediculis J. B. 3. 529. Polygonatum latifolium II. Cluſii in Hiſt. 276. bey Coſpida und auf dem Fuchs-Berge inter frutices, floret cum præcedente. Hujus luxuriantis eſt varietas.

POLTGONATVM latifolium, flore duplici, odoro Hort. Reg. Pariſ. Sigillum Salomonis, flore pleno Acad. Reg.

Reg. Pariſ. 115. In hortis Curioſorum occurrit, floret cum præcedente.

POLTGONATVM anguſtifolium non ramoſum C. B. Pin. p. 303. Polygonatum anguſtifolium J. B. 3. 531. Polygonatum alterum Dodon. Pempt. In ſylvis montoſis v. g. auf dem Enſels vel vulgo Inſels-Berge bey Walters-hauſen, ubi variæ proveniunt aliæ plantæ rariores, quas in ſeqv. paſſim annotavimus. Floret cum vulgari, ſed paulo ſerius.

VACCINIVM Rivini. Vitis idæa Tournefortii. Vitis idæa, foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante C. B. P. p. 470. Vitis idæa anguloſa J. B. 1. 520. Vitis idæa ſive Myrtillus Tabernæm. Icon. 1078. In ſylvis paſſim, in ſpecie nach dem Vogtlande hin, und nach Hummels-hayn, auch nach dem Hartz hin, und bey großen Oehrig. Germ. Heidelbeeren. Floret Majo.

VACCINIVM foliis oblongis crenatis fructu albo. Weiſſe Heidelbeeren. In ſylvis bey Cölln, cum vulgari floret.

VACCINIVM foliis buxi, ſemper virens, baccis rubris. Vitis idæa foliis ſubrotundis, non crenatis, baccis rubris C. B. Pin. p. 470. Vitis idæa ſemper virens, fructu rubro J. B. 1. 522. Vaccinia rubra Lobel. Icon. p. 109. cum præcedente, bey Städtgen Rode und Schlefreiſen, paſſim floret, toto viretque anno. Germani vocant Preuſſel-Beeren.

VACCINIVM altiſſimum, foliis ſubrotundis, exalbidis. Vitis idæa magna quibusdam, ſive myrtillus grandis J. B. 1. 518. Vitis Idæa, foliis ſubrotundis, exalbidis C. B. P. p. 407. cum ptæcedentibus hinter Schlefreiſen im Walde bey den Teichen cum oxycocco, ubi Trunckel-Beeren vel corrupte Tunckel-Beeren appellant, quia baccæ vim inebriandi habent; floret Majo & Jun.

BRTONIA nigra Dodon. Pempt. 399. Bryonia alba, baccis nigris C. B. Ad ſepes paſſim; Floret Majo & Junio. Zaun-Rübe, Gicht-Rübe. Baccis rubris frequentior eſt in Haſſia. Dicitur etiam Naß-Wurtzel, quia radix hujus plantæ rabiem in ferre creditur, alias ſolum externe impoſita

alvum valde movet, non ſecus ac radix cyclaminis, quæ officinis artanita dicitur, & ex qua paratur unguentum de Artanita.

MOSCHATELLINA Tourn. Ranunculus nemoroſus, moſchatellina dictus C. B. P. minimus ranunculus ſeptentrionalium, herbido, muſcoſo flore, & Moſchatella Cordi Lobel. an denen Hecken bey Städtgen Rothe und Haynbüchen, auch in horto medico, floret Martio & Aprili.

GROSSVLARIA ſimplici acino, vel ſpinoſa, ſylveſtris C. B. Pin. 455. Uva criſpa ſ groſſularia J. B. 1. 47. in ſepibus frequens floret Aprili. Foliis glabris & hirſutis variat.

GROSSVLARIA Spinoſa, ſativa C. B. P. p. 445. Stachel-Beeren, Kloſter-Beeren. In hortis frequens floret Martio & Aprili.

GROSSVLARIA ſpinoſa, ſativa, altera, foliis latioribus C. B. Pin. p. 445. groſſularia ſpinoſa, fructu obſcure purpuraſcente J. B. 1. 48. Rothe Stachel-Beeren, Kloſter-Beeren, cum præcedente, & aliis variis groſſulariæ ſpeciebus floret cum ſylveſtri.

GROSSVLARIA multiplici acino, ſive non ſpinoſa hortenſis, rubra, ſive ribes officinarum C. B. Pin. 455. Ribes vulgaris, acidus, ruber J. B. 2. 97. Ribes hortenſe Trag. Ribes Arabum Lob. Ribeſium fructu rubro & Ribes Serapioni Dodon. Vva urſi Galeni, Groſſularia rubra, Lugd. Ribes vulgaris baccis rubris Camerar. Varia adhuc nomina invenies apud Matthiolum, a Caſp. Bauhino edit, nec non in Tabernæmontano & aliis. Johannis-Beeren, Johannis-Träublein, quia plerumque circa feſt. Johannis matureſcunt. In hortis frequens reperitur, ut & rubris majoribus & albis baccis, ſ. fructu margaritis ſimili C. B. v. g.

GROSSVLARIA hortenſis majore fructu albo H. R. Pariſ. Ribes majore fructu albo. Germ Weiſſe Johannis-Beeren. In hortis paſſim floret Aprili. Fructu quoque carneo interdum proſtat.

GROSSVLARIA vulgaris, fructu dulci C. B. P. 455. Cluſ. hiſtor. 120. Ribes alpinus, dulcis J. B. 2. 98. Provenit in ſepibus bey Dornburg; copioſius vero auf dem

dem Enſels-Berge; copioſiſſimè bey Kuh-Cöllen an denen Hecken, & ubique fere in ſylvis am Hartze bey Hefeld, wie auch in Schmohniſchen Gebürgen und Hecken.

GROSSVLARIA non ſpinoſa, fructu nigro majore C. B. Pin. 455. Ribes niger vulgo dictus folio olente, J. B. Ribeſium fructu nigro Dodon. Pempt. 749. In hortis curioſorum v. g. zu Altenbergen, wie auch im Stadt-Graben hinter dem Collegio. Hujus frutex Germanis Gicht-Baum dicitur, illumque ſuperſtitioſe certis temporibus transplantant.

MELOCACTVS Indiæ occidentalis C. B. Melocactus echinatus Tabern. Echinomelocactus Lobelii. In hortis botanicis ſed rarius floret. Interius lanugine, quadam referta eſt hæc planta.

MELOCACTVS minor & lacteſcens cum præced.

MOMORDICA vulgaris Tournefort, Balſamina rotundifolia repens, ſive mas C. B. P. 306. Balſamina cucumeraria J. B. 2. 251. In horto medico floret æſtate; Fructum vero rariſſime perficit.

ELATERIUM Rivini, & officinarum. Cucumis ſylveſtris, aſininus dictus Tournefort. & C. B. P. 314. Cucumis ſylveſtris, ſive Aſininus J. B. 2. 248. Ex hac planta paratur Elaterium veterum, de quo vid. Theophr. Ereſius. Elaterium vero dicitur propter fructus, per maturitatem cum impetu a petiolo abrumpendi modum. In horto medico floret æſtate. Wilde Cucumern, Eſels-Kürbiß, Eſels-Gurcken.

CVCVMIS vulgaris, ſativus, maturo fructu ſubluteo & albo C. B. Pin. 310. Cucumis vulgaris, viridis & albus J. B. 2. 245. In hortis paſſim floret æſtate. Germ. Gurcken, Cucumern. An cucumis flexuoſus C. B. P. 310. ſive cucumis longiſſimus J. B. 2. 247. ſpecie differat a vulgari? an vero mangonio hortulanorum talis fiat? uti vult Matthiolus, aliis horticulturæ amatoribus inveſtigandum relinquo.

MELO vulgaris C. B. P. 310. Melones J. B. 2. 242. Melo, ſive Melopepo vulgo, cucumis Galeni. Dod. Pempt.

663 In horto S. Principis & aliis floret cum præcedente. Melonen.

MELO reticulatus J. B. 2. 244. propter corticem veluti reti obductum; cum præcedente.

PEPO oblongus C. B. P. 311. Pepo major, oblongus Dod. Pempt. 665. In hortis paſſim, ubi Kürbiſſe appellant. Differt vero a cucurbita pepo, non ſolum foliorum aſperitate, & floris colore, qui eſt croceus ſive luteus; in cucurbita vero albus: nec non fructus cortice minus duro, pariter atque cellulis, de quo vid. Tournefortius, non ſecus ac de reliquis diſtinctionibus melonis melopeponis &c.

PEPO vulgaris Raji Hiſt. 639. Cucurbita foliis aſperis, ſive Zucha flore luteo J. B. 2. 218. Cum præcedente. Cucurbita major, rotunda, folio aſpero C. B. P. 312.

PEPO rotundus, aurantii forma C. B. P. 311. Cucurbita aurantii forma Eyſtett. cum præcedentibus.

PEPO fructu pilæ palmariæ forma Tournefort. Cucurbita pila palmaria non multo major J. B. cum præcedentibus.

PEPO fructu minimo, ſphærico Tournefortii. Cucurbita aſpera, minima, ſphærica, crocea, variegata J. B. 2. 218. cum præcedentibus; ſed rarius.

PEPO fructu ſubrotundo, variegato Tournef. Inſtitut. p. 105. Cucurbita medio crocea J. B. 2. 222. cum præcedentibus.

PEPO fructu turbinato, variegato, Tournefort. Cucurbita aſpera, mediæ magnitudinis, turbinata variegati coloris J. B. 2. 222. cum præcedentibus.

PEPO fructu turbinato, albido Tournefortii. Cucurbitæ turbinatæ, majores, albæ J. B. 2. 222. cum præcedentibus.

PEPO fructu turbinato, ſubcroceo Tournefort. Cucurbita aſpera, turbinata, ſubcrocea J. B. 2. 223. cum præcedentibus.

PEPO fructu minimo, turbinato Tournefort. Cucurbita aſpera, minima, turbinata, pallida J. B. 2. 223.

PEPO

PEPO fructu parvo, pyriformi Tournef. Cucurbita aſpera, pvriformis, parva, alba J. B. 2. 223.

PEPO fructu ovato, flaveſcente Tournef. Cucurbita aſpera, ovalis, flavo colore J. B. 2. 323.

PEPO fructu ovato, flaveſcente alter Tournefort. Cucurbita aſpera, pugillaris ex rotundo oblonga J. B. 2. 223.

PEPO fructu ovato, variegato Tournef. Cucurbita ovalis fere variegata; parva J. B. 2. 218. Hæ aliæque peponis ſpecies, ſive varietates, variis in hortis paſſim coluntur florentque æſtate.

MELOPEPO clypeiformis C. B. P. 312. Cucurbita clypeiformis, ſive Siciliana, melopepon latus a nonnullis vocata J. B. 2. 214. Melopepo clypeatus Tabern. Icon. 470. In horto medico floret æſtate.

ANGVRIA citrullus dicta C. B. P. 312. Citrullus folio colocynthidis ſecto, ſemine nigro, quibusdam Anguria J. B. 2. 235. In hortis floret æſtate. Semina vero quæ rubra ſunt communiter, rarius matura.

CVCVRBITA longa, folio molli, flore albo J. B. 2. 214. Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli C. B. P. 313. Cucurbita longior Dod. Pempt. 669. In horto medico floret æſtate.

CLASSIS II.

DE PLANTIS FLORE REGVLARI DIPETALO GAVDENTIBVS.

STELLARIA aquatica Raji in Meth. emend. p. 93. Stellaria aquatica Lobel. icon. Fœniculum aquaticum, ſtellatum Tabern. In ſcrobibus & aquis ſtagnantibus frequens floret Julio. Floſculos habet in foliorum alis ex duobus corniculatis ſtaminibus, quæ petala complicata pariter

pariter bina ambiunt, conflatos, capſulam compreſſam, quatuor lineis altius impreſſis quadripartitam, folia ſummis aquis innatantia, conferta, ſtellam quodammodo referentia, unde nomen; quæ vero aquis immerſa, anguſtiora multo ſunt. Hujus plantæ accurata & graphica Deſcriptio vid. apud J. Bauhinum.

STELLARIA minor, foliis ſubrotundis, conjugatis. Lenticula paluſtris, bifolia, fructu retragono C. B. P. 362. Callitriche Plinii F. Columnæ. In locis, ubi per hyemem aquæ ſtagnarunt, cum plantaginella floret æſtate.

CIRCÆA Lutetiana Lob. Icon. 766. major Park. Solanifolia circæa dicta major C. B. P. 168. Ocimaſtrum verrucarium J. B. 2. 977. In ſylvis; copioſa circa Lipſiam in dem Roſenthal und Gonnewitzer-Holtz, bey Wittenberg in der Probſtey, und bey Gieſen im Stelzen-Morgen. Quæ vero in monte ſylvæ Thuringicæ altiſſimo vulgo der Enſels-Berg dicto occurrit, a ſequente, non niſi magnitudine differt.

CIRCÆA minima F. Columnæ in Ecphraſ. P 2. 80. Solanifolia circæa alpina C. B. P. 168. Im Walde, wo man nach der neuen Schencke nach Zölnitz gehet, und in denen Holtz-Schlägen zwiſchen Hummelshayn und der frölichen Wiederkunfft, auch auf der Walters-Wieſen hinter Prießnitz. Floret Junio Jul. & Auguſto. Occurrit etiam in horto medico.

CLASSIS III.

DE PLANTIS FLORE REGVLARI MONOPETALO GAVDENTIBVS.

I. Semine nudo unico.

LAPATHVM exoticum, folio ampliſſimo, inſtar foliorum braſſicæ. Rhabarbarum Tournefortii in hortis

tis floret Jun. & Jul. Cur hujus florem Tournef. monopetalum asserat, & non omnium aliorum Lapathorum similem, rationem non video.

LAPATHVM hortense, folio oblongo, sive secundum Dioscoridis C. B. P. 114. Lapathum sativum, Lapas J. B. 2. 985. Lapathum sativum Dod. Pempt. 648. In hortis variis floret æstate; Hanc speciem Tabern. in iconibus p. 434. Hippolapathum sativum appellat, a vulgo hortulanorum dicitur herba patientiæ, Germ. Das Kräutlein Patientia. it. Zitter-Wurtzel.

LAPATHVM folio acuto, plano C. B. P. 115. Lapathum acutum, sive oxylapathum J. B. 2. 983. & officinarum. Germ. Grind-Wurtz, oder Halb-Pferdt, Pferdts-Ampfer, halbe Säule, wilde Rhebarber. De hujus plantæ virtutibus contra scabiem vid. Sim. Pauli Botan. quadripartito, sed cutim. luteo tingit colore, non facile eluendo. In pratis agrisque frequens: floret Jun. & Jul.

LAPATHVM folio acuto, crispo C. B. P. 115. Lapathum acutum crispum J. B. 2. 988. & Tabern. icon. 436. cum præcedente.

LAPATHVM folio acuto, rubente C. B. P. 114. Lapathum sanguineum, sive sanguis Draconis herba J. B. Chabræi p. 310. Erythrolapathum Camerar. Epit. Matthiol. pag. 132. In horto medico cum præcedentibus.

LAPATHVM folio acuto, flore aureo C. B. 114. Lapathum anthoxanthon J. B. 2. 987. Lapathum sylvestre IV. genus Dalechamp. Lugd. 603. In locis humidis, bey Leipzig und Wittenberg, auch bey Gotha, und Kloster Lutschen, auch bey Karßdorff an der Unstruth, ubi per hyemem aquæ stagnarunt, floret Jul. & Aug.

LAPATHVM minimum C. B. P. 115. Tabern. icon. 437. Lapathum acutum, minimum J. B. 2. 985. Ad scrobes, sed rarius, floret cum præcedentibus.

LAPATHVM folio minus acuto C. B. P. 115. Lapathum vulgare, folio obtuso J. B. 2. 984. Ad scrobes & ad sepes locis humidis frequens v. g. in salicetis nach Wenigen-Jena zu, floret Jul. Hanc speciem Heucherus Novis Proventibus Hort. Med. Witenb. præfixit sub titulo Herbæ patientiæ.

LA-

LAPATHVM ſylveſtre magnum, vulgare J. B. Hipp lapathum ſylveſtre Tabern. Icon. 436. Ad ſcrobes großen Paradieß floret cum præcedentibus.

LAPATHVM maximum, aquaticum Chabr. p. 309. J. 2. Lapathum aquaticum, folio cubitali C. B. P. 116. L pathum paluſtre Tabern icon. 437. an denen Teichen bey Lobada. Floret cum præcedentibus. De hac planta vi Abraham Muntingius in Tr. peculiari, ſub tit. herbæ Bri tannicæ veterum.

LAPATHVM aquaticum, minus J. B. apud Chabr. p 309. Lapathum aquaticum, minus C. B. P. 116. Hydrolapathum minus Tabern. Icon. 438. Auf denen Wieſen bey Wenigen-Jena floret cum præcedentibus.

LAPATHVM hortenſe latifolium C. B. P. 115. Lapathum majus I. Rhabarbarum monachorum J. B. In hortis variis floret æſtate. Lapathi vocem longe pronunciandam eſſe volunt aliqui, non ſecus ac vocem ſcordium, quod Borrichio, Smetio aliisque Poëtis Medicisque ulterius indagandum relinquimus.

ACETOSA pratenſis C. B. P. 114. Oxalis vulgaris J. B. 2. 989. In pratis frequens floret Jun. Germ. Sauer-Ampfer, quaſi lapathum acidum dicas. Belgæ ſur vocant & differt a lappatho flaminibus a piſtillis communiter tota planta remotis.

ACETOSA foliis criſpis C. B. P. 114. cum præcedente, ſed rarius.

ACETOSA hiſpanica, maxima Camerarii; An acetoſa montana maxima C. B. P. 114. Oxalis ſylvatica maxima J. B. 2. 990. Im Fürſten-Garten floret cum vulgari.

ACETOSA arvenſis, lanceolata C. B. P. 124. In agris lapidoſis nach Rode und Hummelshayn zu, floret Majo. Foliis valde variat, hinc tot figuræ apud Tabern. quandoque & hamis deſtituuntur, hinc acetoſa arvenſis minima, non lanceolata, C. B. P. 114. Oxalis minima II. Tabern. icon. 441.

ACETOSA americana foliis longiſſimis pediculis donatis C. B. P. 114. Prodr. 54. Oxalis africana J. B. 2. 992.

Ace-

Acetoſa veſicaria peregrina Eyſtett. In horto medico floret Jun.

ACETOSA arboreſcens, ſubrotundo folio, ex Inſulis fortunatis Plükenet. Almageſt. Botan. & Phytograph. Tab. 252. In horto medico floret Majo.

ACETOSA rotundifolia, hortenſis C. B. P. 114. Oxalis, folio rotundiore, repens J. B. 2. 991. Oxalis rotundifolia Dod. Pempt. 649. In hortis frequens floret Jun.

II. Seminibus nudis ternis.

TRIGLOCHIN Rivini. Juncago Tournefort. Gramen junceum, ſpicatum, ſeu Triglochim C. B. P. 6. Hyacinthi parvi facie gramen triglochin J. B. 2. 508. In pratis juxta ſemitas cum junco bufonio frequens v. g. im groſſen Paradieß und nach Ziegenhayn. Floret Jun.

TRIGLOCHIN maritimum fructu breviore & craſſiore. Gramen maritimum ſpiatum alterum Lob. icon. 17. Gramen ſpicatum alterum C. B. P. pag. 6. Triglochin vocatur a ſeminibus nudis ternis, inſtar ſagittæ barbatæ a bauſi ad apicem dehiſcentibus. vid. fig. in Domin. Chabræi Sciagraph. ſtirpium. Ad lacum ſalſum (an der ſalzigten See bey Langenbogen) frequens floret cum vulgari, cum quo Tournefortius confudit.

III. Seminibus nudis plurimis.

ALISMA Rivini & Cordi. Plantago aquatica latifolia C. B. P. 190. Ranunculus paluſtris, plantaginis folio ampliore Tournefort. Inſtit. p. 292. In paluſtribus frequens floret Junio. Waſſer-Wegerich, Froſch-Löffel-Kraut.

Obſ. Aliſma & Sagitta a Tournefortio ſunt relata ad ranunculos, ſed reclamat flos reg. tripetalus conſtanter, qui in aliis ranunculi veri ſpeciebus eſt tetrapetatus, propterea non ſunt confundendæ plantæ hanc florum conſtantem diverſitatem obſervantes. Tournefortius enim non ſolum has plantas, ſed et Adonidem atque hepaticam, chelidoniumque minus affic. huic admiſcuit, quamvis notiſſimum ſit, quod hæ plantæ florem habeant reg. polypetalum, non ſecus ac nemoroſa.

ALI-

ALISMA anguſtifolium. Ranunculus paluſtris, plantaginis folio anguſtiore Tourneſort. p. 292. Plantago aquatica, anguſtifolia C. B. P. 190. Plantago aquatica minor Tabernæm. Icon. 374. cum præcedente.

SAGITTA aquatica, major C. B. P. 194. Sagitta J. B. 3. 789. Sagitta major Tabernæm. icon. 743. In aquis ſtagnantibus bey Löbſtädt und Wenigen-Jena, auch bey Kunitz, und im großen Paradieſe. Floret Jun. & Jul. Hujus radix eſt gramen bulboſum, aquaticum C. B. Prodr. uti recte obſervavit Joh. Rajus in ſupplemento hiſtor. plantar. & apud Japones eſculenta eſt, uti teſtatur Kæmpferus amœnit. exot. faſcic. V. pag. 827. ſub nomine Boſſai.

SAGITTA aquatica minor, latifolia C. B. P. 194. Sagitta J. B. 3. 789. Sagitta minor Tabern. icon. 743. Ranunculus paluſtris, folio ſagittato, minore Tournefort. Inſtit. p. 294. cum præcedente.

SAGITTA aquatica, minor, anguſtifolia C. B. P. 194. Sagitta minor, anguſtifolia J. B. 3. 790. Tabernæm. Icon. 744. Ranunculus paluſtris, folio ſagittato, anguſtiore Tournefort. cum præcedentibus, a quibus forſan ſpecie non differt.

IV. Seminibus tectis capſula.

(1) TRIPARTITA.

TRADESCANTIA, ſive Ephemerum Virginianum. Ephemerum virginianum, flore cœruleo, minore Tournefort. p. 368. Phalangium ephemerum, virginianum Johannis Tradeſcanti Parkinſ. Parad. 15. Allium, ſive Moly virginianum C. B. Pin. Append. p. 516. Im Fürſten-Garten floret Majo & Jun. Floris colore variat, hinc Ephemerum virginianum flore candido, mox cœruleſcente Tournefortii c. l. Phalangium virginianum, flore candido, mox cœruleſcente Hoffmanni Flor. Aldorff. Ab hac planta omnino differt ephemerum Africanum Hermanni, quod florem habet irregularem tripetalum, & quod Plumerius ſub nomine Commelinæ exhibuiſſe videtur, quas plantas etiam Tournef. & Rajus confundunt. Vid. Paulus Herm.

MORSVS

MORSVS ranæ foliis aſari. Nymphæa alba, minima C. B. Pin. pag. 193. in aquis ſtagnantibus & foſſis bey Leipzig, Wittenberg und Franckfurth am Mäyn frequens, floret tota æſtate. Fructus hujus plantæ raro deprehenditur, ſed obſervavit Tournefortius, hanc plantam duplicis generis flores proferre, alteros quidem ſteriles, alteros vero fœcundos, & eos quidem tota planta ab invicem remotos; vide Johrenii vade mecum botanicum & Knauthium.

Huc ſpectat juxta Johrenium aloë aquatica C. B. quæ in ſtagnantibus Bataviæ & foſſo Virtenbergenſi frequens eſt prope portam Elſter-Thor dictam.

(2) CAPSVLA SEXPARTITA.

ASARVM Dioſcoridis, & officinarum ut & J. B. 3. 548. In ſylvis paſſim v. g. im rauhen Thale und im Coſpidaiſchen Holtze, floret Aprili. Germ. Haſel-Wurtz. Aſarum Europæ provinciis commune, nullas agnoſcit varietates, & ſolum foliorum magnitudine ludit. De Aſaro vero Virginiano vid. S. Dale.

V. Seminibus tectis bacca.

CHAMELÆA tricoccos C. B. Pin. 462. J. B. 1. 548. Chamelæa Dodon. Pempt. 363. In hortis aliquando cultæ obvia floret Majo.

CLASSIS IV.

DE PLANTIS FLORE REGVLARI TETRAPETALO GAVDENTIBVS.

I. Semine nudo unico.

TRIBVLOIDES Tournefort. Tribulus aquaticus. C. B. τριβολος ὑδρος Dioſc. Germ. Stachel-Nüſſe, Waſſer-Nüſſe, in ſtagnis & piſcinis bey Wittenberg und Coßwick; auch im Vogtlande; floret Jun. vid. Hort. Malabar. ubi etiam hujus plantæ figura reperitur, ſed ſine flo-

re & fructu, & Camerar. Epit. Matthiol. p. 333. Copioſa eſt hæc planta bey Altenburg und Ronneburg, auch bey Weida, unde ipſius fructus venales aliquando apportantur. Magnitudine fructus variat; fructus ſucceſſive maturantur, non ſimul omnes, & pariter ſucceſſive diverſis vicibus colliguntur.

GLASTVM, ſive Iſatis. Iſatis ſativa, vel latifolia C. B. Pin. 113. Iſatis ſive glaſtum ſativum J. B. 2. 909. Iſatis ſativa Dod. Pempt. 79. In agris Thuringiæ quondam copioſum ſerebatur, poſtquam vero Anil, ſive Indigo uſus invaluit, ceſſavit maximam partem glaſticultura. Weid. Ex hac planta paratur Color cæruleus, germanis Weid-Farbe dictus, ſed quia hodie ex Oriente advehitur color Indigo dictus, uti memini, multum eviluit hujus coloris prætium. Floret Junio. Alias ex hac planta paravit Sal volatile copioſum B. Wed. qui vid. in ſingulari Tractatu de volatilitate Salis Tartari.

ISATIS ſylveſtris, vel anguſtifolia C. B. P. Iſatis, ſive glaſtum ſpontaneum J. B. 2. 909. Iſatis ſylveſtris Dodon. Pempt. 79. In aſperis, v. g. auf dem Fuchs-Berge, it. an der hohen Saale. Floret Majo & Jun.

SANGVISORBA MAJOR, pratenſis. Pimpinella ſanguiſorba major C. B. Pin. 160. Sanguiſorba major, flore ſpadiceo J. B 3. Part. 2. 120. Pimpinella, ſive ſanguiſorba major Matthioli 1033 In pratis v. g. wo man nach Cunitz gehet, floret æſtate. Germ. Blut-Kraut, Biebernell, Wieſen-Knöpffe.

SANGVISORBA canadenſis, flore albo, ſpicato. Sanguiſorba major, americana, flore albo, ſpicato Broſſ. Pimpinella maxima, canadenſis Cornuti 174. In hortis Curioſorum floret æſtate.

SANGVISORBA minor, montana, lævis, hirſuta. Pimpinella ſanguiſorba, minor C. B. P. 160. In montoſis, aſperis & apricis paſſim, vinearumque limitibus floret æſtate. Colitur etiam in hortis, & vini cyathis injicitur, propter odorem vinoſum, & gratum.

ALCHTMILLA vulgaris C. B. P. 319. Cluſii Hiſt.

CVIII.

CVIII. Pes leonis vel alchymilla J. B. 2. lib. 17. 598. Alchymilla Dodon. pempt. 140. In paſcuis & ſylvis v. g. im Rauhen-Thal und Cluſewitzer-Holtze, floret Majo. Marien-Mantel, unſer lieben Frauen Nacht-Mantel, Löwen-Fuß und Sinau.

ALCHTMILLA montana, minima F. Columnæ Part. 1. 146. Chærephyllo nonnihil ſimilis C. B. P. 152. Percepierre Anglorum quibusdam J. B. 3. p. 2. 74. In agris bey dem Lufft-Schiffe und bey Cloſewitz, floret Junio & Julio.

ALCHTMILLA alpina, folio ſericeo, inſtar pentaphylli profunde ſecto. Alchymilla argentina Camerar. Epit. Matthiol. pag. 411. In hortis Curioſorum floret Jun. vid. Cluſius hiſt. plant. rar. um das Rauhenthal.

PASSERINA Tragi & J B. 3. 456. Thymelæa linariæ folio vulgaris. Tournefort Inſtit. p. 594. Lithoſpermum linariæ folio Germanicum C. B P. 259. In agris lapidoſis & montoſis v. g. im Rauhenthal und gegen Spitzna-ſens Guthe über floret Jul. & Aug. Sed male refertur ad Thymelæas ſive Lauceolas a Tournef.

II. Seminibus nudis quaternis.

POTAMOGETON rotundifolium C. B. P. 193. Potamogeton rotundiori folio J. B. Fontalis major latifolia vulgaris Park. Germ. Saam-Kraut. In aquis ſtagnantibus v. g. im Teiche um Rudersdorff, auch um denen Teichen bey Ammerbach und Krippendorff. Potamogeton dicitur ἀπὸ τῦ ποταμῦ fluvio, & γείτων vicinus, quia fluviis delectatur omne potamogeton, alias etiam a quibusdam ſpicata dicitur; quia ſpicas ſupra aquam erigit. Floret Maj. & Jun.

POTAMOGETON alpinus, plantaginis folio Tournefort. Fontinalis lucens major J. B. 2. 776. Potamogeton foliis latis, ſplendentibus C. B. P. 194. cum præcedente auf denen Kleiniſchen und Ruderdorffiſchen Teichen.

POTAMOGETVM alterum Dodon. Chabr. pag. 563. quaſi perfoliatum. Cum præcedentibus.

POTAMOGETVM foliis auguſtis, ſplendentibus C.

B. P. 193. in Graben im groſſen Paradieß, ohnweit Wellnütz, floret Jul.

POTAMOGETON longo ſerrato folio C. B. Pin. pag. 193. Lapathum fluitans, longo, ſerrato folio J. B. 2. 988. in fluviis & torrentibus, v. gr. in der Ilm:, und in der Nidela florer Jun.

POTAMOGETON foliis criſpis, ſive lactuca ranarum C. B. P 193. Tribulus aquaticus, minor Cluſii Pannon. & Hiſt. Fontinalis criſpa J. B. Auf denen Raths-Teichen zwiſchen dem Löber- und Johannis-Thore, auch an der Saal bey der Raſen-Mühl. Floret Majo.

POTAMOGETON anguſtifolium, caule compreſſo, folio graminis canini. Potamogeton caule compreſſo, foliis graminis canini Raji 189. vid. Merret. in Pinace; In aquis ſtagnantibus zwiſchen Zöllnütz und Laaßdorff.

BOTAMOGETON puſillum, gramineo folio, caule rotundo Raji Hiſtor. 190. Auf dem Teiche bey Wenigen-Jena, in pratis, floret Jun.

POTAMOGETON gramineum, ramoſum C. B. P. & Prodr. p. 101. In dem Mühl-Graben bey der Papier-Mühle, wie auch in der Leiter, quod eſt rivulus ſ. torrens molas Jenenſium ante portam circumagens, & cuidam Jenenſium plateæ nomen largiens. Floret Jul.

POTAMOGETON capillaceo folio, floſculis ad foliorum alas. Potamogiton capillaceum, capitulis ad alas trifidis C. B. Prodr p. 101. graminifolia aquatica, corniculis tribus, quatuorve ad foliorum alas Joh. Raji in hiſtor. plant. & methodo. In der Leiter, wie auch in einem kleinen lacu zwiſchen dem Rauenthal und der Zißkau, floret Jul.

POTAMOGETON foliis pennatis Tournefort. & Merret. in Pin. Millefolium aquaticum, pennatum, ſpicatum C. B. Pr. 73. Millefolium pennatum aquaticum J. B. 3. 783. Germ. Säuſam. quia folia ſetas porcinas aliquatenus referunt, in der Saale bey der Raſe-Mühlen und zwiſchen der Schneide-Mühlen und Kamsdorff, floret Jul. copioſiſſime in piſcinis Kerſchavienſibus.

POTA-

POTAMOGITON foliis, pennatis, alterum & ſurrectius ad nodos florens. Millefolium aquaticum, floſculis ad foliorum nodos C. B. Myriophyllum aquaticum minus Cluſ. pann. & hiſt. in ſtagnantibus aquis bey Wenigen Jena und Kunitz floret Jun. & Jul. Tournefortio in inſtitutionibus dicitur Potamogeton floſculis ad foliorum nodos pag. 233.

CISSAMPELOS, ſive Malaccociſſos. Clematis hederæ folio, flore minore herbaceo Ammanni p. 342. Hedera Virginiana H. L. B. In horto medico floret Jun. radices habet flavas & ſarmentoſas.

TORMENTILLA ſylveſtris C. B. P. 326. Tormentillà J. B. 2. 598. Dodon. Pempt. 118. & officinarum. Flores habet communiter tetrapetalos & ſemina nuda quaterna; ſi vero aliquando contingat, quinis illam luxuriare petalis, tunc & ſemina quina producit, alias & flore, & fructu cum pentaphyllo magna eſt affinitas, ſed quoniam numero petalorum floris inter ſe differunt; cum tormentillæ flos ſit reg. tetrapetalus, Pentaphylli ſ. quinquefolii vero reg. pentapetalus, præſtat has plantas ſeparare, non ſecus ac ranunculum & thoram, quæ hujus etiam eſt loci; ſiquidem teſte figura Joh. Bauhini & Dominici Chabræi florem habeat reg. tetrapetalum. In ſylvis v. g. auf dem Forſt, floret Jul. Tormentill-Wurtzel, Terpentin-Wurtzel inepte.

TORMENTILLA radice repente Tournef. Pentaphyllum viride, minus, flore aureo, tetrapetalo, radiculas in terram e geniculis demittens Moriſ. Hiſtor. Oxon. P. 2. 190. In ſylvis hinter Hanſpitzen, und noch häuffiger nach Hummelshayn in ericetis. Jul. & Aug.

THORA major Camer. Epit. Matth. p. 382. Ranunculus Aſphodeli radice major. Dalech. 1736. & Lobel. 263. Thora folio cyclaminis I. B. Aconitum Pardalianches primum ſeu Thora major C. B. Wolffs-Wurtz, Leoparden-Wurtz. In hortis Curiorum flor. Maj. & Jun. it. in montibus Helveticis reperitur.

III. Seminibus nudis plurimis.

FLAMMVLA Dod. Pempt. 404. Clematis, ſive flam-

mula ſcandens, tenuifolia alba J. B. Chabr. p. 117. Clematis, ſive flammula repens C. B. P. 300. bey Wittenberg und Roßlau. In dumetis. Jun. & Jul.

FLAMMVLA ſurrecta. Clematis, ſive flammula ſurrecta alba, Flammula Jovis quibusdam J. B. Chabr. p. 117. Flammula recta C. B. Pin. 300. In horto medico, floret Junio, Brenn-Kraut, Brenn-Wurtz, Blatter-Zug, aquam ex hac & præcedente planta deſtillatam eſſe valde acris & urentis ſaporis teſtatur Camerar. Epit. Matthiol. pag 327.

FLAMMVLA ſepium, foliis integris. Clematis ſylveſtris, latifolia, ad atraginem Theophraſti referenda C. B. Pin. 300. Clematis latifolia integra J. B. 2. 125. ad ſepes paſſim, floret Jun.

FLAMMVLA ſepium, foliis dentatis. Clematis latifolia, dentata J. B. Chabr. p. 116. cum præcedente. Hujus utriusque ſemina inſtar cujusdam plumacei vel ornamenti pennati tota hyeme ſepibus & dumetis adhærent. Germ. Lienen, Reb-Binden, Ree-Binden, Wald-Reben. Flammula differt a clematite ſeminibus caudatis.

FLAMMVLA pannonica, erecta, folio vincetoxici, flore amplo. Clematis pannonica ſurrecta, flore cœruleo J. B. Chabr. p. 118. Clematis cœrulea erecta C. B. P. 300. vid. hujus plantæ elegans deſcriptio & figura in C. Cluſ. hiſt. plant. per Pannoniam naſcentium pag. 293. In horto medico & S. Principis floret Jun.

CLEMATIS flore ſimplici. Clematis, ſive flammula, flore purpureo & cœruleo ſcandens J. B. Chabr. p. 117. Clematis a flammula differt ſeminibus non pappoſis, quæ in flammula ſunt quodam pappo criſtato; In horto medico floret Jun & Jul.

CLEMATIS purpurea flore pleno, ſcandens Chabr. p. 117. Clematitis cœrulea, flore pleno C. B. P. 301. In hortis floret cum præcedente: Semina hujus plantæ non ſunt pappoſa, adeoque recte ſeparatur a flammula.

THALICTRVM pratenſe, majus Thalictrum pratenſe, anguſtifolium C. B. Pin. 337. J. B. 3. 487. In pratis an der Unſtruth bey Laucha cum lathyro paluſtri & ſcordio, auf denen Oberdorffiſchen Wieſen. Floret Junio. Wieſen-Raute.

THA-

THALICTRVM montanum, anguſtifolium. Thaliſtrum minus C. B. P. 237. In vineis, montiumque pratis paſſim floret Jun. v. gr. auf dem Hauß-Berg und Gleiß-Berg.

THALICTRVM majus, flavum, ſtaminibus luteis, vel glaucofolio C. B. Pin. 336. Thaliſtrum ſpecioſiſſimum, glaucum, ſemine & caule ſtriato J. B. 3. 486. in hortis Curioſorum floret Majo. Hujus radicem quidam rhizopolæ inepte pro rhabarbao venditant.

THALICTRVM alpinum, aquilegiæ foliis, florum ſtaminibus purpuraſcentibus Tournef. Thaliſtrum majus, folliculus anguloſis, caule lævi J. B. 3. 487. Peganum quorundam, in horto Sereniſſ. Princ pis floret Majo.

THALICTRVM majus, ſiliqua anguloſa aut ſtriata C. B. Pin. 336. Thaliſtrum nigrius, caule & ſemine ſtriato J. B. 3. 486. In horto medico floret Majo.

IV. Seminibus tectis capſula.

(1.) SIMPLICI.

PAPAVER hortenſe, ſemine albo, ſativum Dioſc. album Plinio. C. B. P. 170. Papaver album J. B. 3. 390. Papaver album, ſativum Lobelii icon. 272. In hortis & agris cum ſequentibus v. g. bey Zwetzen, floret æſtate. Germ. Mohnen, Mag-Saamen, Mohn.

PAPAVER hortenſe, nigro ſemine, ſylveſtre Dioſc. nigrum Plinio C. B. P. Papaver nigrum, ſativum Dodon. Pempt. 445. cum præcedente; aliquando & in hortorum purgamentis tanquam ſpontaneum occurrit.

PAPAVER hortenſe, flore pleno, violaceo Hort. Reg. Pariſ. Cum præcedentibus.

PAPAVER hortenſe, flore pleno, dilute violaceo Hort. Reg. Pariſ. cum præcedentibus.

PAPAVER criſtatum, floribus & ſemine album C. B. P. 171. Papaver fimbriatum, aut criſtatum, album Lob. icon. 273. Papaver fimbriatum, flore albo J. B. 3. 391. In agris & hortis circa Zwetzen, ut & im Fürſten-Garten.

PAPAVER criſtatum, floribus ex albo & rubeo mixtis

C. B. P. 171. Hæ aliæque papaveris ſpecies, an varietates? in hortis paſſim coluntur, de quibus vid. Tournefort. Inſtitut. p. 231.

PAPAVER erraticum majus, ῥοιὰς Dioſcoridi, Theophraſto, Plinio C. B. P. 171. Papaver erraticum, rubeum, campeſtre I. B. 2. 395. In agris frequens Jun. & Jul. Germ. Klapper-Roſen, Klatſch-Roſen.

PAPAVER erraticum, pleno flore C. B. P. 171. Argemone multiplex Tragi 119. In hortis, ubi florum colore pulcherrime ludit, nempe miniato, ſanguineo, purpureo, carneo, niveo ſolo, carneo per limbum albo &c. floret cum præcedente.

PAPAVER erraticum, minus C. B. P. Tabernæm. icon. 575. In agris præcipue montoſis & lapidoſis, floretque Jun. & Jul.

PAPAVER erraticum, capite longiore, hiſpido Tournefort. Inſtit. p. 238. Argemone capitulo longiore C. B. P. 172. Lobel. Icon. 276. Argemone capitulo longiore, ſpinoſo I. B. 3. 396. In agris v. g. um Zwetzen. Jun.

PAPAVER erraticum, capite longiſſimo, glabro Tournef. Argemone capitulo longiore, glabro. Moriſ. H. R. Bleſ. In agris & inter ſeges nach Sultze und Eckardsberge zu, floret Jun. Hujus capitula ab inſectis corrupta ſæpe monſtroſa intumeſcunt.

GLAVCIVM flore luteo Tournefort. Papaver corniculatum luteum I. B. 3. 398. Papaver corniculatum majus Dodon. Pempt. 441. Gehörnter Mag-Saamen. In horto Medico floret Jun. & Jul.

GLAVCIVM hirſutum, flore phœniceo Tournefort. Inſtit. Papaver corniculatum, phœniceum, hirſuto folio J. B. 3. 399. Papaver corniculatum, phœniceum, hirſutum C. B. P. 171. cum præcedente.

CHELIDONIVM, ſive chelidonia J. B. 3. 482. Chelidonium majus Dod. Pempt. 48. Chelidonium vulgare majus C. B. P. 144t Ad ſepes & muros paſſim floret Majo. German. Schell-Kraut, Gold-Wurtz, ab aureo ſ. croceo radicis colore & ſucco.

RAPHANISTRVM flore albo ſtriato, provenit copioſum

ſum in agris verſus Lichain, ubi radices habet ſatis craſſas. Hæc eſt Lampſana veterum, quæ C. Bauhino in Pin. pag. 95. dicitur Rapiſtrum flore albo, ſiliqua articulata, a qua parum differt Lampſana Apula Fabii Columnæ. Hac paſti ſunt milites Julii Cæſaris, a Cneji Pompeji militibus in anguſtias redacti, in campis Macedoniæ.

RAPHANISTRVM ſegetum, flore luteo, vel pallido Tournefort. Rapiſtrum flore luteo, ſiliqua glabra, articulata Raji Hiſt. 805. In agris frequens zwiſchen Lobada und der neuen Schencke, floret Junio, Jul. & Aug. Germ. Hederich.

RAPHANISTRVM ſiliqua articulata, glabra, majore & minore Moriſ. Hiſtor. Oxon. p. 2. 265. Rapiſtrum flore albo ſtriato, ſinapi agreſte, album Trago J. B. 2. 851. cum præcedente, ſed rarius. Iſt häuffig bey Gießen und Lich.

RAPHANISTRVM diſpermum; Raphaniſtroides Knauthii. Rapiſtrum monoſpermum C. B. Prodr. 37. In agris bey Bieber, Rulßdorff und Helffta Jul. Recte obſervavit Moriſonus, hanc plantam habere geminos articulos & in ſingulo articulorum ſemen ſingulum, adeoque non mereri cognomen monoſpermi. An vero novum genus a raphaniſtro diverſum, ſub titulo Raphaniſtroides mereatur? dubito.

RAPHANVS major, orbicularis vel rotundus C. B. P. 96. Raphanus, ſive radicula ſativa Dod. pempt. 679. floribus purpureis & candidis variat, coliturque præcipue circa Erfurtum, floretque Jul. Rettich, Radieß.

RAPHANVS major, oblongus, cortice & albo & nigro; an hunc ſub raphano nigro intellexerit C. B. non capio. Hoc nihil vulgatius in agris noſtris um Zwetzen herum, und bey Erfurth, cum præcedente floret.

RAPHANVS minor, oblongus C. B. Radicula ſativa minor Dod. pempt. 676. in hortis variat. Vere ſeritur & vulgo Radießgen, quaſi parvus raphanus vocatur. Floret Majo.

CHRTSOSPLENIVM foliis amplioribus, auriculatis Tournefort. Saxifraga rotundifolia, aurea C. B. P. 309. Saxifraga aurea Dod. J. B. 3. 707. In paluſtribus & umbroſis

brosis v. g. bey Scheitz und Kleine, it. bey Laaßdorff in Wäldern und ſchattichten Waſſer-Fällen. Aprili. Hæc planta a multis pro venenoſa habetur, ob acrimoniam, qua pollet.

SPERGVLA perennis, repens, folio gramineo læte virente. Alſine puſilla, graminea, flore tetrapetalo. Saxifraga graminea, puſilla, flore parvo tetrapetalo Raji Hiſt. 1026. Caryophyllus minimus, muſcoſus noſtras. Parckinſ. Theatr. 1340. In ſaxis aſpergine rorida madidis v. g. bey der Schneide-Mühle unter der hohen Saale, cum Lichene hepatico ſtellato floret Jun. & Jul. Petala habet fugaciſſima, quæ raro conſpiciuntur; uti recte obſervavit Tournefortius in hiſtoria plantarum circa Pariſios naſcentium, hinc nomen Alſines flore fugaci, quadripetalo ab illo accepit.

SPERGVLA graminea, annua, foliis obſcure virentibus, flore tetrapetalo. Saxifraga anglicana, annua, alſinefolia D. Plot. Hiſt. Oxon. Auf der Wellmeſe in alten Baum-Stöcken, floret cum præcedente, a qua differt teneritate omnium ſuarum partium, nec non quod ſit erecta, obſcurius virens & annua.

SPERGVLA unicaulis, puſilla, foliolis latiuſculis acutis. Alſine puſilla, pulchro flore, folio tenuiſſimo, noſtras, ſeu ſaxifraga caryophylloides puſilla, flore albo, pulchello Raji Hiſt. 1033. In apricis bey Cala, und bey Gießen ad aggeres tenui gramine veſtitos frequens eſt, v. gr. um den Venus-Berg und das ſo genannte philoſophiſche Wäldgen, Aprili.

(3) BIPARTITA

(α) *Longiori ſive Siliqua.*

BRASSICA capitata alba C. B. P. 111. J. B. 2. 826. In hortis & agris paſim colitur, floretque Majo. Kohl, Kohl-Kraut, Kappis-Kraut, Haupt-Kraut.

BRASSICA alba, vel viridis C. B. P. Braſſica alba vulgaris J. B. 2. 829. cum præcedente. Ex hac conciſa paratur braſſica muria condita; Sauer-Kraut.

BRAS-

BRASSICA alba, criſpa C. B. c. l. Braſſica ſubauda, rugoſa J. B. c. l. Braſſica ſubauda Dodon. pempt. 624. Wirſching, cum præcedentibus.

BRASSICA capitata rubra C. B. P. J. B. 2. 831. Dod. Pempt. 621. cum præcedentibus. Hæc ad acetaria paranda maxime præ cæteris expetitur. Germ. Rother Kopff-Kohl.

BRASSICA gongylodes C. B. P. 111. Braſſica caulorapa J. B. 2. 829. Braſſica caule rapum gerens Dodon. Pempt. 625. Kohl-Raben, quaſi Kohl-Rüben, quia naturæ quaſi mediæ videtur inter caulem ſive braſſicam & rapum. In agris frequens cum præcedentibus.

BRASSICA radice napi, ſive non cauleſcens. Napobraſſica C. B. Pin. & Prodr. Germ. Kohl-Rüben unter der Erde. Seritur in agris bey der neuen Schencke, und bey Zwetzen, & floret cum præcedentibus.

BRASSICA fimbriata C. B. P. 112. Braſſica criſpa, laciniosa J. B. 2. 832. Braſſica tophoſa Tabern. icon. 401. Hæc pariter Germanis Wirſching dicitur.

BRASSICA ſelenifia, latifolia.

BRASSICA ſelenifia, anguſtifolia. Hæ pariter paſſim ſeruntur. v. g. bey Zwetzen.

BRASSICA cauliflora C. B. c. l. Braſſica multiflora J. B. 2. 828. Braſſica florida, botrytis Lobel. Icon. 245. In hortis colitur; Semina vero hic terrarum rarius perficit, ex Italia quotannis deferenda. Germ. Blumen-Kohl, & Chartiviol.

BRASSICA arvenſis C. B. P. 112. Braſſica rubra minor J. B. 2. 833. Braſſica ſylveſtris, crambe dicta Dodon. Pempt. 623. Schnitt-Kohl. Hæc non facile more reliquarum braſſicarum cauleſcit, ſed more ſpinachiæ ſecatur: In hortis, & agris, ſed rarius; frequentius bey Coburg.

BRASSICA campeſtris, perfoliata, flore albo C. B. P. 112. Perfoliata ſiliquoſa J. B. 2. 835. Braſſica campeſtris I. Cluſii Hiſt. CXXVII. In agris paſſim floret Majo & Junio.

BRASSICA alpina, perennis Tournefort. Inſtit. p. 220. In montibus noſtris frequens v. g. auf dem Cunitzer-Berge, &

& alibi floret Majo; præcedenti multum ſimilis eſt, ſed perennis. Poſſent hæ ſpecies ad turritim referri.

KEIRI incanum majus C. B. P. 200. Leucojum hyemale & diu durans, etiam album J. B. 2. 874. In hortis paſſim ubi Stangen-Leucojen, Stangen-Violen appellant. Majo.

KEIRI purpureum vel rubrum C. B. P. 200. Leucojum hyemale, & diu durans, purpureum & roſeum J. B. 2. 874. Leucojum purpureum Tabern. Icon. 309. cum præcedente. Interdum flore albo variat.

KEIRI incanum majus, coccineum. Leucojum incanum majus, coccineum Moriſon. Hiſt. Oxon. p. 2. 240. Cum præcedentibus, ſed rarius.

KEIRI incanum minus. Leucojum incanum minus C. B. P. 200. Leucojum æſtivum, flore purpureo & roſeo, & albo, J. B. 2. 875. Leucojum minus & annuum Dodon. Pempt. 159. Cum præcedentibus.

KEIRI flore albo, odoratiſſimo, folio. Leucojum album, odoratiſſimum, folio viridi C. B. P. 202. Leucojum hyemale, diu durans, flore albo, folio viridi & livido, glabro J. B. c. l. In hortis, ſed rarius.

KEIRI luteum, maximum, foliis tuberculis obſitis. Leucojum luteum maximum, foliis tuberculis obſitis C. B. P. 202. In hortis floret Aprili & Majo.

KEIRI luteum, magno flore. Leucojum luteum, magno flore C. B. P. 202. a præcedente parum vel nihil differt; hujus petala exterius rutilant. Hortulani gülden Lack, ut & præcedentem vocant.

KEIRI luteum vulgare. Leucojum luteum vulgare C. B. c. l. Leucojum luteum, vulgo cheiri flore ſimplici J. B. 2. 872. In hortis frequens Aprili & Majo. Hujus flores officinas ingrediuntur. Gelbe Violen, naſcitur etiam in muris Jenenſibus, forſan aliquando ibidem excultum.

KEIRI luteum pleno flore majus C. B. c. l. Leucojum luteum pleno J. B. 2. 873. In hortij variis & ante feneſtras floret Aprili & Majo.

KEIRI flore luteo, pleno, minore. Leucojum luteum, flore pleno, minus, C. B. c. l. Viola petræa, lutea,

lutea, multiplex Tabern. icon. 306. In hortis cum prioribus.

KEIRI majus, flore pleno ferrugineo &

KEIRI majus, flore pleno ex purpureo colore & aureo vario; cum præcedentibus.

KEIRI ſylveſtre, foliis hieracii. Leucojum luteum, ſylveſtre, hieracifolium C. B. Prodr. p. 102. In dumetis über dem Teuffels-Loch, und an dem Fuchs-Berge in vineis, bey der Schneid- und Raſen-Mühlen. Floret Aprili.

HESPERIS hortenſis C. B. P. 202. Viola matronalis Geſneri hort. Dodon. & vulgi hortulanorum. Heſperis tertia Cluſii Hiſt. Icon. In hortis frequens flore candido, dilute purpureo, rubro, eoque vel ſimplici vel purpureo, rubro, eoque vel ſimplici vel pleno, ſuaviſſime olente, præcipue ſi albus fuerit, variat. Floret Aprili & Majo.

HESPERIS hortenſis, flore viridi C. B. c. l. Heſperis hortenſis, flore viridi, ſeu abortivo Moriſ. Hiſt. Oxon. p. 2. 251. cum præcedente v. g. Im Fürſten-Garten.

HESPERIS montana, pallida, odoratiſſima C. B. P. 201. Heſperis colore inelegante J. B. 2. 879. Heſperis I. Cluſii Hiſt. pag. 296. In hortis variis floret Majo & Jun. Germ. Nacht-Violen.

ALLIARIA Matthioli. Heſperis allium redolens Moriſ. Hiſt. Oxon. p. 2. 252. Ad ſepes paſſim floret Majo. Germ. Knoblauchs-Kraut, Leuchel.

TVRRITIS foliis inferioribus cichoraceis cæteris perfoliatæ Tournefort. Inſtit. p. 224. Braſſica ſylveſtris, foliis circa radicem cichoraceis Tournefort. C. B. P. 112. Glaſtifolia cichoroides I. B. Turrita major Plateau Cluſ. Hiſt. CXXVI. Ad ſepes bey Städtgen Roda floret Majo. Tournefortius, uti inſpicienti patebit, ex una hac planta duas fecit. Thurm-Senff, Thurm-Kraut, Thurm-Kohl.

TVRRITIS vulgaris, ramoſa Tournefort. Burſæ paſtoris ſimilis, ſiliquoſa, major, ſeu majoribus foliis C. B. P. 108. Piloſella ſiliquata Thalii Tab. 121. Burſa paſtoris, ſive piloſella ſiliquoſa J. B. 2. 870. In agris variis in locis v. g. Zwiſchen Cluſewitz und dem Pfarr-Höltzgen. it. Bey

Laaß,

Laaßdorff und Roda, floret Aprili & Majo; Interdum etiam Autumno refloret.

TVRRITIS Leucoji folio Tournef. Myagrum siliqua longa C. B. P. 109. Myagro affinis planta siliquis longis J. B. 2. 894. Myagrum II. Lobel. Tabernæm. Icon. 866. In denen Weiden bey Wenigen-Jena, & in arvis nach Winzerla zu. it. in muris & salicetis nach Eckerdts-Bergen zu. Julio.

TVRRIS hirsuta, montana, flore albo. Erysimo similis, hirsuta, non laciniata, alba C. B. P. 101. Barbarea muralis J. B. in libro de Plantis a sanct. &c. vid. C. B. Prodr. & in Matthiolum. Auf dem Hauß-Berg und gegen dem Fürsten-Brunnen über. Majo.

CARDAMINE pratensis, magno flore purpurascente Tournefort. Nasturtium pratense, magno flore C. B. P. 104. Iberis Fuchsii, sive nasturtium pratense, sylvestre J. B. 2. 889. Flos cuculi Dod. Pempt. 592. In pratis passim ut & im Stadt-Graben, flore albo & purpurascente variat, floreque pleno aliquando in hortis occurrit, floret Aprili & Maj.

CARDAMINE annua, exiguo flore Tournefort. Sisymbrii cardamines species quædam, insipida J. B. 2. 886. Sium minimum Prosp. Alpin. Exot. 331. Provenit im grossen Paradieß, und zwischen der neuen Sinne und Nerckewitz und im Walde cum allio ursino Matthioli, Leucojo bulboso & Drymopogone, ad radices alnorum, floretque Majo. Petala habet valde exigua & fugacia instar Sophiæ Chirurgorum, & siliquas graciles, vi elastica cum impetu dissilientes.

CARDAMINE sylvatica, hirsuta, flore lacteo, parvo, an nasturtium pratense folio rotundiore C. B. Pin. pag. 104. vid. etiam J. B. in histor. plant. In sylvis cæduis zwischen der frölichen Wiederkunfft und Hummelshayn, cum circæa alpina minima, & alsine sylvatica, folio graminis strictiore. Floret Iun. & Iul.

CARDAMINE flore majore, elatior Tournefort. Instit. p. 224. Sisymbrium cardamine, sive nasturtium aquaticum, majus & amarum C. B. P. 104. Nasturtium aquaticum

ticum, erectum, folio longiore ejusdem. In ſcrobibus variis v. g. im Stadt-Graben hinter den Fecht-Boden. Majo.

DENTARIA heptaphyllos, baccifera C. *B.* P. 322. Coralloides minor, bulbifera I. *B.* 2. 902. Dentaria IV. baccifera Cluſii Hiſt. CXXI. auf dem Tautenburgiſchen Forſt. Floret Majo. Hujus bulbulos venenatos eſſe teſtantur Epiſtolæ Matthioli. Germ. dicitur Sd,uppen-Wurtz, Zahn-Kraut, item Gelck-Kraut, quia cuidam pecorum morbo Gelck dicto medetur. Iſt häuffig bey Gieſen auf dem Gangelſtein, und in dem Schiffenbergiſchen Walde.

SISTM*B*RIVM aquaticum Matthioli 487. Naſturtium aquaticum, ſupinum C. *B.* P. 104. Siſymbrium cardamine, ſive naſturtium aquaticum I. *B.* 4. 88. Brunnen-Kreſſe, in der Leiter vor der Papier-Mühlen, & alibi locis irriguis floret Iun.

SISTM*B*RIVM erucæ ſolio, glabro, flore luteo Tournefortii. Eruca lutea, latifolia ſive *B*arbarea C. *B.* P. 98. *B*arbarea I. *B.* 2. 868. Dod. Pempt. 712. Ad ſcrobes v. g. an dem Mühl-Graben vor dem Johannis-Thore, floret Majo.

SISTM*B*RIVM erucæ folio, glabro, minus, & præcocius Tournefortii, cum præcedente.

SISTM*B*RIVM erucæ folio, glabro, flore pleno. In hortis occurrit floretque cum præcedente. Eruca lutea, ſive *B*arbarea pleno flore C. *B.* P. 99. Vulgaris *B*arbarea in hortis culta ſpecioſior evadit, & hortulanis Winter-Kreſſe, St. Barben-Kraut dicitur.

SISTM*B*RIVM aquaticum, raphani folio, ſiliqua breviori Tournefortii. Raphanus aquaticus alter C. *B.* P. 97. Prodr. 38. Rapiſtrum aquaticum Tabernæm. icon. 408. In ſcrobibus & ſtagnantium aquarum limitibus variis in locis v. gr. bey Frauen-Brießnitz, Wenigen-Jena, und an den Teichen und auf den Wieſen, e. g. wo man nach Kunitz gehet, cum Phelandrio, Typha & ſcirpo altiſſimo, & alibi in lacubus & ſtagnis, floret Iulio. Waſſer-Kreſſe, Waſſer-Rettich.

SISTM*B*RIVM aquaticum, foliis in profundas laciniæ diviſis,

diviſis, ſiliqua breviori Tournefort. ſive Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias diviſis C. B. P. 97. Prodr. 38. cum priore. v. gr. in ſalicetis bey Kunitz und Schleben am Teichen. Hujus utriusque plantæ egregia figura vid. apud C. Bauhinum in prodromo pag. 38. cap. V.

SISYMBRIVM paluſtre, repens, naſturtii folio Tournefort. Eruca paluſtris, & naſturtii folio, ſiliqua oblonga C. B. P. 198. Eruca paluſtris minor Tabernæm. icon. 447. Eruca quibusdam ſylveſtris, repens floſculo luteo I. B. 2. 866. In agrorum terminis & confiniis humidis variis in locis ſerpit. v. g. wo man nach Lichtenhayn gehet, und nach Zwetzen, floretque Iun.

ACCIPITRINA Rivini & Loniceri. Siſymbrium annuum, abſinthii minoris folio Tournefort. Inſtit. p. 226. Naſturtium ſylveſtre, tenuiſſime diviſum C. B. P. 104. Seriphium Germanicum, ſive ſophia quibusdam I. B. 2. 886. Sophia Chirurgorum Lobelii Icon. 738. Ad rudera & vias frequens; Floret Majo & Iunio. Foliorum latitudine variat. Germ. Well-Saamen, Beſen-Kraut, Sophien-Kraut.

ERVCA arvenſis, vulgaris. Sinapi arvenſe, præcox, ſemine nigro Moriſ. H. O. p. 2. 216. Rapiſtrum flore luteo, foliis inciſis vel ſinuatis C. B. P. 95. I. B. 2. 844. Rapiſtrum arvorum Lobelii icon. 198. Inter ſegetes & in arvis culturisque paſſim, floret Majo & Iunio. Germ. Hederich.

ERVCA rapifolio. Sinapi rapifolio C. B. P. 99. Sinapi ſiliqua latiuſcula, glabra, ſemine ruffo ſive vulgare I. B. Sinapi ſativum, Prius Dodon. Pempt. 706. In agris præcipue um Steinburg und Reber, wird auch zuweilen bey Wenigen-Jena, und auf den Aeckern vor den Erffurtiſchen Thore, wie auch inter olera vor dem Johannis-Thore gefunden. Iun. & Iul.

SINAPI ſiliqua hirſuta, ſemine albo & ruffo I. B. 2. 859. Sinapapi apii folio C. B. P. 99. Sinapi ſativum alterum Dodon. Pempt. 707. In agris paſſim v. g. auf der Jusul und um Wenigen-Jena herum. Semine variat, non ſpecie differt, ex ruffo enim naſcitur album, & contra

Ex

Ex hujus ſemine paratur embamma moutarde Gallis dictum, vulgo Moſterdt, item Senff.

ERTSIMVM vulgare C. B. P. 100. Eryſimum Tragi, floſculis luteis, juxta muros proveniens I. B. 2. 863. Eryſimum Irio I. Tabern. icon. 884. Abſurde dicitur vulgo Eryſimum Lobelii; ſiquidem Lobelius non Eryſimum, ſed ſyrupum ex eo parandum, officinis primus invexerit. Iuxta muros, parietes & ſepes paſſim floret Iulio. Weges Senff.

ERTSIMVM alterum, ſiliquis erucæ C. B. P. 101. Eryſimum II. Tabernæm. icon. 448. In horto medico floret Iulio & Auguſto.

ERTSIMVM germanicum, ſoliis trinciatellæ Joh. Raji, in hiſtor. plant. univerſali; cujus deſcriptioni exacte quadrans plantula aliquando provenit in horto medico ex ſemine neſcio unde delato.

RAPA ſativa, oblonga, ſeu fœmina C. B. P. 90. Rapum ſativum oblongum J. B. 2. 838. In agris floret Jun.

RAPA ſativa, rotunda, radice candida C. B. pag. 89. & ſeqv. Rapum ſativum, rotundum J. B. Rapiſtrum orbiculatum ſ. turbinatum Lobelii & Tabernæm. cum præcedente, rundte und lange Rüben. Colitur paſſim in agris circa pagos, gratumque, tenuiſſime inciſa, ac muria condita, Rübels-Kraut vocatum, præbet alimentum. Poſt demeſſas ſegetes autem ſatæ, ceu tenerioris ſubſtantiæ radices reliquis præferuntur, & Halm-Rüblein vocantur.

NAPVS ſylveſtris C. B. P. 95. J. B. 2. 843. Bunias ſylveſtris, napus flore luteo Lobel. icon. 200. Rapiſtrum arvenſe folio auriculato, acuto Tourn. Inſt. p. 211. Myagro ſimilis, ſiliqua rotunda C. B. P. 109. Prodr. 52. Myagro affinis herba, capitulis rotundis J. B. Rube-Saat, Rübſen; In agris pro diverſo ſationis tempore, diverſis anni temporibus floret; ſi enim Autumno ſeratur, ſequentis anni vere Aprili & Majo floret, ſi vero vere, tunc circa Feſtum S. Johannis & ſerius. Ex hujus ſemine paratur oleum apud Germanos in lucernis, & apud pauperes in cibis multi uſus. Rüb-Oel, Rübſen-Oel.

NAPVS ſativa hic raro colitur, ſed potius ex Saxonia

inferiori advehitur; apud Batavos frequens eſt, ubi colore radicis albo & luteo variat, & Soete Knollen alta voce quotidie venalis proclamatur. Laudantur præprimis radices napi ex agro Waſſenaarienſi (Soete Waſſenaarſe genollen) Germ. Steck-Rüben, Stickel-Rüben.

(β) *Breviori vel Sicula.*

THLASPI vulgatius J. B. 2. 261. Thlaſpi arvenſe, vaccariæ incano folio, majus C. B. P. 106. Thlaſpi alterum Dodon. Pempt. 712. In locis ruderatis hinc inde v. g. bey der Raſen-Mühle, und zwiſchen Jena und Prieſenitz. Floret Majo & Jun. Bauren-Senff.

THLASPI arvenſe, ſiliquis latis C. B. P. 105. Thlaſpi cum ſiliquis latis J. B. 2. 923. In arvis & inter ſegetes paſſim. Aprili & Majo. Pfennig-Kraut, a figura ſiliquarum.

THLASPI arvenſe, perfoliatum, majus C. B. P. 106. Burſa paſtoris foliis perfoliatæ J. B. Thlaſpi oleraceum Tabern. icon 462. In agris montoſis & lapidoſis, ut & vineis paſſim floret Aprili.

THLASPI perfoliatum, minus C. B. Thlaſpi III. pumilum Cluſii Hiſt. CXXXI. Cum præcedente, a quo parum vel nihil differt judicio Joh. Raji.

THLASPI roſa de Jericho dictum Moriſ. Hiſt. Oxon. p. 2. 328. Roſa hierichuntina vulgo dicta C. B. P. 484. Roſa hierichuntina Lobelii Icon. 203. In horto medico floret Jun. & Jul.

NASTVRTIVM hortenſe, vulgatum C. B. P. 103. Naſturtium vulgare J. B. 2. 912. In hortis paſſim floret Jun. Garten-Kreſſe.

NASTVRTIVM hortenſe, criſpum C. B. P. 104. Naſturtium hortenſe, criſpum, latifolium & anguſtifolium, C. B. Prodr. 43. & 44. Naſturtium criſpum J. B. 2. 913. In horto medico floret cum præcedente.

NASTVRTIVM hortenſe latifolium Camerar. in Epit. Matthiol. p. 156. vid. & Matthiol. per C. B. editus & auctus in cap. de naſturtio. Cum naſturtio vulgari aliquando occurrit in hortis.

IBERIS

IBERIS Matthioli 293. Iberis naſturtii folio C. B. P. 97. Naſturtium ſylveſtre, tenuiter inciſum, minori fructu Tournefort. p. 214. Differt a Naſturtio petalorum vix conſpicua parvitate, juxta vias, ad rudera & ad pagos paſſim, floret Jun. & Jul. Germ. Hunde-Seich ab odore ruſticis dicitur.

CORONOPVS Ruellii, ſive Naſturtium verrucoſum J. B. 2. 919. Ambroſia campeſtris, repens C. B. P. 138. Naſturtium ſylveſtre, capſulis criſtatis Tournefort. Inſtit. p. 214. In compitis, nec non ad ſcrobes cum anſerina, & ad vias publicas, floret Majo & Jun. & hinc tota fere æſtate; Capſulas habet verrucoſas, criſtatas, duras lignoſas, diſpermas.

COCHLEARIA folio ſubrotundo C. B. P. 110. Cochlearia J. B. 2. 942. In hortis variis frequens floret Aprili & Majo. Germ. Löffel-Kraut.

COCHLEARIA altiſſima foliis glaſti. Lepidium glaſtifolium C. B. In hortis Curioſorum floret Jul. & Auguſto.

ARMORACIA Rivini. Cochlearia folio cubitali Tournef. Inſtit. p. 215. Raphanus ruſticanus C. B. P. 96. Raphanus ſylveſtris, ſive armoracia multis J. B. 2. 851. Raphanus ruſticanus, craſſa radice, Lapathi folio Lobel. Icon. 320. In hortis paſſim v. g. auf der Inſul und vor dem Johannis-Thor, floret Jun. & Jul. Germ. Meer-Rettich, Kreen, Belgis Peeper Wortelen.

LEPIDIVM latifolium C. B. P. 97. Lepidium Pauli J. B. 2. 940. Lepidium Plinii Dodon. Pempt. 716. Piperitis offic. In horto medico & Sereniſſ. Principis. Junio & Jul. Germ. Pfeffer-Kraut. Lepidium Spontaneum eſt zu Kahle an der Stadt-Mauer, alia loca natalia vid. in Epit. Matth. Camerar. p. 198.

LEPIDIVM anguſtifolium Tournef. Iberis offic. S. Dale pag. 272. Iberis latiore folio C. B. Provenit admuros circa Francofurt. ad Mœnum & Frideberg. Floret Jun. & Julio.

BVRSA paſtoris major, folio non ſinuato C. B. Pin. 108. & Hirten-Taſche, Täſchel-Kraut, Beutelſchnitter-Kraut.

BVRSA paſtoris major, folio ſinuato C. B. P. 108. Burſa paſtoria J. B. 2. 936. Paſtoria burſa Dod. Pempt. 103. Ad ſepes & juxta vias & parietes paſſim floret Aprili & Majo, & hinc tota æſtate. Floribus burſulisque onuſta paſſim in cultis & incultis conſpicitur, foliis valde varſat; hinc

BVRSA paſtoris eleganti folio inſtar coronopi repentis Camerar. Hort. 32. quæ paſſim apud nos occurrit, nec non

BVRSA paſtoris media C. B. P. 108. Burſa paſtoria minor. Tabern. icon. 199. etiam dictis in locis cum prioribus, præcipuè in agris arenoſis bey der neuen Schencke.

ALTSSVM incanum, luteum, ſerpilli folio, majus &

ALTSSVM incanum, luteum, ſerpilli folio minus Tournefort. Thlaſpi minus quibusdam, aliis alyſſum minus J. B. 2. 928. Thlaſpi alyſſum dictum, campeſtre majus & minus C. B P. 107. Klein Schildbeſen-Kraut. Alyſſum minimum Cluſii Hiſt. CXXXIII. In campeſtribus, vineis & ad ſepes in apricis floret Majo & Jun.

ALTSSVM incanum, luteum, ſerpilli folio majus Tournefort. vid. C. B. in prodromo theatri botanici, an felſichten Orten, und in apricis v. gr. in denen Schmohniſchen Bergen; auch an dem Schloß-Felſen zu Wendelſtein. Floret Majo, Jun. & Jul.

ALTSSVM fruticoſum, incanum Tournefort. Thlaſpi fruticoſum, incanum C. B. P. 108. Thlaſpi capſulis ſublongis, incanum J. B. 2. 929. Thlaſpi incanum Mechlinenſe Lobel. icon. 216. In arenoſis agris & ad ſepes hinter Lobada, bey der neuen Schencke, item bey Kunitz, und nach Orlamünde hin, floret Jul. Dominus Dr. Volkammerus hanc plantam flore pleno reperiſſe teſtatur.

ALTSSVM vulgare, polygoni folio, caule nudo Tournefort. Burſa paſtoris minor, loculo oblongo C. B. P. 108. Burſa paſtoria minima J. B. 2. 937. In apricis gramine tenui veſtitis paſſim v. g. Auf der Land-Veſte hinter der Schieß-Mauer, vor der Papier-Mühlen, und ſonſten hin und wieder an der Leiter. Floret Martio & Aprili. Flore elegantiſſime pleno unicam hujus plantulæ individuum aliquando reperi prope Gieſſam in arvis bey der Säge-Mühl anno 1715.

ALTSSVM foliis veronicæ. Thlaſpi foliis veronicæ

Mon-

Monſpelienſium. Burſa paſtoris major, loculo oblongo C. B. in Prodr. pag. 50. ea Pin. pag. 108. Draba minor, muralis Dioſcorid. Fab. Column. An denen Felſen unter den Giebingenſteiniſchen Schloß-Berge. Floret Martio & April. cum Geranio lucido ſaxatili.

ALTSSVM ſegetum, foliis auriculatis, acutis, flore & ſemine majore. Tournef. Myagrum Chabræi. Myagrum ſativum C. B. P. 109. Inter linum paſſim frequens floret Jun. & Jul. Lein-Dotter, Flachs-Dotter. Dotter. Colitur quoque in agris circa Laucham olei ex ſeminibus parandi cauſa. Hujus ſemina pro ſeminibus Seſami venduntur. De utroque Myagro vid. Camerar. Epit. Matth. 454.

ALTSSVM ſegetum, elatius, foliis auriculatis, flore & ſemine minore, Tournef. an Myagrum ſylveſtre C. B. vid. J. B. & Chabræus. In agris inter ſegetes frequens, floret æſtate; præcedens vero ſpecies magis agros lino conſitos amat.

PSTLLIVM offic. Pſyllium annuum, erectum. In hortis ſatum pſylli ſemen, quod in officinis proſtat, facile germinat, & floret Junio. Germ. Floh-Kraut.

PLANTAGO latifolia, glabra, C. B. Pin. 189. Plantago latifolia, ſinuata ejusdem; magnitudine enim foliorum, valde ludit hæc planta. Floret æſtate. Wegerich, Wegebreit, breiter Wegerich.

Not. Plantaginis ſemen non eſt nudum, ſed tectum capſula bipartita & operculata. Tournefortius quidem huic plantæ ad ſcribit florem reg. monopetalum, hypocrateri formem, ſed cum embryo intumeſcens, grandiorque factus, ungues floris divellat, præſtat ad regularia quatripetala referre, non ſecus ac cervi ſpina, & coronopus veterum, uti recte obſervavit Joh. Rajus.

PLANTAGO latifolia, incana C. B. Pin. 189. Plantago major, hirſuta, media a nonnullis cognominata J. B. 3. 504. Plantago media Dod. pempt. 107. Ad pratorum pomariorumque ſemitas paſſim occurrit, floretque æſtate. Aliquando floribus paniculatis variat, de qua vid. J. Bauh.

PLANTAGO, latifolia, roſea, flore expanſo C. B. P. 189, Plantago roſea, flore expanſo J. B. 3. 503. Plantago roſea Lobel. Icon. 504. In hortis floret æſtate. Ab hac non niſi æstate diſtat & excreſcentia florum longiori-

PLANTAGO latifolia, roſea, floribus quaſi in ſpica diſpoſitis C. B. Pin. 189. Magnitudine variat hæc plantaginis ſpecies, non ſecus ac præcedens & ſequentes.

PLANTAGO maritima, foliis gramineis. Coronopus maritima noſtras J. B. & Chabræi. An coronopus maritima major. C. B. Pin. pag. 190. Naſcitur frequentiſſima in pratis circa lacum falſum, (bey der ſaltzigen See zwiſchen Eißleben und Halle,) ubi aliquando foliis denticulatis, imo & magnitudine loci natalis diverſitate variat. Hujus jam tum meminit Camerarius in Matthioli. pag. 146. Floret Jun. & Jul.

PLANTAGO anguſtifolia, minor, ſummo caule folioſa ſeu prolifera noſtras Pluckenet Almageſt. Botan. Plantago anguſtifolia, in caulium ſummitate folioſa J. B. & Chabr. 499. cum præcedentis magnitudine, foliorumque latitudine multum variat hæc planta.

(γ) *Siliqua latiore.*

BVLBONAC annuum, ſiliqua rotundiore, flore purpureo. Lunaria major, ſiliqua rotundiore I. B. 2. 881. Viola lunaria, major C. B. P. 203. Viola lunaris I. Tabern. icon. 313. Bulbonac offic. Dalii p. 159. Suppl. In hortis variis floret Majo. Silberblatt.

BVLBONAC annuum, ſiliqua rotundiore flore albo. Leucojum lunatum, ſeu lunarium, latifolium, majus, alterum, ſiliqua rotunda, flore albo Moriſonii H. O. p. 2. 246. Im Fürſten-Garten, floret cum præcedente.

BVLBONAC radice rediviva, flore cinereo. Lunaria major, ſiliqua longiore I. B. 2. 882. Lobel. Viola lunaria major, ſiliqua oblonga C. B. Pin. 203. viola lunaria II. Tabern. icon. 314. in ſylvis vaſtioribus, v. gr. Auf dem Hangelſtein bey Gieſſen, auf dem Hartz bey Hefeld, und auf dem Thüringer Wald, floret Majo.

(3) CAPSVLA QVADRIPARTITA.

PHILADELPHVS Athenæi & Rivini. Syringa Tournefortii; Syringa alba C. B. P. 398. Frutex coronarius Cluſii Hiſt. 55. In hortis paſſim floret Majo. Cum Syringæ nomen Lilac Tournefortii jam occupaverit apud omnes, malui

malui cum Rivino philadelphum appellare hunc fruticem, quam ſyringæ vocabulum homonymum reddere. Flos communiter eſt tetrapetalus, quandoque tamen etiam flore pentapetalo ludit.

PHILADELPHVS flore pleno. Cum præcedente, ſed rarius. Hujus nitida figura videatur in Horto Eyſtettenſi. Germ. wilder Jaßmin mit gefüllten und einfachen Blumen.

RVTA hortenſis, latifolia C. *B.* P. 336. Ruta ſativa vel hortenſis I. *B.* 3 197. hæc quandoque cultu in arbuſculum adoleſcit, de quo vid. Hoffmannus in clave Schrœderiana. In hortis floret Iun. & Iul. Raute. Ruta murariæ non eſt hujus loci, ſed ad dorſiferas potius referenda, ſub nomine Muraríæ ſimpliciter, l. Adianthi albi.

RVTA hortenſis altera C. *B.* P. 336. Ruta tenuifolia Tabern. Icon. 133. In hortis cum præcedente. Utraque interdum flore pentapetalo variat. Wein-Raute.

ERICA vulgaris flore purpureo Erica myricæ folio Lobelii & Car. Cluſii. Erica vulgaris glabra C. *B.* Pin. p. 485. Germ. Heide. In ericetis paſſim floret Iunio. Ruſtici ex vario ericæ florendi modo, hyemis durationem & variam aſperitatem præſagiunt (nach dem die Heyde ausblüht) alii ad mellificia extollunt.

ERICA vulgaris flore albo. Bey Rudersdorff. Hæc hodie Germaniæ ericetis & ſylvis communiſſima, revera plane diverſum a reliquis ericis a Carolo Cluſio in hiſt. plantarum per hiſp. naſcentium recenſitis, ſiquidem hæ florem habeant regularem monopetalon campani formem & clauſum; hujus vero noſtræ ericæ flos ſit regularis tetrapetalus, quaſi geminatus, unde non video ob quam rationem Tournef. alias in diſtinguenda florum ſtructura tantopere conſcientioſus, has plantas ſub eodem genere ſupprehenderit, non ſecus ac mirandum eſt, hunc ipſum Tournefortium cimonium flore monopetalo & pentapetalo ſub eodem genere complexum eſſe.

HTPOPITTS Rivini. Orobanche, quæ hypopitys dici poteſt C. *B.* Pr. p. 31. vid. Kuauth in Catalogo Hall. & I.

Rajus in Hiſt. Plant. ſub titulo Orobanches odore verbaſculi. In pinetis variis v. g. im Rauhenthal hinter dem Fürſten-Brunnen, hinter der Wellmeſe, nach Jena-Prießnitz, floret Iun. Iul. & Auguſto.

ROSEA Rivini & officinarum. Radix Rhodia Dioſcoridis Telephium radice roſam ſpirante, majus Hermanni. In horto Medico floret Majo & Iun. Roſen-Wurtz. Differt a Telephio ſive Fabaria off. flore tetrapetalo exigue ornato, qui in Fabaria eſt pentapetalus, & majoribus petalis conflatus.

(4) CAPSVLA OCTOPARTITA.

LINOIDES, ſive Radiola quorundam; Polygonum minimum, ſive millegrana minima C. B. P. 282. Rajus hanc plantam inter alſinas tetrapetalas recenſuit, ſed cum habeat capſulam octo loculamentis diſcretam, in quorum ſingulo ſemen ineſt unicum, Linoidem appellare malui, & huc referre propter magnam convenientiam omnium partium floris ac fructus cum lino, ſi ſolum numerum petalorum excipias. Hæc eſt illa planta, quam falſiſſimus obſervator Carol. Preſton. apud Joh. Rajum in Methodo plantarum emendata & aucta pro herniariæ Charactere Joh. Rajo obtruſit, cujus obſervatoris falſitas & inanitas pariter. vid. L. cit. Tit. equiſeti, glycyrrh. echinatæ, & diſtinctione malvæ, alceæ & atheæ. Habet itaque ſe hæc planta ad linum, uti tormentilla ad pentaphyllum. Provenit copioſa in agris arenoſis ſterilibus, zwiſchen der neuen Schencke und Laaßdorff, it. bey Hayn-Büchen, floretque Jul. & Auguſto.

V. Seminibus tectis bacca.

(1) MONOPYRENA.

CORNVS vulgaris. Cornus hortenſis mas C. B. P. 447. Cornus ſativa, ſeu domeſtica J. B. 2. 210. Cornutus Cluſ. Hiſt. 12. In hortis frequens floret Martio; Ab hoc

CORNVS ſylveſtris mas C. B. c. l. Cornus mas pumilio Cluſio Cluſ. Hiſtor. 13. nonniſi cultura differre videtur;

tur; provenit vero paſſim cornus ſpontaneus in montibus noſtris v. g. auf dem Fuchs-Berge, Cunitzer-Berge & alibi, floretque cum præcedente; Officulum corni in duo loculamenta diviſum eſt, totidem nucleis fœta, adeoque ſatius ad dipyrenas referri poſſet, niſi forſan pari ratione ac Xanthium ex duobus ſeminibus nonniſi unicum germen producat. Körner-Baum, Welſcher Kirſch-Baum, Hürrlitzgen-Baum; fructus colore variat. Officulum hujus quandam convenientiam habet cum officulo Zizyphi ſive jujubæ & Cratægi.

OSSEA Loniceri & Rivini. Virga ſanguinea Matthioli & J. B. I. 214. Cornus fœmina C. B. P. 447. In ſepibus & ſylvis paſſim floret Majo. Germ. Hart-Reder, Hart-Riegel.

LAVRVS latifolia πλατυτέρα Dioſcoridis C. B. P. pag. 460. Laurus latifolia mas & fœmina Tabernæm. icon. 951. In hortis paſſim floret Majo. Lorbeer-Baum.

LAVRVS vulgaris C. B. P. 460. Laurus J. B. I. 409. Laurus mas & fœmina Tabern. icon. 950. cum præcedente.

LAVRVS vulgaris, folio undulato H. R. Pariſ. cum præcedente.

(2) DIPYRENA ET BIPARTITA.

VNIFOLIVM Dodon. & Tabernæm. Græcis Monophyllon. Lilium convallium minus C. B. P. 304. Smilax unifolia, humillima Tournefortii. Aſt cum florem habeat tetrapetalum & baccam bipartitam & dipyrenam ad ſmilacem hexapetalum referri nequit. In ſyſvis v. g. im Rauhenthale, und Tautenburgiſchen Forſt. Floret Majo, cum lilio convallium; quamvis in caule habeat folia bina, quandoque ſed rarius terna, attamen antequam cauleſcat ſemper & ubique nonniſi unicum folium exhibet, unde merito cum Germanis unifolium (Einblat) vocabimus, præſertim cum nomen aptius hactenus non ſuccurrerit. Hanc plantam Matthiolus pro gramine Parnaſſi exhibuiſſe videtur.

(3) TETRAPYRENA.

EVONTMVS vulgaris granis rubentibus C. B. Pin. 438. Evonymus multis, aliis tetragonia J. B. 1. 201. Evonymus Dod. Pempt. 753. In ſepibus frequens floret Majo. Germ. Spindel-Baum, Pfaffen-Hödgen, Hahn-Hoden, Spill-Baum, Evonymus granis nigris frequens eſt in Pannonia & Auſtria, teſtibus Matthiolo Cluſio in Pannonicis & C. B. pag. 428.

CERVI SPINA Rivini & Cordi. Rhamnus Tournefort. Rhamnus catharcticus C. B. P. 478. J. B. 1. 855. Rhamnus ſolutivus Dodon. Pempt. 756. Spina infectoria Matth. & Cluſ. hiſtor. In ſepibus cum præcedente. Hæc planta, non ſecus ac laurus, mas eſt & fœmina, hoc eſt: altera ſteriles, altera fœcundos gignens flores, qui quidem monopetali videntur, attamen per maturitatem ab intumeſcente embryone in quatuor petala fiſſi, manifeſte ſeparatim defluunt, uti recte obſervavit Cl. Rivinus. Creutz-Beer, Weg-Dorn. Ex hujus baccis paratur color, qui pictoribus Safft-grün dicitur; nec non Syrupus domeſticus Maximiliani.

(4) POLYPYRENA.

PARIS Rivini. Herba paris Tournefort. & officinarum Dod. Pempt. 444. Solanum quadrifolium bacciferum C. B. P. 167. Einbeer, Wolffs-Beer Germanis. Im Höltzgen bey Iſerſtädt, item bey Jena-Prießnitz und Rode. Majo.

OXYCOCCVS Tournefortii. Oxycoccus, ſive vaccinia paluſtris J. B. 1. 227. Vitis idæa paluſtris C. B. P. 471. In muſcoſis paluſtribus, um die Schlefreiſiſche Teiche, ubi Mooß-Beeren, & Sumpff-Beeren vocant a loco natali; de oxycocco canadenſi vid. Sam. Dale in pharmacologia. Floret Majo.

CHRISTOPHORIANA vulgaris noſtras racemoſa & ramoſa Moriſ. H. O. part. 2. 8. Aconitum racemoſum bacciferum, an actæa Plinio C. B. P. 183. Chriſtophoriana Dodon. Pempt. 401. In ſylvis variis v. g. In der Druſe-

Druſenitz bey Wintzerla, in dem Rauhenthale, und gegen den Fürſten-Brunnen über, floret Majo. Vulgo venenata æſtimatur, nec forſan de nihilo, cum odor & ſapor ſit valde viroſus. Germ. Chriſtoph-Wurtzel, Schwartz-Wurtzel. Flores habet fugaciſſimos, petalis elegantèr crenatis ornatos & calice pariter colorato cinctos, ſtaminibus copioſis refertos. Semina ſunt duriuſcula, depreſſa, gemino ordine ſibi ſuperincumbentia; unde & bacca alioquin ovalis ex altero latere ſulco longitudinali exarata eſt.

CLASSIS V.

DE PLANTIS FLORE REGVLARI PENTAPETALO GAVDENTIBVS.

I. Semine nudo unico.

LIMONIVM maritimum majus C. B. P. 192. Limonium majus multis, aliis Behen rubrum J. B. 3. App. 876. In horto medico & aliis floret Junio; Semen Limonii eſt nudum, unicum, oblongum, calice ipſo vel capſula involutum; quod vero oſtendunt limonium ligneſum, gallas ferens Bocconis huc non pertinet, ſiquidem florem habeat monopetalum; quem & Tournef. in eadem tabula cum pentapetalo limonii flore exhibuit, quod tamen eſt contra methodum. Hæc planta potius ad dentillariam accedit. Ceſſat igitur Emanuelis Kœnigii objectio contra methodum Modernorum, cum limonium monopetalum poſſit a pentapetalis ſeparari, & alhæa pentapetala ad herniarias cum Tournef. referri.

STATICE Lugd. 1190. Caryophillus montanus, major, flore globoſo C. B. P. 211. Caryophillæus flos aphyllocaulos, vel junceus major J. B. 3. 336. In hortis variis, ubi

ubi gramen marinum appellant; vel cum Hermanno ſcabioſis annumerant; Sponte provenit in campeſtribus & arenoſis bey Halle, Leipzig, Wittenberg und Querfurth. Flore albo variat. Floret Jun. & Jul.

LINOSTRIS Rivini; Alchymilla linariæ folio, calice florum albo Tournefort. Linaria montana, floſculis albicantibus C. B. P. 213. Linariæ ſimilis J. B. 3. 461. Anonymos linifolio Cluſ. Hiſt. 324. In ſylvis paſſim floret Majo & Junio. Florem habet pentapetalum non deciduum, inſidentem ſummo ſemini, vel ſaltim illi circumpoſitum, illudque coronantem, unde patet, quod nec ad linariam, nec ad alchymillam referri debeat.

KNAWEL folio & flore viridi. Alchymilla ſupina, gramineo folio, minori flore Tournefort. Polygonum anguſtiſſimo & acuto, vel gramineo folio, minus, repens C. B. P. 281. Polygonum tertium Dodon. ſive tenuifolium J. B. 3. 377. Polygonum minus, polycarpon Tabernæm. icon. 834. Knaul Tragi & Germanorum agricolarum, differt a Polygono flore fructui inſidente, illumque umbilicante, & veluti coronante. Bey der Saal-Brücken, wo ſich die Saale theilet, ſehr häuffig aber auf denen Aeckern nach Rode und Kleine zu, floret Junio & Julio; cum florem habeat pentapetalum, ſemini inſidentem, nec ad alchymillam, nec ad polygonum referri debet.

KNAWEL folio & flore albicante. Alchymilla gramineo folio, majore flore Tournef. Polygonum germanicum, incanum, flore majore, perenne Raj. Synopſ. 68. Cum præcedente, præcipue in arenoſis agris cum hyoſeride. Polygonum hoc eſt polonicum cocciferum C. B. P. 281. & Camerarii Epit. Matthiol. pag. 360. & 327. Germ. Perlen-Kraut. Polonis Koſmaczek cujus radicibus adnaſcitur coccum elegantiſſimo colore commendatum, præcipue circa ſolſtitium æſtivum, aut Feſtum S. Johannis; unde etiam Germanis Johanns-Blut dicitur; eſt vero nihil aliud, quam ovulum cujusdam inſecti, ſanguineo ſuccuo turgens; vid. Elsholzii flora Marchica. Ejusdem farinæ eſt, & pariter ſuperſtitionem redolet carbo radicibus artemiſiæ

ſub

ſub idem tempus adnaſci dictus, qui a multis fruſtra ſæpe quæſitus eſt. Eſt vero nihil aliud, quam radices artemiſiæ anni præcedentis putrefactæ, uti videmus in radicibus ſuccisæ ſ. morſus Diaboli vulgo dicti. Rajus ex hac planta male duas ſpecies effecit.

POLTGONVM latifolium C. B. P. 281. Polygonum, ſive centinodia J. B. 3. 374. In areis & compitis agrisque frequens floret Junio & hinc in autumnum usque; planta eſt annua, (quod facile mireris) ut & ſequentes: Flore rubro & albo variat. Wege-Tritt, Wege-Graß.

POLTGONVM oblongo, anguſto folio C. B. P. 281. Polygonum anguſtifolium J. B. 3. 376. Polygonum III. Tabernæm. icon. 833. cum præcedente.

POLTGONVM brevi anguſtoque folio C. B. P. 281. Polygonum anguſtifolium J. B. 3. 376. Polygonum. III. Tabernæm. Icon. 833. cum præcedentibus.

POLTGONVM litoreum, minus, floſculis ſpadiceo-albicantibus C. B. Prodr. p. 131. polygoni-folia vel linifolia per terram ſparſa, flore ſcorpioidis J. B. in arenoſis ripis fluviorum, v. gr. prope Wittebergam ad Albim, nec non in campeſtribus arenoſis zwiſchen Coßwig und Zerbſt; prope Gieſſam ad lacum bey der Pulver-Mühle; hic rarius deprehenditur, attamen aliquando occurrit in arenoſis ad Salam nach Dornburg hin. Floret tota æſtate.

POLTGONVM minus caryophyllæum, foliis anguſtiſſimis, floſculis rubuloſis, plurimis ſimul junctis in carnatis Hoffmanni. An hæmorrhoidalis, quæ ad Caryophyllorum ſylveſtrium claſſem referri debet Cluſii?

PERSICARIA orientalis, altiſſima, nicotianæ folio, calice florum purpureo Tournef. in Corollario Inſt. p. 38. In horto medico & nonnullis aliis, floret Septembri.

PERSICARIA mitis, maſculoſa C. B. P. 101. Perſicaria mitis J. B. 3. 779. Perſicaria II. Tabern. icon. 837. Ad ſcrobes variis in locis v. g. im Stadt-Graben bey dem Schloſſe. Jun. & Jul. Flore albo & purpureo variat. Pferſing-Kraut, Flöh-Kraut.

PERSICARIA mitis, cum maculis ferrum equinum referentibus Tournefortii; cum præcedente.

PER-

PERSICARIA mitis non maculoſa C. B. P. 101. cum præcedentibus.

PERSICARIA urens, ſeu hydropiper C. B. c. l. Perſicaria acris, ſive hydropiper J. B. 3. 780. Hydropiperi Dodon. Pempt. 607. Ad ſcrobes & fimeta, nec non inter olera quandoque occurrit, floretque Junio & Julio; Et hæc flore purpuraſcente & candido variat. Waſſer-Pfeffer, Flöh-Kraut.

PERSICARIA anguſtifolia C. B. P. pag. 101. & Prodr. pag. 43. Major Lobelii. Provenit paſſim juxta ſepes & ſcrobes, floretque Jun. & Jul.

PERSICARIA minor C. B. Perſicaria puſilla repens Lobel. Icon. 316. Im Walde, wo man von Städtgen Rode nach Schlefreiſen gehet, in denen Holtz-Schlägen häufig, floret cum præcedentibus.

PERSICARIA ſalicis folio, potamogeton anguſtifolium dicta Raji Hiſtor. Plant. 184. Potamogeton ſalicis folio C. B. P. 193. Perſicaria ſalicis folio perennis H. L. Bat. In ſtagnis & piſcinis, auch bey der Schneide-Mühle, im groſſen Paradieſe. Occurrit etiam erecta inter ſegetes, quæ tamen nullos producit flores. Datur & altera.

PERSICARIA paluſtris fluitans, foliis brevioribus & latioribus, florum ſpica ſpecioſa, purpurea, compactiore, quæ cum præcedente promiſcue naſcitur in piſcinis um Rudersdorff herum, auch in ſtagnis nach Wöllnitz hin, und in denen Sümpffen zwiſchen dem Rauhenthal und der Ziske, item bey Löbſtädt im Austritt der Saale, und an den Schlebiſchen Teichen. Aliquando extra aquas projecta radices agit, & ſurrecta creſcens hirſuta evadit, rariſſimeque floret; adeo ut fere pro diverſa planta haberi poſſit, de quo vid. Raji catalogus plantarum circa Cantabrigiam naſcentium.

BISTORTA major, radice magis intorta C. B. P. 192. Biſtorta media, folio minus rugoſo J. B. 3. 538. Serpentaria mas, ſeu biſtorta Fuchſii. In pratis variis v. g. in der Ziske und Cluſewitzer Holtze. Junio. Montis Brucleri accolæ Krebs-Wurtz appellant, quia ipſius radix intorta, figuram cancri elixi quadantenus refert. Natter-Wurtz.

FAGO.

FAGOPTRVM vulgare erectum Tournef. Eryſimum Theophraſti, folio hederaceo C. B. P. 27. Fagotriticum J. B. 2. 993. Seritur quandoque in vineis des Lerchen-Feldes, floretque Jul. Germ. Heyde-Korn, a loco natali, quia ericetoſis locis ſeri gaudet; alias etiam Buch-Weitzen dicitur, unde effictum nomen fagopyri, a voce latina fagus, Buch, & pyrum voce græca, Weitzen; ſed inepte hæc vox compoſita eſt ex voce græca & latina.

FAGOPTRVM vulgare, ſcandens Tournefort. Convolvulus minor, ſemine triangulo C. B. P. 295. Helxine ſemine triangulo J. B. 2. 157. Helxine ciſſampelos, altera, atriplicis effigie Lobel. Icon. 624. inter ſegetes paſſim floret Junio & Julio. Germ. Vogel-Zung, wild Heyden-Korn.

FAGOPTRVM ſcandens, altiſſimum dumetorum, ſeminibus tribus alis pellucidis cinctis; an fagopyrum ſcandens, Americanum, maximum Tournefort? Frumentum ſaracenicum, maximum, americanum H. L. Bat. In dumetis & ſepibus auf der Inſul, it. bey Wöllnitz, floret Aug. & Sept.

ILLECEBRA ſpuria vel ſedoides. Sic ad interim appellare & huc referre liceat, plantulam, quam Chabræus polygonum parvum, flore albo, verticillato, appellavit. Hæc florem habet exiguum, pentapetalum, nudum, petalis conniventibus conflatum, & quinatim conſtanter preſſe junctum, non deciduum, qui in ſinu ſuo fovet ſemen nudum, unicum, rotundum, admodum exiguum; horum quinatim vero junctorum floſculorum plures verticillum ſpecioſum efformant, ad foliorum conjugatorum, rotundorum alas, uti videri eſt apud Chabræum. Creſcit in arenoſis Luſatiæ & ducatus Juliacenſis & Belgii campis copioſiſſime, & quamvis hic non proveniat, characterem tamen ipſius, a nullo hactenus ſatis deſcriptum, inſerendum duxi.

AGRIMONIA officinarum. Agrimonia ſeu Eupatorium J. B. 2. 398. Eupatorium veterum ſive agrimonia C. B. P. 321. In vineis & ad agrorum montoſorum limites floret Julio; Cum hujus ſemen corticem nunquam ſponte

ſponte deponat, pro ſemine nudo habere placuit. Aggers-Mennig, Ader-Mennig, Oder-Mennig. De agrimonia altera odoratiore vid. Fab. Columna & Camerar. Epit. Matthiol. Agrimoniæ flos non eſt hexapetalus, uti falſe opinatus eſt J. Rajus. vid. etiam Tournef. & Fab. Column.

AGRIMONIA orientalis major in hortis Curioſorum floret Jun. & Jul. vid. Tournef. Corollar. ad Inſtitut.

COTINVS Tournefort. p. 610. & Matthioli. vid. & C. B. Pin. pag. 415. Coccigrya ſive cotinus putata J. B. 1. 494. Im Fürſten-Garten, floret Majo.

TILIA fœmina, folio majore C. B. P. 426. Tilia vulgaris platyphillos J. B. 1. 133. In areis & compitis frequens. Linde, Linden-Baum. Floret Jun. Tiliæ ſemen an ſit nudum, an vero tectum, hactenus dubitatum eſt, ſed cum decidat cum ipſo obvolucro, & hoc non deponat, præſtat huc referre, vid. tamen Tabulæ Tornefort. Tilia mas veterum, non eſt ſpecies tiliæ, ſed ulmi potius, teſtibus l. ſolis veſiculis foliis adnaſcentibus. vid. C. B. Pin. pag. 427.

TILIA montana maximo folio C. B. P. & Prodr. Provenit copioſe hinter Jena-Prießnitz und Wage, auch in denen Wäldern nach Rotha und der frölichen Wiederkunfft, it. im Dörffgen Rode.

TILIA folio minore J. B. 1. 137. Tilia fœmina, folio minore C. B. c. l. cum præcedente floret Majo & Junio; At tiliæ ſemen nudum videtur, ſiquidem corticem ſuum nunquam & nusquam deponat; ſi vero quispiam ad aliam claſſem referre maluerit, cum eo non litigavero.

TOXICODENDRON Tournef. Epimedium fruticans Canadenſe Raji Hiſt. 1699. Vitis Canadenſis Muntingii, qui elegantem totius plantæ figuram exhibuit in ſua Phytographia Fig. LX. Hujus plantæ meminit & C. B. in appendice ad Pinacem p. 517. his verbis: Vitis Canadenſis nomine, ex eodem horto miſit &c. In hortis curioſorum floret Junio; Auch in des Ziegenhäyniſchen Kräutermanns Gärtgen. Olim arbor venenata quorundam, a τοξικὸν venenum & δένδρον arbor. vid. Tournef. Inſt. rei herb. p. 610.

II. Semi-

II. Seminibus nudis plurimis.

VLMARIA Cluſ. Hiſt. CXCVIII. J. B. 3. 488. Barba capræ floribus compactis C. B. P. 164. Regina prati Dodon. Pempt. 57. In pratis v. g. im großen Paradieß und in der Zieke, floret Junio & Julio. Geiß-Bart, Medeſüß. De hujus virtute in fracturis oſſium vid. Felix Würtz in ſua Chirurgia pag. 319.

RANVNCVLVS nemoroſus, vel ſylvaticus, folio rotundo C. B. P. 178. Ranunculus auricomus, ranunculus dulcis Tragi Lobel. icon. 669. In pomariis inter gramina frequens floret Aprili & Majo; Folia ipſius inferiora ſunt rotunda, ſuperiora vero floribus proxima valde anguſtis laciniis diſſecta. Gold-Blumen, Butter-Blumen.

RANVNCVLVS pratenſis, erectus, dulcis C. B. P. 179. Ranunculus dulcis Tabernæm. ſive batrachium ſalutiferum ejusdem in Icon. p. 51. In pratis paſſim Majo & Junio.

RANVNCVLVS pratenſis, repens, hirſutus C. B. P. 179. Ranunculus repens, flore luteo, ſimplici J. B. 2. 419. Ranunculus pratenſis, reptante cauliculo Lobel. Icon. 664. In hortis & pratis paſſim Junio & Julio. Germ. Hahnen-Fuß, Krähen-Fuß. Gallis Baſin.

RANVNCVLVS pratenſis, erectus, acris C. B. P. 178. Ranunculus pratenſis, ſurrectis cauliculis Lobel. Ranunculus ſylveſtris & II. Tabernæm. In pratis, ſylvis & pomariis paſſim floret Majo & Jun. In hujus folii medio ſæpe lata macula nigra deprehenditur.

RANVNCVLVS pratenſis, radice verticilli modo rotunda C. B. P. 178. Ranunculus minor Tabern. icon. 43. In pratis, ſylvis & ad ſepes floret cum præcedentibus. Hujus radix magnitudine variat; in hortis etiam flore pleno occurrit.

RANVNCVLVS montanus, folio aconiti, magno flore C. B. P. 178. Ranunculus magnus, valde hirſutus, flore luteo J. B. 3. 417. Im Cluſewitzer Holtze, floret Majo.

RANVNCVLVS paluſtris, apii folio C. B. P. 180. Ranunculus paluſtris, flore minimo J. B. 3. App. 858. Flo-

res habet exiguos, & ſemina in longius capitulum compacta; In paluſtribus v. g. im Stadt-Graben, floret Majo & Junio. Hic ranunculus pro vera herba Sardonia Veterum habetur, ex cujus eſu oritur ſpaſmus cynicus, qui riſus ſpeciem præ ſe fert in vultu ægri, unde adagium: riſus Sardonius. Hinter den Fecht-Boden, und bey den ſo genandten Teuffels-Loche, & aliis locis.

RANVNCVLVS arvenſis, echinatus C. B. P. 179. Ranunculus arvorum Lobel. icon. Arvenſis Tabernæm. In arvis & inter ſegetes paſſim floret Majo & Jun.

RANVNCVLVS aquaticus, cotyledonis folio. Ranunculus aquaticus, umbilicato folio F. Column. Ecphraſ. wird zuweilen unter dem hohen Ufer der Saale im Sande gefunden, wo man nach Cunitz gehet, floretque Junio.

RANVNCVLVS aquaticus, capillaceus C. B. P. 180. Millefolium aquaticum, foliis abrotani, ranunculi flore & capitulo C. B. P 141. Ranunculus aquatilis omnino J. B. 3. 781. In ſtagnis v. g. in denen Sümpffen, ſo im oberſten Theil der Druſenitz bey Winzerla ſind, auch bey Löbſtädt, und hinter Cunitz in aquis ſtagnantibus, ſo auf denen Wieſen befindlich. Floret Majo. vid. F. Columna in Ecphraſi, qui nitidam exhibet figuram.

RANVNCVLVS aquaticus folio rotundo & capillaceo C. B. P. 180. Ranunculus aquatilis, albus, tenuifolis J. B. 3. 781. in ſtagnis bey Städtgen Rothe und der frölichen Wiederkunfft hin; iſt auch häuffig bey Leipzig in ſtagnantibus, und bey Gießen in putridis & lacuſtribus um die Inſel in der Lahn oberhalb Wießeck. Floret Jun.

RANVNCVLVS aquatilis, albus, fluitans, peucedani foliis H. L. Bat. Millefolium aquaticum, foliis fœniculi, ranunculi flore & capitulo C. B. P. 141. Ranunculo, ſive polyanthemo aquatili, albo affine, milleſolium maratriphyllon fluitans J. B. 3. 782. Millefolium maratriphyllon tertium, flore & ſemine ranunculi aquatici, hepaticæ facie Lobel. icon. 741. In aquis profluentibus v. g. in der Saale unter und über der Schneide-Mühle, floret Jun. & Jul.

RANVNCVLVS longifolius, paluſtris, major C. B. P. 180.

180. Ranunculus longo folio, maximus, lingua Plinii J. B. 3. App. 865. Ranunculus lanceatus, major Tabern. icon. 48. In locis paludosis v. g. hinter Cluſewitz, nicht weit vom Pfarr-Höltzgen, mitten im Moraſt, floret Junio.

RANVNCVLVS longifolius, paluſtris, minor C. B. P. 180. Ranunculus longifolius, aliis flammula J. B. 3. app. 864. Ranunculus lanceatus minor Tabern. icon. 49. In pratis præcipue ſubudis, & ad illorum terminos ſive ſcrobes inter pratenſes frequens, floret Majo, Jun. & Jul.

RANVNCVLVS paluſtris, ſerratus C. B. P. 180. Flammula ranunculus, folio ſerrato Dodon. Pempt. 432. Ranunculus lanceatus, ſerratus Tabern. icon. 49. cum præcedente.

RANVNCVLVS hortenſis inclinans C. B. P. 179. Ranunculus hortenſis, reptante caulico Lobel. icon. 664. Im Fürſten-Garten floret Majo & Junio. Hic a ranunculo pratenſi, repente, hirſuto C. B. nonniſi flore pleno differt, vid. J. Bauhinus. In hortis quibusdam & ranunculus pratenſis, radice verticilli modo rotunda C. B. ſive ſceleratiſſimus Tragi flore pleno, quin & altero ex altero prodeunt quandoque occurrit. Cujus figura vid. in Tabernæmontano.

RANVNCVLVS aſphodeli radice, flore ſanguineo C. B. P. 181. Ranunculus Conſtantinopolitanus Cluſ. Hiſpan. & Camerar. Ranunculus polyphyllos, flore coccineo Cluſ. Pannon. Ranunculus Aſiaticus, grumoſa radice, pleno flore Cluſ. Hiſt. Plant. Rarior. In hortis v. g. im Fürſten-Garten, floret cum anemonæ ſpeciebus.

RANVNCVLVS aſphodeli radice, flore albo, pleno, cum præcedentibus.

RANVNCVLVS aſphodeli radice, flore ſubphœniceo, rubente C. B. P. cum præcedente.

MVOSSVRVS J. B. 3. 512. Holoſteo affinis cauda muris C. B. P. 190. Ranunculus gramineo folio, flore caudato, ſeminibus in capitulum ſpicatum congeſtis Tournefort. Inſtit. p. 295. Germ. Mauß-Schwantz ab ὁ μῦς mus & ἡ οὐρὰ cauda. Inter ſegetes bey Laaßdorff und Rode,

auch häuffig bey Gießen und Leipzig in vervactis. Floret Aprili & Majo. Hæc plantula & flore & ſemine a ranunculis recedit, id enim, quod pro flore caudato accepit Tournefortius, eſt embryo ſeminum ſpicatorum turba conſtans; petala vero ſunt concava inſtar floris ariſtolochiæ, & cauli appreſſa.

QVINQVEFOLIVM lupini folio, argenteo flore albo. Pentaphyllon album J. B. 2. 598. Quinquefolium album, majus, alterum C B. P. 325. In ſylvis montoſis v. g. auf dem Forſt, im Walde bey Coſpida und Iſerſtädtiſchen Holtze, floret Junio. Germ. Fünff-Blat, Fünff-Finger-Kraut mit weiſſen Blumen.

QVINQVEFOLIVM majus, repens C. B. P. 325. Pentaphyllum, ſive quinquefolium vulgare, repens J. B. 2. 398. Fünff-Finger-Kraut. Ad ſepes & in locis gramineis, acclivibus, apricis paſſim, floret Julio.

QVINQVEFOLIVM minus, repens, luteum C. B. P. 325. Pentaphyllon parvum, hirſutum J. B. 2. 598. Quinquefolii IV. flavo flore ſecunda ſpecies Cluſ. Hiſt. CVI. Pentaphyllum, ſive Quinquefolium minus Tabern. Icon. 132. In apricis paſſim, floret Aprili & Majo, quandoque & Martio.

QVINQVEFOLIVM minus, repens, lanuginoſum, luteum C. B. c. l. Quinquefolium IV. flavo flore prima ſpecies Cluſii Hiſtor. CVI. Pentaphyllum minus, molli lanugine pubeſcens flore luteo J. B. 2. In apricis, aſperis der Mittags-Seiten des Cunitzer-Berges hinten hinaus, floret Aprili & Majo.

QVINQVEFOLIVM folio argenteo C. B. P. Pentaphyllum rectum, foliis profunde ſectis, ſubtus argenteis, flore luteo J. B. 2. 398. Quinquefolium petræum, majus Tabern. Icon. 122. In apricis acclivibus v. g. am Stadt-Graben, & in vineis floret Majo & Junio.

QVINQVEFOLIVM rectum, album C. B. P. Quinquefolium Theophraſti album Tabern. Icon. 120. Quinquefolium rectum majus J. B. In horto medico ſponte autem provenit juxta Lipſiam in monte Kickerlikick. Sed

varias

variat ab hortensi hirsutie & foliorum latitudine. Floret Jun. & Jul.

QVINQVEFOLIVM montanum, sericea hirsutie obsitum, angustissimo folio, parvum. An pentaphylli quarti secunda species Clus. pannon. in asperis, & apricis, tenui gramine vestitis über dem Rauhenthal, qua ex hoc nemore pagus Closewitz petitur, floret Aprili & Majo.

PENTAPHTLLOIDES supinum J. B. 2. 398. Quinquefolio fragifero affinis C. B. P. 326. Pentaphyllum supinum quorundam, potentillæ facie Clus. Hist. CVII. Quinquefolium fragiferum, repens Tabern. Ad muros & parietes domuum gegen Dorndorff und Raschhausen über, auch häuffig bey Steinburg und Bibera, wie auch in denen Vor-Städten bey Naumburg und Weissenfelß.

PENTAPHTLLOIDES argenteum, alatum, seu Potentilla Tournef. Instit. p. 298. Potentilla seu argentina J. B. 2. 398. Argentina Dodon. Pempt. 600. Anserina offic. In areis & compitis, nec non in pascuis, præcipue anserum, ut & in agris humidioribus frequens; foliis sericeis & viridibus variat. Floret Majo & Jun. Germ. Gänserich.

PENTAPHTLLOIDES palustre, rubrum, Tournefort. p. 298. Quinquefolium palustre, rubrum C. B. P. 326. Pentaphyllum, vel potius heptaphyllum flore rubro J. B. 2. 398. Quinquefolium palustre, sive aquaticum Tabernæm. icon. 122. Quinquefolium palustre fragiferum, sive heptaphyllum porphyranthemum Camerarii in Epit. pag. 762. Germ. Gänse-Kraut, Sieben-Finger-Kraut. In pratis uligine madentibus, inter muscum palustrem albicantem cum rorella v. g. nach Rudersdorff und der Leuchtenburg zu, auch in denen Sümpffen beym Closswitzischen Pfarr-Höltzgen, cum ranunculo lanceolato majore. Floret Jun.

PENTAPHTLLOIDES rectum, fruticosum, Eboracense Morif. Hist. Oxon. P. 2. 193. Pentaphylloides fruticosum Raji Catalog. Plant. Angl. edit. 1677. In horto Medico floret Majo & Junio. In hoc hactenus loco seminum lanuginem quandam deprehendi, alias quoad petala & perianthium huc spectat.

FRAGARIA vulgaris C. B. P. 326. Fragaria ferens fraga rubra J. B. 2. 394. Fragum trifolium fragiferum Tabern. icon. 118. In pomariis & pratis, nec non ſylvis floret Maj. Erd-Beeren.

FRAGARIA fructu albo C. B. Fragaria ferens fraga alba J. B. Fragum album Tabernæm. Icon. 119. Preßlinge, Bröſslinge. vid. Camerar. Epit. Matthiol. pag. 355. dicuntur aliis etiam Knack-Beeren. In montis apricis, aſperis, floret cum præcedente.

FRAGARIA fructu parvi pruni magnitudine C. B. P. 327. Fraga fructu magno Eyſtett. In hortis variis v. g. Sereniſſ. Principis cum præcedentibus. Ad bacciferas plantas minime referri poteſt fragaria, quia ipſius ſemina ſunt nuda, carnoſæ pulpæ ſuperficiei undique adnata.

CARYOPHYLLATA vulgaris C. B. P. 321. Caryophyllata vulgaris, parvo flore, luteo J. B. 2. 398. Benedicten-Wurtzel, Märtz-Wurtzel, quia menſe Martio cereviſiæ inditur, ob virtutem aromaticam. Ad ſepes paſſim floret Majo & Junio.

CARYOPHYLLATA aquatica, nutante flore C. B. P. 321. Caryophyllata aquatica, flore rubro, ſtriato J. B. 2. 398. Septentrionalium rotundifolia, pappoſo flore caryophyllata Lobel. icon. 694. Interdum flos unus alteri innaſcitur, uti & fieri vidimus in floribus roſæ, de quo vid. Sibaldus in Scotia illuſtrata & Breynius. Auf ſümpffigten Wieſen nach Schleben und Rudersdorff zu, und bey Leipzig auf denen feuchten Wieſen beym großen und kleinen Kohl-Garten; bey Gießen in ſteltzen Morgen. Floret Majo. Occurrit etiam in horto medico.

III. Seminibus tectis capſula.

(1.) SIMPLICI.

ALSINE altiſſima nemorum C. B. P. 250. Alſine major, repens, perennis J. B. 3. 362. Alſine maxima, ſolanifolia Mentzelii Pug. Tab. 2. Ad ſepes paſſim v. g. bey Wenigen-Jena, im kleinen Paradieſe. Floret Junio & Julio.

ALSINE

ALSINE montana, latifolia, flore laciniato C. B. P. 251. Alsine hederacea, montana, maxima Column. Part. I. 290. Inter salices bey Wenigen-Jena; aber viel häuffiger hinter Laaßdorff nach Rode zu, auch zwischen Rod. und der Leuchtenburg, passim in umbrosis floret Majo; a priore foliis latioribus & hirsutis varie distinguitur, præterea cito defloret, nec scandit.

ALSINE media C. B. P. 250. Alsine vulgaris, sive morsus gallinæ J. B. 3. 363. Alsine officinarum. In cultis & agris passim, floret toto fere anno. Germ. Hüner-Darm, Hüner-Biß, Meyer, Meirich, Vogel-Kraut, quia aviculorum caveis circumpendunt. Magnitudine variat & forsan differt specie. Ab hoc vero plantæ genere differt toto cœlo alsine Dioscoridis s. Cynocrambe Fabii Col. & Touro. de qua vid. C. B. in notis ad Matthiol. Dioscoridem, nec non Tournef. in Corollario ad Institut. rei herbariæ.

ALSINE pratensis, gramineo folio, ampliore Tournefort. Caryophyllus arvensis, glaber, flore majore J. B. 3. 361. Gramen floridum majus Tabern. icon. 232. Apud nos non in pratis, sed in sylvis & dumetis provenit, v. g. im Rauhenthal und auf dem Tautenburgischen Forst, auch im Closewitzer Holtze, & alibi, Germ. Augen-Trost-Graß, floretque Majo.

ALSINE pratensis, gramineo folio, angustiore Tournefort. Caryophyllus arvensis, glaber, flore minore C. B. P. 210. Gramini Fuchsii leucanthemo similis & affinis planta J. B. 3. 361. Gramen floridum minus Tabern. icon. 232. Ad sepes variis in locis v. g. wo man nach dem Paradieß gehet, & alibi, floret Junio.

ALSINE nemorensis, foliis strictissimis, multiflora & multicaulis, nondum descripta, in denen Holtz-Schlägen zwischen Hummelshayn und der frölichen Wiederkunfft, e. g. im grünen Schlag, und Riesenck &c. Cum circæa minima, floret æstate.

ALSINE palustris, linifolia, magno flore lacteo. vid. Menzel. in pugill. in carectis & arundinetis im Closewitzischen Pfarr-Höltzgen, cum ranunculo arundinaceo majore. Floret Jun. & Jul.

ALSINE paluſtris gramineo folio, longiore, flore majore.

ALSINE longifolia, uliginoſis proveniens locis J. B. 3. 365. Alſine fontana Tabernæm. icon. 712. In umbroſis, udis, viis neglectis ſylvarum circa Kleinam & alibi ad fontes, und nach der frölichen Wiederkunfft hin; auch in denen Weiden an der Saale nach Cunitz zu. it. bey Leipzig, Gießen, Wittenberg, in locis paludoſis. Floret Majo & Junio Ex hac planta, & tribus ſequentibus Tournef. Genus ab Alſine ſeparatum conſtituit, ſed cum petala minus profunde ſecta, & vehiculum intortum, non ſufficientia ad genus ſeparatum conſtituendum, præſtat Alſinas congeneres referre; ſiquidem ipſe Tournef. minus conſcientioſe alias plantas ab Alſine longe magis differentes, quam hæc planta, Alſines generi permiſcuit v. g. arenariam & ſpergulam.

ALSINE hirſuta, magno flore, vaſculo corniculato. Myoſotis arvenſis, ſubhirſuta, flore majore Tournefort. p. 245. Caryoppyllus arvenſis, hirſutus, flore majore C. B. 210. Auricula muris, pulchro flore albo J. B 3. 360. Holoſtium caryophyllæum Tabern. Icon. 233. In aggeribus & juxta vias publicas, an Rändern paſſim juxta agros, floret Aprili & Majo.

ALSINE hirſuta, vaſculo corniculato, flore minore. Myoſotis arvenſis, hirſuta, parvo flore Tournefort. p. 243. Auricula muris quorundam, flore parvo, vaſculo tenui, longo J. B. 3. 359. In cultis & agris frequens floret Aprili & Majo.

ALSINE incana, vaſculo longiori, alpina, repens. Myoſotis incana, repens Tournef. Lychnis incana, repens C. B. P. 206. Im Fürſten-Garten. Majo. Vulgo hortulanorum ſed male lychnidem marinam appellant, cum lychnis marina anglica ab hac planta ſit longe diverſa. Fabio Columnæ dicitur ocymoides lychnidis, reptante radice; C. B. plantam hanc bis propoſuit.

ALSINE hirſuta, vaſculo longiori, minima. Myoſotis hirſuta, minor Tournef. Alſine hirſuta minor C. B. P. 251. In apricis aſperis floret Aprili, præcipue ubi gramine

ne tenui veſtiuntur loca, v. g. bey D. Teichmeyers Mühle bey der Purſchen-Schantze, noch häuffiger auf den Fuchs-Berge zwiſchen denen Wein-Bergen. Alſines petala ſunt biſida, adeo ut obiter inſpicienti decem videantur, ideoque ſequentes plantæ commodius a præcedentibus, quibus Tournefortius, una cum ſpergulis tetrapetalis, admiſcuit, ſub nomine arenariæ ſeparantur.

ARENARIA paluſtris. Arenaria, holoſtei forte genus Chabr. p. 550. Alſine paluſtris, tenuiſſimis foliis, ſive ſaxifraga paluſtris, alſinefolia Ger. Emac. Raj. Hiſt. 1032. vid. Plükenet. in Phytographia, qui & pro ſaxifraga Bavarica quorundam habet. Alſine nodoſa, germanica C. B. Prodr. pag. 118. 119. cur vero arenaria ab arenoſis locis dicatur, non capio; ſiquidem non arenoſa, ſed potius uliginoſa prata amet. In pratis uliginoſis, v. gr. bey Laaß-dorff auf der Walters-Wieſen. Floret Julio & Auguſto.

ARENARIA verna, ſtrictiſſimo folio. Alſine tenuifolia Chabræi p. 450. J. B. 3. 364. In dem ſteinigten Fahr-Wege, hinter der Papier-Mühle nach Volterôrode zu, floret Aprili & Majo.

ARENARIA arvenſis, vulgatior. Alſine ſpergula dicta, major C. B. P. 251. Germanis Spurree, a quibus valde extollitur ad pecora ſaginanda, unde & quibusdam Saginæ ſpergula dicitur. In agris nach Rode und Kleine zu häuffig, wird auch zuweilen im Sande an der Saal gefunden, floret Julio & Auguſto.

ARENARIA Verna, fugax, glabra, bifolia. Holoſteum caryophyllæum, arvenſe Tabernæm. icon. 233. Caryophyllus arvenſis, umbellatus, folio glabro C. B. P. 210. In agris & vineis paſim, auch am Stadt-Graben, dem Fürſten-Keller gleich über, floret Aprili & Majo.

ARENARIA maritima. Alſine ſpergulæ facie media C. B. P. 251. Spergula marina noſtras J. B. 3. 772. Bey Sultze und an der ſaltzigen See, variat flore majore & minore, pariter ac totius plantæ magnitudine; utroque vero flore purpureo, locis ſalſis floret Julio; Hujus ſemina limbo foliaceo ſunt cincta, non ſecus ac ſequentis; ſed hujus ſeminis limbus eſt minus latus, & flos ejusdem eſt purpu-

rens, ut de aliis taceam; fruſtra itaque ſuſpicatur Rajus eſſe unam eandemque plantam.

ARENARIA teretifolia, verna, flore albo, ſemine limbo foliaceo cincto. Alſine ſpergulæ facie, minima, ſeminibus marginatis Tournefort. p. 244. Alſine ſpergulæ facie minima Bot. Monſp. Hujus flos eſt lacteus, & raro aperitur, niſi tempore matutino. Moriſono dicitur Alſine ſpergula dicta, theretifolia, ſemine foliaceo in medio nigro aut fuſco, circulo membranaceo albido cincto. In agris arenoſis & lapidoſis nach der neuen Schencke und Rode gn. it. bey der Purſchen-Schantze ohnweit D. Teichmeyers Mühle, floret Aprili & Majo.

ARENARIA campeſtris, flore purpureo-cœruleo. Spergula purpurea J. B. 3. 722. Chabr. p. 549. Alſine ſpergulæ facie, minor, ſive ſpergula minor, floſculo ſubcœruleo C. B. P. 251. In agris & paſcuis bey Querl, item in agris bey dem Pfarr-Höltzgen, floret Junio, Julio & Auguſto.

ARENARIA plantaginis folio. Alſine folio plantaginis Chabræi p. 450. J. B. 3. 363. Ad muros ſepesque, ut & in ſalicum truncis putreſcentibus, nec non in ſylvis ad quercuum radices floret Majo, Junio & Julio. Semen hujus plantæ eſt rotundum glabrumque, perianthium quoque aliquatenus a reliquarum arenariarum perianthio recedit, quod J. B. figura ſua ſatis feliciter expreſſit.

ARENARIA multicaulis, ſerpillifolia. Alſine minor, multicaulis C. B. P. 250. Alſine minima J. B. 3. 364. In agris & muris paſſim, ubi caulium multitudine variat, & quandoque magis minusve erigitur, vel reſupinatur.

RORELLA vulgaris & officinarum. Ros ſolis folio ſubrotundo C. B. P. 309. Rorida, ſive Ros ſolis major Lobel. icon. 811. In pratis uligine madentibus, inter muſcum paluſtrem foliis reflexis albicantem & rubrum; hujus autem flos non eſt monopetalus, uti exiſtimavit Joh. Rajus in methodo plant. emend. & aucta. v. g. bey Schlefreiſen und Hanſpitzen, auch bey Bubeck und Waldeck, magna ſuperſtitione hæc planta a quibusdam colligitur, & ad varia uſurpatur magica. Floret Junio. Germ. Sonnen-Thau.

PAR-

PARNASSIA Tournefortii & Rivini; Gramen Parnaſſi, albo ſimplici flore C. B. P. 309. Gramen Parnaſi, Dodonæi, quibusdam hepaticus flos J. B. 3. 537. Hepatica alba officin. Ciſtus humilis Hermanni. Hæc plantula petala habet quaſi geminata, alia exteriora majora, & alia interiora longe minora, eleganter fimbriata & quaſi apiculata, quibus adjacens ſtamina & his embryo quadrangularis. Vel ſolius Parnaſiæ flos nobis teſtis erit & exemplum, quod propter flores compoſitos ex regularibus & irregularibus ſimul, non dentur alii nomine compoſitorum digni, uti vult Rivinus, in quo capite longe diſſentio ab eodem, pariter ac omnes reliqui Botanici mecum facientes. Provenit in pratis uliginoſis, v. g. wo man nach Prießnitz gehet, und in der Ziske, floret Auguſto & Septembri.

LYCHNIS hirſuta, flore coccineo, major C. B. P. 203. Flos Conſtantinopolitanus Dod. Pempt. 178. vulgo lychnis Trapezuntica & flos Hieroſolymitanus. In hortis variis floret Jun. & Jul.

LYCHNIS hirſuta, flore incarnato, major C. B. P. Cum præcedente; ambas vulgo Lychnidem Chalcedonicam appellant, reperitur & prior quandoque flore pleno.

LYCHNIS coronaria Dioſcoridis ſativa, flore ruberrimo, diluto & albo C. B. P. 203. In hortis variis floret Jun. Jul. & Auguſto.

LYCHNIS ſylveſtris, alba, ſimplex C. B. P. 204. Ocimoides album multis J. B. 3. 342. Ocimaſtrum, ſive ocymoides Tabern. icon. 299. Ad ſepes v. g. auf der Inſul und andern Orten, floret Jun. & Jul.

LYCHNIS alba, multiplex C. B. P. 204. Ocimoides album, flore pleno J. B. 3. 343. Ocimaſtrum multiflorum Tabern. icon. 300. Im Fürſten-Garten & aliis hortis cum præcedente.

LYCHNIS ſylveſtris, ſive aquatica, purpurea ſimplex C. B. P. 204. Ocimoides purpureum multis J. B. 2. 343. Ocimaſtrum rubrum Tabern. icon. 299. In locis ſubudis, v. g. In denen Weiden bey Wenigen-Jena, ubi & flore albo variat, copioſius quoque occurrit an der Rode bey Zöllnitz und Laaßdorff. Floret Jun. & Jul.

LYCHNIS

LYCHNIS purpurea, multiplex C. B. P. 204. Lychnis agreſtis, multiflora Lobel. icon. 336. In hortis variis floret cum præcedente. Ubi præ petalorum copia, non ſecus ac præcedens, & plures tunicæ flore pleno, perianthium ſæpe diſrumpit.

LYCHNIS ſegetum major C. B. P. 204. Pſeudomelanthium J. B. 3. 341. Nigellaſtrum Dodon. Pempt. 173. Inter ſegetes frequens floret Junio. A reliquis lychnidibus differt calicis, ſive perianthii ſegmentis prælongis, ultra petala longe excurrentibus. De hujus radicis mira virtute ſanguinem e naribus fluentem ſiſtendi vid. Simon Pauli in Botan. quadripartito. Germ. Raden. fl. majore & minore variat, qui communiter eſt purpureus, rariſſime albus.

LYCHNIS ſegetum rubra, foliis perfoliatæ C. B. P. 204. Vaccaria Dodon. Pempt. 104. J. B. 3. 357. Inter ſegetes paſſim floret Junio. Hujus petala raro in orbem explicantur, & perianthium præterea eſt valde anguloſum adeoque ex hac planta, ſi cuipiam placuit, ſeparatum genus conſtituere licebit, ſub titulo vaccariæ. Hujus ſemina non ſine errore pro ſemine perfoliatæ venduntur.

LYCHNIS noctiflora C. B. P. 205. Ocimoides non ſpecioſum J. B. 3. 344. Ocimoides noctiflorum Camerar. Hort. In arvis variis in locis v. g. nach Coſpida zu, und bey der neuen Schencke, auch bey Cloſewitz. Floret Junio & Julio.

LYCHNIS ſylveſtris, quæ ſaponaria vulgo Tournef. p. 336. Saponaria major, lævis C. B. P. 206. Saponaria vulgaris J. B. 3. 346. Seiffen-Kraut. Hujus ſtamina quandoque violaceo-nigra & ampla, pulvere nigro petala defœdantia evadunt; In ſalicetis auf der Inſul und bey Wenigen-Jena, floret Jun. & Jul.

LYCHNIS ſeu ſaponaria flore pleno Tourneſortii l. c. Saponaria flore pleno Corn. 209. In hortis floret cum præcedente.

LYCHNIS pratenſis, flore laciniato ſimplici Moriſ. Hiſt. Oxon. P. 2. 537. Flos cuculi odontites quibusdam J. B. 3. 347. Caryophyllus prateuſis, flore laciniato, ſimplici, ſive flos cuculi C. B. P. 210. Hæc eſt Lychnis Dunbrigenſis

sis J. Raji in hist. plant. universali. In pratis, v. g. im groß sen Paradieß. Majo & Junio; quandoque flore albo variat, quin & in hortis flore pleno occurrit. Germ. Guckucks-Baum.

LYCHNIS sylvestris, alba, spica reflexa, Botan. Monspel. Lychnis sylvestris, altera Monspeliensium, spica nutante H. R. Paris. In horto medico floret Julio & Augusto.

LYCHNIS hirsuta minor, flore variegato H. R. Paris. 99. Lychnis hirsuta, flore eleganter variegato Raji Histor. 997. In horto medico & aliis hortis, ubi quandoque satis inepte quinque vulnera Christi vocant, ob petala quinque, totidem sanguineis maculis notata.

LYCHNIS annua, minima, flore carneo, lineis purpureis distincto Tournefortii. Betonicæ sive tunicæ minimæ similis planta J. B. 3. 338. Lychnis minima, muralis Morisi. H. 2. Caryophyllus minimus, muralis C. B. vid. ejusdem figura in Mentzelii pugillo sub titulo Lychnidis palustris. Tab. VII. In agris arenosis nach Querl und Kleine zu, und zuweilen an der Saale gegen der Schneide-Mühle, Magnitudine florum variat. Floret Jul. & Aug.

TVNICA hortensis varia, simplex & plena. Quales ubique ab amatoribus horum coluntur & in pretio habentur, adeo ut varia iisdem imponant nomina quasi propria, non secus ac anemonis atque tulipis; de quo videatur Tournefort. aliique Floræ scriptores. Nelcken allerhand Sorten; allerhand Graß-Blumen.

TVNICA Silesiaca fl. majore, speciosa, pleno, elegantissime carneo; figura vid. in Tabernæmont. hujus flores expetuntur in officinis ad parandos pulveres sternutatorios, rubros, quos aliqui ex balaustiis parant.

TVNICA sinensis flore simplici pulcherrimo. Caryophyllus sinensis flore pulcherrimo. In horto Princip. fl. cum vulgaribus.

TVNICA supina, flore pleno, minore, rubro, argenteis micis aspersa. Caryophyllus supinus, flore, pleno, rubro, argenteis micis aspersa C. B. P. 208. In hortis floret Majo & Junio.

TVNI-

LYCHNIS purpurea, multiplex C. B. P. 204. Lychnis agreſtis, multiflora Lobel. icon. 336. In hortis variis floret cum præcedente. Ubi præ petalorum copia, non ſecus ac præcedens, & plures tunicæ flore pleno, perianthium ſæpe diſrumpit.

LYCHNIS ſegetum major C. B. P. 204. Pſeudomelanthium J. B. 3. 341. Nigellaſtrum Dodon. Pempt. 173. Inter ſegetes frequens floret Junio. A reliquis lychnidibus differt calicis, ſive perianthii ſegmentis prælongis, ultra petala longe excurrentibus. De hujus radicis mira virtute ſanguinem e naribus fluentem ſiſtendi vid. Simon Pauli in Botan. quadripartito. Germ. Raden. fl. majore & minore variat, qui communiter eſt purpureus, rariſsime albus.

LYCHNIS ſegetum rubra, foliis perfoliatæ C. B. P. 204. Vaccaria Dodon. Pempt. 104. J. B. 3. 357. Inter ſegetes paſsim floret Junio. Hujus petala raro in orbem explicantur, & perianthium præterea eſt valde anguloſum adeoque ex hac planta, ſi cuipiam placuit, ſeparatum genus conſtituere licebit, ſub titulo vaccariæ. Hujus ſemina non ſine errore pro ſemine perfoliatæ venduntur.

LYCHNIS noctiflora C. B. P. 205. Ocimoides non ſpecioſum J. B. 3. 344. Ocimoides noctiflorum Camerar. Hort. In arvis variis in locis v. g. nach Coſpida zu, und bey der neuen Schencke, auch bey Cloſewitz. Floret Junio & Julio.

LYCHNIS ſylveſtris, quæ ſaponaria vulgo Tournef. p. 336. Saponaria major, lævis C. B. P. 206. Saponaria vulgaris J. B. 3. 346. Seiffen-Kraut. Hujus ſtamina quandoque violaceo-nigra & ampla, pulvere nigro petala defœdantia evadunt; In ſalicetis auf der Inſul und bey Wenigen-Jena, floret Jun. & Jul.

LYCHNIS ſeu ſaponaria flore pleno Tourneſortii l. c. Saponaria flore pleno Corn. 209. In hortis floret cum præcedente.

LYCHNIS pratenſis, flore laciniato ſimplici Moriſ. Hiſt. Oxon. P. 2. 537. Flos cuculi odontites quibusdam J. B. 3. 347. Caryophyllus pratenſis, flore laciniato, ſimplici, ſive flos cuculi C. B. P. 210. Hæc eſt Lychnis Dunbrigenſis

sis J. Raji in hist. plant. universali. In pratis, v. g. im grossen Paradieß. Majo & Junio; quandoque flore albo variat, quin & in hortis flore pleno occurrit. Germ. Guckucks-Baum.

LYCHNIS sylvestris, alba, spica reflexa, Botan. Monspel. Lychnis sylvestris, altera Monspeliensium, spica nutante H. R. Paris. In horto medico floret Julio & Augusto.

LYCHNIS hirsuta minor, flore variegato H. R. Paris. 99. Lychnis hirsuta, flore eleganter variegato Raji Histor. 997. In horto medico & aliis hortis, ubi quandoque satis inepte quinque vulnera Christi vocant, ob petala quinque, totidem sanguineis maculis notata.

LYCHNIS annua, minima, flore carneo, lineis purpureis distincto Tournefortii. Betonicæ sive tunicæ minimæ similis planta J. B. 3. 338. Lychnis minima, muralis Moris. H. 2. Caryophyllus minimus, muralis C. B. vid. ejusdem figura in Mentzelii pugillo sub titulo Lychnidis palustris. Tab. VII. In agris arenosis nach Querl und Kleine zu, und zuweilen an der Saale gegen der Schneide-Mühle, Magnitudine florum variat. Floret Jul. & Aug.

TVNICA hortensis varia, simplex & plena. Quales ubique ab amatoribus horum coluntur & in pretio habentur, adeo ut varia iisdem imponant nomina quasi propria, non secus ac anemonis atque tulipis; de quo videatur Tournefort. aliique Floræ scriptores. Nelcken allerhand Sorten; allerhand Graß-Blumen.

TVNICA Silesiaca fl. majore, specioso, pleno, elegantissime carneo; figura vid. in Tabernæmont. hujus flores expetuntur in officinis ad parandos pulveres sternutatorios, rubros, quos aliqui ex balaustiis parant.

TVNICA sinensis flore simplici pulcherrimo. Caryophyllus sinensis flore pulcherrimo. In horto Princip. fl. cum vulgaribus.

TVNICA supina, flore pleno, minore, rubro, argenteis micis asperso. Caryophyllus supinus, flore, pleno, rubro, argenteis micis asperso C. B. P. 208. In hortis floret Majo & Junio.

TVNI-

TVNICA ſupina, flore pleno, incarnato. Caryophyllus multiplici, laciniato flore, incarnato Eyſtett. In hortis cum præcedentibus.

TVNICA latifolia, floribus umbellatis; Caryophyllus Carthuſianorum primus Tabern. icon. 285. Floribus rubris, albis & ex rubro alboque varie mixtis variat; vulgo Cartheuſer-Nelcken; floret Junio. vid. Cluſ. qui teſtatur hanc plantam copioſam provenire ſpontaneam, in ſylvis circa caſtrum Comitis Baduani.

TVNICA montana, altiſſima, flore tenuiſſime laciniato. Caryophyllus plumarius albus & purpuro-cœruleus Tabern. icon. p. 286. & 287. Betonica coronaria tenuiſſime diſſecta, ſive caryophyllea ſuperba, elatior, vulgaris J. B. & Chabr. p. 440. auf der Wellmeſe und auf dem Forſt, floret Aug.

TVNICA ſylveſtris, vulgaris, multiflora. Caryophyllus montanus I. Tabern. icon. 287. Caryophyllus ſylveſtris, vulgaris, latifolius C. B. P. 209. Betonica coronaria, ſive caryophyllus ſylveſtris, vulgatiſſimus J. B. 3. 334. Donner-Näglein. In pratis ficcioribus, wo man nach Löbſtädt gehet, floret Majo & Jun.

TVNICA ſylveſtris ſupina floribus elegantur micantibus. Caryophyllus ſimplex minor flore punctato. C.B.P. pag. 208. variat flore minore & repit non ſecus ac præcedens. Provenit frequens ad ſepes & in acclivibus bey Städtgen Rode. Floretque Jun. & Jul.

TVNICA ſylveſtris, faſciculatis floribus. Caryophyllus ſylveſtris prolifer C. B. P. 209. Betonica coronaria, ſquamoſa, ſylveſtris J. B. 3. 335. Armeria prolifera Lobel. icon. 449. In aſperis, apricis, montoſis, v. g. in vineis meridiei expoſitis, & ad eorum terminos aſperos variis in locis, floret Jun. & Jul.

TVNICA ſylveſtris, anguſtifolia, umbellata, hirſuta. Viola barbata Dalechampii J. B. Caryophyllus barbatus ſylveſtris C. B. Pin. p. 209. in ſylvis v. gr. bey Cloſewitz und Iſerſtädt, floret Jun. & Jul.

TVNICA ſylveſtris ſupina, flore unico. Caryophillus ſylveſtris, humilis, flore unico C. B. P. 209. Botanica coronaria,

naria, ſive caryophyllea repens, rubra & alba J. B. 3. 325. Bey Rode, floret Jul.

HELIANTHEMVM annuum, foliis plantaginis hirſutis, flore ochroleuco, ad ungues macula rubra notata. Helianthemi nova ſpecies, Fabii Column. vid. Chabræus in Giograph. ſtirpium, Ciſtus annuus iſt häuffig zwiſchen Teichel und Tragun bey Wittenberg, juxta ſemitas in ericetis, floret Jul.

HELIANTHEMVM vulgare, flore luteo J. B 2. 15. Chamæciſtus vulgatis, flore luteo C. B. P. 465. Flos ſolis Dod. Pempt. 193. Panaces chironicum Matthioli; in aſperis, in cultis & apricis floret Majo & Junio; perianthium habet triphyllum, capſulam triangularem, trivalvem, nec tamen tripartitam. Flore dilutiore & albicante variat. Germ. Kirſch-Jſop, Heyden-Jſop, Sonnen-Günſel.

HELIANTHEMVM ſerpilli folio, flore majore, aureo, odorato Tourn. Chamæciſtus ſerpilli folio, nigricante & hirſuto, flore aureo, odorato J. B. 2. 17. Chamæciſtus repens, ſerpillifolia, lutea C. B. Pin. 466. in aſperis & lapidoſis bey Naumburg, Freyburg und Laucha, floret Majo & Junio. Ciſtus humilis ſecundus dicitur Cluſio in hiſt. pag. 152. vid. & Matthiolus Caſparis Bauhini.

HELIANTHEMVM flore maculoſo Col. part. 2. 77. Ciſtus flore pallido, punicante macula inſignito C. B. Pin. 465. Ciſtus annuus ſecundus Cluſii (in hiſt. hiſpan. pag. 153.) flore pallido, macula punicante inſignito J. B. 2. 13. in ericetis prope Wittebergam beym Dorff Teichel floret Jun. & Jul.

TAMARISCVS Germanica Lobel. icon. 218. Tamarix fruticoſa, folio craſſiore, ſive Germanica C. B. P. 485. Tamarix Germanica, ſive minor, fruticoſa J. B. 1. 351. In horto medico floret Junio. Tamariſcken, wächſt an denen Flüſſen. v. gr. am Leich in Schwaben.

PORTVLACA latifolia, ſive ſatiua C. B. P. 288. Portulaca hortenſis, latifolia J. B. 3. 678. In hortis variis floret Jun. & Jul. Portulack, Purtzel.

PORTVLACA ſpuria, aquatica. Hæc differt a præcedente,

dente, perianthio pelviformi, monophyllo, & quinque vel ſex crenis per limbum diſſecto, quod capſulam nullatenus tegit, ſed ſaltem inferius cingit; Capſula vero eſt ſimplex, depreſſa, in ſingula foliorum conjugatorum ala ſingula, ſeſſilis ex adverſo, per maturitatem horizontaliter diſſiliens, ſimplex pariter, an vero flos ſit pentapetalus, an polypetalus, hacteuus determinare non potui; ſiquidem ob inſignem floris petalorum fugacitatem, quas tamen revera habet, nonniſi unicum in illa deprehendere potuerim. Interim ob convenientiam aliquam in facie externa cum portulaca, huc reponere volui, donec quispiam exactius ipſius florem examinaverit, vid. Rajus in Hiſtor. Plant. Hæc eſt Alſine paluſtris minor ſerpillifolia C. B. in Prodr. p. 118. Sive Glaux paluſtris flore ſtriato clauſo, foliis portulacæ. Tourneſ. Provenit in locis, ubi per hyemem aquæ ſtagnarunt, & juxta ſcrobes, v. g. nebſt der Flachs-Kauthe bey Ketſchau am Wege, item unter den Teuffels-Loche, und nach Rothe und Kleine zu, floret Auguſto & Septembri.

CAMERARIA, ſive Portulaca arvenſis, exigua Cameerarii; ut & Alſine aquatica, ſurrectior Chabr. p. 566. Alſine fluviatilis Tabern icon. 713. has duas enim plantas nonniſi loco natali differre, cum Rajo cenſeo. In agris arenoſis argilloſisque bey Städtgen Rothe, und im grünen Bach, ſo aus dem grünen Teich kömmt, im Walde zwiſchen Hummelshäyn und der frölichen Wiederkunfft, floret Majo & Iunio. Floſculos habet exiguos, albos, pentapetalos, vel ſaltem integros non decidentes, & qui ab embryone in quinque petala dirimuntur; vaſculum eſt ſimplex, trivalve & triſpermum.

AMARANTHVS maximus C. B. P. 120. Blitum maximum, ſive amaranthus major, ſemine albo I. B. 2. 968. Germ. Fuchs-Schwantz, floret in hortis Iul. & Aug.

AMARANTHVS maximus, ſemine rubello, qui granis rubris Petri Ciccæ. C. B. P. 121. In hortis cum præcedente. Hujus panicula prælonga ad terram dependet.

AMARAN-

AMARANTHVS major paniculis viridibus erectis Moriſoni Hiſt Oxon. 2. Blitum majus paniculis erectis viridibus Volkammeri pag. 66. Sed differunt Blitum & Amaranthus, ſiquidem illud habeat florem imperfectum & conglomeratum; hic vero perfectum & regularem pentapetalum.

AMARANTHVS ſylveſtris maximus, novæ Angliæ, totus viridis H. R. Pariſ. Amaranthus ſylveſtris, maximus, novæ Angliæ, ſpicis viridibus Raj. Hiſt. 201. In horto medico floret cum præcedentibus. Hi amaranthi ſunt monoſpermi, h. e. in ſingula capſula nonniſi unicum continent ſemen; ſequentes vero ſunt polyſpermi.

AMARANTHVS panicula incurva C. B. P. 121. Amaranthus panicula ſpecioſa, criſtata J. B. 2. 969. Amaranthus holoſericeis, ſanguineis, reticulatis floribus Lobel. Icon. 252. & variorum aliorum colorum occurrit aliquando in hortis, floretque Jul. & Aug. Germ. Hahnen Kamm. Floramor.

AMARANTHVS ſimplici panicula C. B. P. 121. Amaranthus anguſtifolius, ſimplici panicula Lobel. icon. 251. Amaranthus purpureus J. B. 2. 968. cum præcedentibus.

AMARANTHVS ſpicatus ſericeus, flore luteo, viréſcente. H. R. P. in hortis cum præcedente.

(2) CAPSVLA GEMELLA.

GEVM rotundifolium majus Tournefort. p. 251. Sanicula montana, rotundifolia, major C. B. P. 243. Sanicula alpina, guttata J. B. 3. 707. Sanicula montana II. Cluſii Hiſt. 307. In horto medico & aliis floret Majo & Junio.

GEVM folio ſubrotundo, minus Tournef. Cotyledon altera, olim Matthioli J. B. 3. 684. Chabr. 537. cum præcedente. Vulgus Jehovas-Blümgen inepte vocat, quia putat guttulas ſ. puncta in flore nomen Jehovæ exprimere & denotare.

GEVM foliis oblongis ſerratis. Cotyledon altera Matthioli an Palmaria Tabernæmontani? in hortis Curioſorum floret cum præcedentibus.

SAXIFRAGA rotundifolia, alba C. B. P. 309. Saxifraga alba, radice grumosa J. B. 3. 706. Saxifragia alba Dodon. Pempt. 316. & officinarum; In locis tenui gramine vestitis & apricis bey der neuen Schencke, und weiter nach Rode zu. De altera, specie hujus plantæ ad alas foliorum bulbulos instar dentariæ bulbiferæ gignente. vid. Fabius Columnæ. Hujus, vulgaris nempe & nostratis, radix grumosa in officinis inepte pro semine venditatur; gignit enim præter hos bulbulos perfectum semen in capsula bicorni & bipartita, more congenerum, quod utrumque Camerarius in sua Matthioli Epitome pag. 334. figura satis feliciter expressit. Floret Aprili & Majo. Germ. Weisser Steinbrech.

SAXIFRAGA verna, annua, humilior Tournef. Inst. 252. Sedum tridactylites tectorum C. B. P. 285. Tridactylites tectorum flore albo J. B. 3. 762. Paronychia altera Dodon. Pempt. 112. Alsine petræa, rubra Tabern. icon. 708. In petris & ruderibus bey dem Fuchs-Thurm, flore Aprili & Maj.

SAXIFRAGA muscosa, trifido folio Tournefort. Sedum alpinum, trifido folio C. B. P. 284. Sedis affinis, trisulca, alpina, flore albo J. 3. 696. Sedum minus XIII. Clusii Hist. LXII. In hortis variis floret Majo & Jun.

SAXIFRAGA sedi folio, angustiore, serrato Tournefortii. Cotyledon media, foliis oblongis serratis C. B. P. 285. Sedum serratum J. B. 3. 689. Umbilicus Veneris minor I. & II. Tabern. icon. 874. In hortis variis, ubi vulgo Gänse-Zunge appellant, floret Maj. & Jun.

STAPHYLODENDROM Matthioli 274. J. B. 1. 274. Pistacia sylvestris C. B. P. 401. Germ. Teutsche Pimpernüß. In horto medico & aliis floret Majo & Jun.

(3) CAPSVLA TRIPARTITA.

HYPERICVM vulgare C. B. P. 279. St. Johannis-Kraut. Hypericum vulgare, sive perforata, caule rotundo, foliis glabris J. B. 3. 381. In vineis & agrorum montosorum marginibus frequens floret Jun. Foliorum latitudinem ire variat.

HYPE-

HYPERICVM minus, ſupinum, vel ſupinum glabrum C. B. P. Hypericum ſupinum Ill. minimum Cluſ. Hiſt. CLXXXI. In agris arenoſis, nach der Leuchtenburg und Rode zu, auch bey der neuen Schencke, item bey Altenbergen. Floret Jul. & Aug.

HYPERICVM villoſum, erectum, caule rotundo Tournefort. Androſæmum hirſutum C. B. P. 280. Hypericum androſæmum dictum J. B. 3. 382. Androſæmum alterum, hirſutum Column. P. 1. Ecphraſ. 74. In ſylvis variis v. g. im Rauhenthal, auf dem Forſt, und gegen dem Fürſten-Brunnen über, floret cum præcedentibus. Hartheu, Cunrad.

HYPERICVM elegantiſſimum, non ramoſum, folio lato J. B. Androſæmum campoclarenſe Column. P. 1. Ecphraſ. 74. Androſæmum glabrum non ramoſum Bot. Monſp. In ſylvis variis, v. g. im Rauhenthal, auf der Wellneſe, floret cum præcedentibus.

HYPERICVM minus erectum C. B. P. 279. Hypericum pulchrum I. quartum Tragi. In ſylvis bey Gießen, v. gr. in der Linder-Marck, floret cum reliquis hyperici ſpeciebus.

HYPERICVM aſcyron dictum, caule quadrangulo J. B. 3. 382. Aſcyron Dod. Pempt. 78. hoc C. B. inter varietates vulgaris recenſuit, verum minus recte, non ſolum enim caules quadrangulos gerit, ſed & flores reliquis longe minores. Naſcitur ad rivulos, v. g. am Mühl-Graben vor dem Johannis-Thore, und im Bache zwiſchen dem Fürſten-Brunnen und Wöllnitz, floretque cum præcedentibus.

HYPERICVM fruticoſum, creticum, fœtidiſſimum, ſtaminibus florum longiſſimis. Androſæmum fœtidum, capitulis longiſſimis filamentis donatis C. B. P. 280. Tragium creticum Bellonii. Bocks-Kraut vulgo, a fœtore. In hortis floret cum præcedentibus.

DRYMOPOGON Rivini. Drymopogon I. Tabern. Icon. 777. Barba capræ, floribus oblongis J. B. 3. 488. Im Holtze bey Scheitz, & in ſylva prope pagum, wo man nach Nerckewitz gehet, Floret Majo & Jun.

MVSCIPVLA pratenſis, veſicaria. Lychnis ſylveſtris, quæ Been album vulgo C. B. P. 205. Been album officinarum J. B. 3. 356. Been album, ſive Polemonium Dod. Pemp. 172. Germ. dicitur Wiederſtoß. Ruſtici ex hujus foliis parant olus quoddam; prope Islebiam dicitur Schacht-Kraut, quia libenter naſcitur circa introitus metallifodinarum, qui Germanis Schacht dicuntur. In pratis frequens floret Majo & Jun.

MVSCIPVLA montana, hirſuta. Lychnis montana, viſcoſa, alba, latifolia C. B. P. 205. Polemonium petræum Geſneri J. B. 3. 351. Lychnis ſylveſtris IX. Cluſii Hiſt. 291. Lychnis ſylveſtris Tabern. icon. 293. In dumetis variis v. g. nach Wöllnitz zu, floret Jun.

MVSCIPVLA hiſpanica, latifolia, umbellata, lævis. Lychnis viſcoſa, purpurea, latifolia, lævis C. B. Centaureum minus, adulterinum, quibusdam lychnidis viſcidæ genus J. B. 3. 355. Lychnis ſylveſtris I. Cluſ. Hiſt. 288. In hortis floret Jun. & Jul. Floribus pallide rubris & albis aliquando variat.

MVSCIPVLA hiſpanica, latifolia, caliculis turgidis, ſtriatis; Lychnis ſylveſtris, latifolia caliculis turgidis, ſtriatis C. B. P. 205. Muſcipula major, calice turgido, ventricoſo J. B. 3. 349. Lychnis ſylveſtris III. Cluſii hiſpanica p. 338. In horto medico. Majo.

OTITES Tabern. Ohr-Löffflein-Kraut, ejusdem Seſamoides magnum Salmanticum C. Cluſ. in hiſt. Plant. per Hiſp. naſcentium pag. 344. Lychnis viſcoſa flore muſcoſo C. B. Pin. pag. 206. Provenit copioſe zwiſchen der ſaltzigen See und Helffta, auch wo man von der ſaltzigen See nach Langen-Bogen gehet. Hæc planta omnino differt a reliquis lychnidis, muſcipulæ, & veſicariæ ſpeciebus; ſiquidem flores habeat duplicis generis, alteros ſolis ſtaminibus ornatos & majores, alteros vero minores, & ſolis piſtillis embryoni inſidentibus fœtos, adeoque patet, quod hæc planta mereatur ſeparari & diſtingui a lychnide, muſcipula & veſicaria.

(4) CAPSVLA QVINQVEPARTITA.

VISCARIA Rivini. Lychnis ſylveſtris, viſcoſa, rubra, anguſtifolia C. B. P. 205. Lychnis ſylveſtris III. Cluſii Hiſt. 289. In montoſis, ad ſepes & dumeta nach Laaßdorff und Rode zu, floret Jun. & Jul. In hortis quoque flore pleno alitur. Germ. Pech-Nelcken, Kleeb-Lychnis.

CISTVS folio ſalviæ. Ciſtus fœmina folio ſalviæ, elatior & rectis virgis C. B. P. 464. Ciſtus fœmina monſpeliaca, flore albo J. B. In hortis Jun.

CISTVS rotundifolius, flore roſeo. Ciſtus mas, major, folio rotundiore J. B. 2. 2. Ciſtus mas, folio rotundo, hirſuto C. B. P. 404. cum præcedente. Floret Majo & Julio.

LEDVM roſmarini folio Tabern. Ledum Sileſiacum Cluſiii Pannon. Roſmarinum ſylveſtre Matthioli. Ciſtus ledon foliis roſmarini ferrugineis C. B. P. 467. In ſylvis hinter Schlefreiſen nach Laußnitz zu, auch nach dem Voigtlande hin. Aliqui ad ſpiræas referunt. Germ. wilder Roßmarin, Heiden-Bien-Kraut, Motten-Kraut, Poſt-Kraut, Kühn-Poſt, oder Poſt ſimpliciter; hoc aliqui nefario auſu cereviſiæ incoquunt, ad temulentiam promovendam & accelerandam. v. gr. circa Wittebergam & Schmidebergam. Bohemi & Variſci vocant weiſſe Heide, & teſtibus apponitur vulgo, ad abigendas tineas. Floret Majo & Jun.

ACETOSELLA vulgaris & officinarum. Oxys, flore albo & purpuraſcente Tournefort. Inſtit. p. 88. Oxys, ſive Trifolium acidum, flore albo J. B. 2. 387. Trifolium acetoſum, vulgare, flore albo & purpuraſcente C. B. P. 330. Cur Tournefortius hunc florem campaniformem dixerit, non video, cum non ſit monopetalus, ſed pentapetalus, uti ungues conſideranti patebit, quamvis ad latera cohærere videatur. Germani Sauer-Klee, Buch-Ampfer vocant; oder alleluja, quibusdam corrupte Lujula. Provenit an denen Hecken bey Ziegenhayn und Jena-Prießnitz, auch im Walde bey Jferſtädt, item häuffig in denen Wäldern hinter Kleine und Schlefreiſen, floret Aprili.

ACETOSELLA flore luteo, capſula corniculata; Oxys lutea J. B. 2. 338. Oxys, ſive Trifolium acetoſum, flore luteo Dodon. Pempt. 579. Trifolium acetoſum, corniculatum C. B. P. 330. In horto medico & aliis floret Majo, & hinc tota fere æſtate & autumno floribus fructibusque onuſta conſpicitur.

FABAGO Tournefortii. Capparis fabago vulgo. Capparis ſylveſtris S. Fabaginea Camerar. Epit. p. 198. in hortis Curioſorum floret Jun.

FAGONIA Tournef. Trifolium creticum ſpinoſum C. B. in hortis Curioſorum floret æſtate.

SEDVM minus, teretifolium, album C. B. P. 283. Sedum minus, flore longiuſculo, tereti J. B. 3. 690. Sempervivum ſive ſedum minus Matthioli. Vermicularis, craſſula minor officinarum & illecebra major Lobel. Icon. 377. Auf der Mauer des horti medici, auch im Fürſten-Garten, und zuweilen auf denen Wänden der Dörffer, floret Jun. & Jul.

SEDVM minus, luteum, folio acuto C. B. Sedum minus, flore luteo J. B. 3. 692. Sedum minus, hæmatodes I. Tabernæm. icon. 843. cum præcedente.

SEDVM parvum, acre, flore luteo J. B. 3. 694. Sempervivum minus, vermiculatum, acre C. B. Sedum minus VIII. cauſticum Cluſ. Hiſtor. CXI. Illecebra offic. Semper vivum minimum Matthioli. In muris & tectis paſſim floret Junio; Tabernæm. icon. 844, ſedum minimum vocat. Germ. Mauer-Pfeffer, Katzen-Träuble, laudatur contra febres & ſcorbutum.

SEDVM minimum, luteum, non acre J. B. 3. 695. Sempervivum minus vermiculatum, inſipidum C. B. P. 284. cum præcedente, ſed rarius v. g. um die neue Schencke, und nach Rode zu; Differt & foliis a præcedente, uti conſideranti clarius patebit.

SEDVM paluſtre, ſubhirſutum, purpureum C. B. P. 285. Sedum purpureum, pratenſe J. B. 3. 692. Sedum minus III. ſive paluſtre Cluſ. Hiſt. LIX. In pratis uligine madentibus bey der Schneide-Mühlen ohnweit Schlefreiſen, item auf feuchten Aeckern zwiſchen Schiblau und der

Leuchten-

Leuchtenburg, floret Junio & Julio. Flore albo variat.

FABARIA officinarum. Anacampſeros, vulgo faba craſſa J. B. 3. 681. Telephium vulgare C. *B.* P. 287. Telephium alterum, ſive craſſula Dodon. Pempt. 139. Ad ſepes, in vineis & agris frequens floret Junio & Julio. Fette Henne, Donner-Kraut, Schmeer-Wurtz, Knaben-Kraut. Florum colore variat.

FABARIA rotundiſolia, repens & ſemper virens. Anacampſeros minor, rotundiore folio, ſempervirens I. B. 3. 682. Telephium repens, folio deciduo C. *B.* P. 287. Telephium minus, ſempervirens Lobel. Icon. 390. Telephium minus Tabernæm. icon. 846. In hortis variis floret æſtate.

SPIRÆA ſalicis folio Tournefort. Inſtit. p. 618. Frutex ſpicatus, foliis ſalignis ſerratis C. *B.* P. 475. Spiræa Theophraſti forte Cluſio I. B. 1. 559. Spiræa Theophraſti forte Cluſii Hiſtor. 84. Im Fürſten-Garten, floret Iunio.

SPIRÆA hyperici folio, non crenato Tournefort. Inſtit. p. 618. hypericum arboreſcens Munt. Phytogr. Fig. 181. Pruno ſylveſtris affinis, canadenſis C. *B.* P. 517. Im Fürſten-Garten, ubi vulgus hyperico annumerat, floret Majo.

ASCYRVM exiguo folio, flore magno. Tournef. Hypericum montis Olympi D. Wheleri. In hortis Curioſorum floret æſtate.

GRVINALIS pratenſis, foliis ranunculi, aconitive. Geranium batrachoides, folio aconiti C. *B.* P. 317. Geranium batrachoides aliud, folio nitente Cluſii I. B. 3. 476. In pratis frequens floret æſtate; flore albo, lineis cœruleis variegato, ut & prorſus albo quandoque variat. Storch-Schnabel.

GRVINALIS pratenſis maxima, folio aconiti, minus profunde laciniato; Geranium batrachoides maximum, minus laciniatum, folio aconiti I. *B.* 3. 477. Geranii majoris ſpeices, foliis magnis, figura fere & magnitudine aconiti lutei, hirſutis, aſperis Geſn. App. 292. Ab hoc mi-

nime differt Geranium craſſo batrachoidis folio Boccon. Muſ. part. 2. Tab. 128. Geranium ſupinum rotundo batrachoidis craſſo, tomentoſo folio, radice rufeſcente, longius radicata, ejusdem p. 160. In pratis, præcipue ſubudis & alnis obſitis floret æſtate & autumno.

GRVINALIS montana, hæmatodes. Geranium ſanguineum, maximo flore C. *B.* P. 318. Geranium ſanguineum, ſive hæmatodes, craſſa radice I. *B.* 3. 478. Geranium VIImum hæmatodes Cluſ. hiſt. Germ. cum Trago Blut-Wurtz dicitur. In montium ſylvis paſſim v. g. auf dem Forſt und Cunitzer Berge. Floret æſtate; Flore variegato, elegantiusque ſtriato quandoque variat, quod dicitur.

GRVINALIS montana, hæmatodes, flore variegato. Geranium hæmatodes, flore variegato Hort. Edinburg. Geranium hæmatodes, Lancaſtrenſe, flore eleganter ſtriato Raj. Hiſt. 1061. cum præcedente, ſed rarius.

GRVINALIS petalis eleganter ſtriatis. Geranium Romanum verſicolor, ſive ſtriatum Parkinſon. Paradiſ. 229. In hortis floret æſtate. Flos aliquatenus ſimilis eſt flori acetoſellæ.

GRVINALIS petalis fuſcis, reflexis. Geranium phæum, ſive fuſcum, petalis reflexis Moriſ. H. O. pag. 2. 515. Geranium phæum flore reflexo I. *B.* 3. 477. In hortis floret æſtate.

GRVINALIS montana, petalis nigro-fuſcis & obſcuris, planioribus. Geranium phæum, ſive fuſcum, petalis rectis, ſeu planis Moriſon. c. l. Geranium phæum, ſive pullo flore Cluſii I. *B.* 3. 477. cum præcedente; folia communiter maculata habet.

GRVINALIS folio malvæ rotundo; Geranium folio malvæ rotundo C. *B.* 318. Geranium folio rotundo, multum ſerrato, ſive columbinum I. *B.* 3. 473. Pes columbinus Dodon. Pempt. 61. In agris paſſim floret æſtate.

GRVINALIS folio malvæ rotundo, flore majore. Hujus Bauhinus meminit inter varietates præcedentis. In pagis ad ſepes, & in pomariis, v. gr. in Laaßdorff, Dörffgen Rode, und bey dem Rodiſchen Eiſen-Hammer, floret æſtate.

GRVI-

GRVINALIS folio malvæ rotundo, flore pediculo, longiſſimo inſiſtente. Geranium columbinum, annuum, minus, folio tenuius laciniato, flore pediculo longiſſimo inſiſtente Moriſ. H. O. p. 2. 512. Geranium columbinum, diſſectis foliis, pediculis florum longiſſimis Raj. Hiſt. 1059. In agris nach Rode und den Voigtlande hin, floret æſtate.

GRVINALIS arvenſis, folio tenius diſſecto, levi, flore cœruleo. Geranium gruinale, folio minutim diviſo, geranium violaceum quibusdam Chabr. p. 486. In agris, vineis illorumque limitibus floret æſtate.

(5) CAPSVLA DECEM LOCVLAMENTIS DISCRETA.

LINVM ſativum C. B. P. 214. Linum J. B. 3. 450. Linum ſativum, vulgare cœruleum Lobel Icon. 412. In agris paſſim ſeritur. Floret pro diverſo ſationis tempore; quin & majorem & minorem ſpeciem agnoſcunt agricolæ. Flachs, Lein.

LINVM ſativum, latifolium, africanum, fructu majore Tournefort. Inſtit. p. 339. In horto medico floret Jun. In ſingula capituli lini capſula, ſingulum ineſt ſemen, & quia adeo eſt conſtans numerus capſularum, a ſequente ſeparandum duxi.

LINVM catharticum D. Wedelii & Gerhardi Angli. Linum pratenſe floſculis exiguis C. B. Pin. p. 214. In pratis & ſylvis frequens floret æſtate. Genuina eſt ſpecies lini. J. Bauhino, dicitur alſine verna, glabra, floſculis albis, l. potius linum minimum. De variis aliis lini ſylveſtris ſpeciebus conſulatur Caroli Cluſii hiſt. plant. rar. per Hiſpanias & pannonias naſcentium.

(6) CAPSVLA MVLTIPLICI.

CALTHA paluſtris flore ſimplici C. B. P. 276. Caltha paluſtris J. B. 3. 470. Populago flore majore Tournefort. Populago major Tabernæm. icon. 750. In pratis udis, im groſſen Paradieß, bey Cunitz, & alibi floret Aprili. Wie-

ſen-Blume, Dotter-Blume. Hujus flores nondum apertos, aliqui inſtar capparum præparant.

CALTHA flore pleno. Populago flore pleno Tournefortii. Populago multiflora Tabern. icon. 751. Caltha paluſtris, flore pleno G. B. P. Im Fürſten-Garten, cum præcedente.

V. Seminibus tectis bacca, (pomoque.)

(5) MONOPYRENA.

PRVNVS ſativa vulgaris; Prunus fructu magno, craſſo, ſubacido Tournefort. Inſtit. p. 622. Pruna magna, craſſa, ſubacida C. B. P. 443. Pruna Hungarica, præſtantiſſima, Damaſcena forte Geſneri. In hortis & pomariis paſſim, ubi Zwetſchen und Quetſchen vocantur, florent Majo; vocantur & Saxonibus Pflaumen, quod nomen generale & toti generi commune.

PRVNVS fructu majore, rotundo, rubro Tournefortii; Pruna magna, rubra, rotunda C. B. P. 343. cum præcedente.

PRVNVS fructu maximo, rotundo, flavo & dulci Tournefortii. Pruna rotunda, flava, dulcia, mali magnitudine C. B. P. c. l. cum præcedentibus. Germ. Epilling, majores vero Maruncken.

PRVNVS fructu minore, auſtero Tournefort. Pruna Auguſto matureſcentia, minora & auſteriora C. B. P. 443. In hortis paſſim.

PRVNVS fructu parvo, præcoci Tournefort. Inſtitut. p. 623. Pruna parva, præcocia C. B. Pruna avenaria Tabern. icon. 991. cum præcedentibus. Germ. Haber-Pflaumen.

PRVNVS myrobalanus dicta Cluſio. Myrobalanen-Pflaumen. In hortis Curioſorum floret cum vulgari.

PRVNVS Brigniolenſis in officinis proſtat, & vulgo dicuntur ipſius fructus Pruneola.

PRVNVS ſylveſtris C. B. P. 444. J. B. 1. 293. Lobel. icon. 176. In ſepibus & dumetis paſſim flores Aprili.

Aprili. Germani Schwartz-Dorn und Schlehen-Hecken appellant.

PRVNVS ſylveſtris, præcox, altior H. R. Pariſ. Pruna ſylveſtria, præcocia C. B. Pruni ſylveſtris, altera ſpecies Tragi 1017. Rami hujus pruni ſæpe monſtroſe degenerant in quasdam perplexas & intricatas virgultorum congeſtiones, quæ procul inſpicienti nidum picæ mentiuntur. Bey Cluſewitz häuffig, floret cum præcedente.

ARMENIACA fructu majore, nucleo amaro Tournefort. Inſtitut. p. 623. Mala armeniaca majora C. B. P. 442. In hortis variis, ubi Apricoſen dicuntur, floret Aprili & Majo.

PERSICA molli carne, & vulgaris, viridis & alba C. B. P. 440. Malus perſica J. B. 1. 157. Dodon. Pempt. 796. In hortis variis, ubi & aliæ ſpecies occurrunt. Pferſich. Flore pleno aliquando occurrit, non ſecus ac ceraſus v. gr. im Fürſten-Garten.

PERSICA africana, nana, flore incarnato ſimplici Tournefort. Malus perſica, africana, nana, flore incarnato, ſimplici H. L. Bat. im Fürſten-Garten, floret Aprili.

AMYGDALVS ſativa, fructu majore C. B. P. 441. Amygdalus dulcis J. B. 1. 174. Amygdalus Tabern. icon. 996. Im Fürſten-Garten, floret Aprili & Majo. Mandel-Baum.

CERASVS ſativa, fructu rotundo, rubro & acido Tournefort. Inſtitut. p. 615. Ceraſa ſativa, rotunda, rubra & acida C. B. P. 449. Ceraſia acida Tabern. icon. 985. In pomariis & vineis floret Majo. Germ. ſaure Kirſchen.

CERASVS ſativa, fructu majore Tournef. l. c. Ceraſa ſativa majora C. B. c. l. Ceraſa acida rubella J. B. 1. 121. cum præcedente. Germ. Weichſel-Kirſchen.

CERASVS fructu acido, ſerotino, ſanguinei ſucci Tournef. Ceraſa acidiſſima, ſanguineo ſucco C. B. P. 450. Ceraſa acida, nigrantia, ſolidiora, tardius matureſcentia J. B. Ceraſorum primus genus Tragi 1027. cum præcedentibus. Germ. Amarellen.

CERASVS fructu albo, duci. Ceraſa alba, dulcia C. B. P. Ceraſia dulcia Tragi. 1028. cum præcedentibus.

CERA-

CERARVS major & ſylveſtris, fructu ſubdulci, nigro colore inficiente C. B. Ceraſus ſylveſtris, fructu nigro J.B. In ſylvis & circa pagos frequens floret Majo. Schwartze ſüſſe Kirſchen.

CERASVS racemoſa, hortenſis C. B. P. 450. Ceraſus uno pediculo plura ferens, & ceraſus racemoſa J. B. 1.223. Ceraſia uno pediculo plura Tabern. cum præcedentibus.

CERASVS hortenſis pleno flore C. B. P. Ceraſus pleno flore J. B. Ceraſus multiflora I. Tabern. icon. 983. Im Fürſten-Garten, floret Majo.

CERASVS pumila; Chamæceraſus Matthioli & Cluſ. Pannon. & Hiſt. Ceraſus pumila C. B. P. 450. Im Fürſten-Garten, floret cum præcedentibus. Iſt wild bey Freyburg an der Unſtruth.

PADVS germanica, folio deciduo. Ceraſus racemoſa quibusdam, aliis Padus J. B. 1. 228. Ceraſia nigra, racemoſa Tabern. icon. 988. Ceraſus racemoſa, ſylveſtris, fructu non eduli C. B. P. 451. In ſepibus & dumetis, hinter Kahle nach Orlamünde und Rudelſtadt; überall in Wäldern bey Leipzig; auch bey Gießen am Hangelſtein, und am Stopffel-Berg. Lignum & cortex contritus fœtent, unde quibusdam Tölpelgens-Baum dicitur, baccis nigris & rubris variat. Fructus collo appenſus laudatur ad epilepſiam puerorum. vid. Sam. Dale in Suppl. p. 288. Floret Aprili & Majo.

PADVS exotica, folio amplo, craſſo, ſempervirente. Lauroceraſus Tournefort. p. 627. Tab. 403. J. B. 1. 420. Ceraſus folio laurino C. B. P. 450. cum præcedente floret in hortis variorum. Cum & flore & fructu conveniant hæ duæ plantæ, ad diverſa genera male reducuntur a Tournefortio; quem vero lauroceraſi fructum exhibet Cluſius, genuinus non eſt.

SVMACH Arabum & officinarum. Rhus, ſive Sumach J. B. 1. 555. Rhus coriaria Dod. Pempt. 779. Rhus folio ulmi C. B. P. 414. Im Fürſten-Garten, floret Majo. Färber-Baum, Hirſch-Horn-Baum, Schling-Baum.

(2) DIPYRENA.

ZIZIPHVS Dodon. Pempt. 807. Jujubæ majores oblongæ C. B. P. 446. Zizipha ſativa J. B. 1. 40. In hortis quandoque ex officulis in officinis proſtantibus pullulat. Rothe Bruſt-Beeren.

CRATÆGVS folio laciniato Tournef. Inſtit. pag. 633. Meſpilus apii folio, ſylveſtris, non ſpinoſa, ſive Sorbus torminalis C. B. Pin. 454. Sorbus torminalis & Cratægus Theophraſti I. B. 1. 63. In ſylvis paſſim v. g. Im Coſpidaiſchen Holtze floret Majo & Jnnio, baccæ vero maturantur Octobri, circa Vindemiam, quo tempore a ruſticis in foro venduntur. Germ. wilder Sperber-Baum, Arlß-Beeren, Eltz-Beer. vid. Cluſ. in hiſt. pann. pag. 8. qui Atlaß-Beer vocari teſtatur.

CRATÆGVS alpinus alni folio incano. Alni effigie, lanato folio, major C. B. Pin. p. 452. Sorbus Aria cognominata C. Cluſ. Pan. pag. 8. in montibus altiſſimis v. g. auf dem Enſels-Berge bey Gotha, und auf den Thüringer Walde, floret cum præcedente.

(3.) TRIPYRENA.

PALIVRVS Dod. Pempt. 756. Rhamnus folio ſubrotundo, fructu compreſſo C. B. P. 477. Rhamnus, ſive Paliurus, folio jujubino J. B. 1. 35. In horto medico floret Majo & Junio.

OXTACANTHA vulgaris, Meſpilus apii folio laciniato C. B. P. 454. Oxyacantha vulgaris, ſive ſpina alba J. 1. 49. Oxyacantha, ſive ſpina acuta Dodon. Pempt. 751. In ſepibus paſſim floret Majo; Weiß-Dorn item Hage-Dorn, Meel-Dorn, fructum vero Meel-Fäßgen, Meel-Feiſtgen, vulgus vocat, uti prunum ſylveſtrem Schwartz-Dorn.

COTONEASTER J. B. 1. 73. Cotoneaſter folio rotundo non ſerrato C. B. P. 452. In montibus noſtris frequens, v. g. auf dem Cunitzer-Berge, und in denen Kin-Bäumen gegen Ziegenhayn über, auch bey der Diebs-Krippe.

THEA

THEA cum hac ſpectat, decantatiſſimus orientis, Chinæ nempe & Japoniæ frutex, cujus icon & deſcriptio vid. apud Kæmpferum in amœnit exotics p. 605. 606. ſq.

(4) TETRAPYRENA.

VITIS laciniatis foliis Corner. 183. Vitis folio apii J. B. 2. 73. Peterſilgen-Reb-Stock. In hortis & vineis floret Majo & Jun.

VITIS vinifera C. B. P. 299. In vineis paſſim floret cum præcedente.

VITIS apiana C. B. P. p. 298. Uva muſcatellina Carol. Steph. Præd. Ruſt. 34. Muſcateller-Trauben, cum præcedentibus.

VITIS ſubhirſuta C. B. P. 299. cum præcedentibus, ubi & plurimæ aliæ vitis differentiæ paſſim coluntur, & quorum nomina germanica a peritis facile poſſint addiſci, ſi quiſpiam hiſce delectaretur; Præ cæteris vero laudantur, quæ Guth-Edel und Fränckiſch dicuntur; Trameiner dictæ uvæ, habent baccas rubras ſ. carneas.

HEDERA arborea C. B. P. 305. Hedera communis, major J. B. 2. 111. Hedera corymboſa communis Lobel. Icon. 614. A qua nonniſi ætate differt, & foliorum angulis, quos poſtea deponit, hedera minor ſive helix *vulgo* dicta. In horto medico floret Septembri. Epheu, Eppich, Eppch.

AZEDERACH Dodon. Pempt. 848. Arbor fraxini folio, flore cœruleo C. B P. 415. Azaderacheni arbor J. B. 1. 554. In horto medico & aliis floret Junio & Julio. Ab hac arbore minime differt arbor, indica fraxino ſimilis, oleæ fructu C. B. Pin. p. 416. ſive Nimbo Garciæ, uti *recte* obſervavit Kæmpferus in amœnitatibus exoticis; adeoque hanc plantam Caſp. Bauhinus bis poſuit.

MESPILVS germanica, folio laurino, non ſerrato, ſive Meſpilus ſylveſtris C. B. P. 453. Meſpilus vulgaris J. B. 1. 69. Miſpeln. In hortis & pomariis variis in locis, floret Maj.

MESPILVS alpina folia alni lanato major. Alni folio lanato major C. B. P. Aria Theophraſti vulgo. Metallo, Italis,

Italis, propter ligni duritiem Fructu hujus multi, loco jujubarum utuntur. Provenit copiosa auf dem Enselsberg bey Gotha, auf dem Hartz bey Ilefeld, und auf dem Feld-Berg an der Höhe bey Franckfurth.

(5) POLYPYRENA.

ROSA rubra simplex C. B. P. 481. Rosa rubra flore simplici J. B. 2. 34. Rosa damascena Lobelii Icon. 206. In hortis variis floret Maj. & Jun. Rose.

ROSA saturatius rubens C. B. P. Rosa purpurea, sive in rubro nigricans Camerarii Hort. Germ. Essig-Rosen, quia præ cæteris rosæ speciebus ad acetum rosarum parandum expetitur. In hortis variis cum præcedente.

ROSA purpurea C. B. P. Rosa provincialis major Tabern. icon. 1484. Rosa rubello flore, majore, multiplicato, sive pleno, incarnata vulgo J. B. 2. 36. cum præcedentibus. 1464.

ROSA versicolor C. B. P. Rosa semiplena flore variegato Volk. Rosa prænestina, alba & versicolor J. B. 2. 38. Rosa versicolor Clusii. Cum præcedentibus.

ROSA maxima, multiplex C. B. Rosa Hollandica, rubella, plena, quibusdam centifolia, spinoso frutice J. B. 2. 37. Rosa centifolia Batavica Clusii Histor. 113. Centifolien. In hortis frequens floret cum præcedentibus. Hæc rosa maxime expetitur ad conservam rosarum, Germanis Rosen-Zucker dictam, parandam. De rosa damascena & omnium calendarum, nec non moschata vid. J. Bauhinus & Hesse vom Garten-Bau.

ROSA alba, vulgaris, major C. B. P. 482. Rosa candida, plena & semiplena J. B. 2. 44. cum præcedentibus.

ROSA minor, rubello flore, quæ vulgo a Mense Majo majalis dicitur C. B. P. 483. Rosa rubello flore, parvo, simplici, non spinosa J. B. 2. 39. Rosa provincialis minor Tabern. icon. 1485. In hortis & sepibus floret omnium prima. 1485.

ROSA sylvestris variorum colorum, foliis glabris & hirsutis, odoris & inodoris; In sepibus passim floret Junio. Heck-Rosen, wilde Rosen, Feld-Rosen.

Rosa

Roſæ hujus ſylveſtris fructici ſæpe adnaſcitur tuberculum quoddam villoſum & cirroſum, quod Germanis dicitur Schlaaf-Kuntz vel Schläffe, & officinis ſub nomine Bedeguar innotuit; hoc intus continet vermiculos, qui abeunt in inſecta alata.

ROSA campeſtris ſpinoſiſſima, flore albo, odoro C. *B.* P. 384. Roſa pumila, ſpinoſiſſima, foliis pimpinellæ glabris, flore albo J. *B.* 2. 40. In ſepibus bey Rode floret cum præcedentibus. Hæc poma fert rotunda, nigricantia quæ aliqui contra nephritidem laudant.

ROSA ſylveſtris, pomifera, major C. *B.* P. 384. Roſa pomo ſpinoſo, folio hirſuto J. *B.* 2. 38. In hortis cum præcedentibus.

ROSA lutea, ſimplex C. *B.* Roſa lutea J. *B.* 2. 47. In ſepibus & hortis bey Zwetzen cum prioribus.

ROSA lutea, multiplex C. *B.* P. 483. Roſa lutea, flore pleno J. *B.* 2. 48. Roſa flava, plena Cluſ. Hiſt. 114. In horto medico.

ROSA punicea Cornuti 11. Roſa ſylveſtris, Auſtriaca, flore phœniceo Parkinſon. Theatr. 1019. Sorbus legitima Cluſ. Pan. pag. 9. Flos hujus eſt ſimplex, exterius flammeus, interius phœniceus. In hortis Sereniſſ. Principis, ubi roſam turcicam vocant, floret cum præcedentibus.

SORBVS ſativa C. *B.* P. 415. Sorbus J. *B.* 1. 59. In hortis prope Naumburgum & alibi, unde quotannis ejus fructus venales afferuntur. Germ. Dreck-Säck, Spierling, Sperber-Baum.

AVCVPARIA Rivini. Sorbus aucuparia J. *B.* 1. 62. Sorbus ſylveſtris, foliis domaſticæ ſimilibus C. *B.* P. 115. Sorbus ſylveſtris, alpina Lobel. icon. 107. Germ. Quitſch-Beeren. In ſylvis, areis & compitis variis in locis floret Majo & Jun.

CYDONIA fructu breviore & rotundiore Tournefort. Colonea Matthiol. Malus cydonia, fructu breviore & rotundiore H. R. Par. Mala cotonea minora C. B. P. 434. Cydonia minora Raji Hiſt. 1453. In hortis variis floret Majo & Jun. Quitten-Baum. Hujus trunco varia po-

morum

morum & pyrorum genera inſeruntur, quæ nana permanent, & proinde Germanis Zwerg-Bäume dicuntur, quarum plures conſpiciuntur im Fürſten-Garten.

PTRVS ſylveſtris C. B. P. 439. Pyra ſylveſtria Tabern. icon. 1018. In ſepibus, dumetis & ſylvis. Variæ admodum pyri ſylveſtris ſpecies occurrunt, quæ pro diverſitate ſativarum, ex quarum ſeminibus projectis oriri videntur, variant florentque Majo. Quo tempore pariter pyrus ſativa infinite varia in hortis floret, cujus ſpecies, & varietates qui noſſe cupit, adeat Joh. Bauhinum de Thermis Bollenſibus, Cordum, Tournefortium & ipſos hortulanos; hæc enim ad nos non ſpectant, nec verbis facile exprimi poſſunt. Præ cæteris pyris laudantur pyra illa, quæ Gallis bons Chretiens, Germanis autem Zucker-Birn dicuntur.

MALVS ſylveſtris, fructu valde acerbo Tournefortii; In ſepibus & ſylvis, floret Majo, ut &

MALA ſylveſtria, rubra C. B. P. 432. ſive Mala ſylveſtria, rubentia Tabernæm. icon. 100. Mala vero hortenſia, non ſecus ac pyra tot paſſim occurrunt a ſe invicem diverſa, ut harum pagellarum anguſtia ea non capiat. Holtz-Aepffel-Baum. Præ cæteris æſtimantur poma Borsdorffiana dicta, quorum ſuccus etiam expetitur ad tincturam Martis cum ſucco pomorum parandam; Magnitudine variant, nec non pelliculæ exterioris colore, qui communiter albus eſt, rubro pulchre miſtus, jam vero etiam pelliculi plane nigra in horto Sereniſſ. Principis coluntur.

AVRANTIVM acri medulla, vulgare Ferrar. Heſperid. 377. Malus aurantia major C. B. P. 436. Aurantia malus J. B. 1. 97. Pomerantzen corrupte a pomarantiis; vel cum Gallis Oranges, unde loca harum arborum, ut & citrorum, limonumque culturæ dicta non ſecus ac ipſarum arborum turbam vulgo Orangeries vocant. Qui alias ſpecies noſſe cupit, adeat Ferrarium, & Volckammeri Heſperides.

CITREVM vulgare Tournefort. Inſtit. p. 620. Malum citreum vulgare Ferrar. Heſp. 61. Malus medica C. B. P 435. cum præcedente floret & fructum perficit toto anno

Citronen-Baum. In officinis reperitur quidam craſſus & carnoſus fructus, ſacharo vel melle ſiliquarum conditus, quem Citronat vocant, & aliqui citri majoris, alia.

LIMON vulgaris Ferrar Heſper. 193. Malus limonia, acida C. B. P. 436. Limonia malus J. B. 1. 96. cum præcedentibus. Limonien, Limonen.

MYRTVS Bæotica latifolia C. B. In hortis flore æſtate. Myrten-Baum.

MYRTVS minor vulgaris C. B. Pin. pag. 469.

MYRTVS tarentina flore pleno. In hortis cum tarentina myrto flore ſimplici, aliisque myrti ſpeciebus, (inter quas & criſtata dicta ſ. caule lato & faſciato conſpicua eſt) occurrit, floretque Jul. & Aug.

MYRTVS foliis minimis & mucronatis C. B. P. 469. In hortis paſſim cultæ florent æſtate. Myrti flos inſidet embryoni, qui deinde abit in baccam olivæformem, umbilicatam, in tria loculamenta diviſam, ſeminibusque fætam reniformibus.

CACVBALVS Tournefort. Inſtitut. p. 339. Tab. 176. Cacubalus Plinii Lugd. 1429. Alſine ſcandens baccifera C. B. P. 250. Cacubalum quibusdam, vel alſine baccifera J. B. 2. 175. In ſepibus & dumetis, wo man nach dem Lerchen-Felde gehet, item an der Saal bey Wenigen-Jena über, auch auf der Inſul an denen Hecken, floret Majo & Jun.

RVBVS vulgaris, ſive rubus fructu nigro C. B. P. 479. Rubus major, fructu nigro J. B. 2. 57. modo triphyllus, modo pentaphyllus eſt, & ſarmentis ſuis longe lateque ſepes & dumeta ſuperſcandit, iisque incumbit, aliquando etiam extremitatibus ſuis iterum ſe terræ infigit, & radices agit; reperitur etiam fl. pleno. Floret Majo & Jun. Brom-beer-Strauch, Kratz-Beer.

RVBVS idæus ſpinoſus C. B. P. 479. Rubus idæus ſpinoſus, fructu rubro J. B. 2. 59. Rubus idæus Dodon. Pempt. 743. Hind-Beeren, Hohl-Beeren, in montoſis ſylvis, gegen dem Fürſten-Brunnen über, und wo man nach Tautenburg gehet, floret Majo, cum belladonna & ſambuco montana, racemoſa.

RVBVS

RVBVS idæus, non ſpinoſus J. B. Rubus idæus lævis C. B. Pin. cum præcedente bey Laaßdorff.

RVBVS idæus, ſpinoſus, fructu albo J. B. 2.59. Weiſſe Hind- oder Him-Beeren; im Fürſten-Garten

RVBVS alpinus humilis J. B. 2. 61. Chamærubus ſaxatilis C. B. P. 479. Rubus ſaxatilis alpinus Cluſii Hiſt. 118. In variis locis, v. g. wo man nach Veltersrode gehet, und in denen Bergen hinter Cunitz, floret Majo.

RVBVS odoratus Corn. 150. In hortis variis floret Majo & Junio; Florem habet amplum & ſpecioſum, folia anguloſa inſtar foliorum ribes.

RVBVS alpinus, foliis ribes. Chamærubus foliis ribes anglica C. B. P. 480. Chamærubus Cluſ. Pan. & Hiſt. in altioribus Haſſiæ ſylvis, v. gr. auf dem Weißner, und auf dem Dücienrück zwiſchen Rotenburg und Caſſel, floret Jun.

RVBVS repens, fructu cæſio C. B. P. 479. Rubus minor, fructu cœruleo J. B. 2. 59. Rubus minor Dodon. Pempt. 742. In agrorum limitibus & ad ſepes paſſim floret Maj. & Jun.

PHTTOLACCA Americana, majore fructu Tournefortii. Solanum racemoſum, indicum H. R. Pariſ. Solanum magnum, virginianum, rubrum Parkinſ. Theatr. 347. Vulgo Amaranthus baccifer. Kæmpffero in amœnitatum exoticarum faſciculo V. pag. 828. dicitur Sjooriku, ubi ejusdem plantæ exſtat figura. In horto medico floret Julio & Auguſto.

CLASSIS VI.

DE PLANTIS FLORE REGVLARI HEXAPETALO GAVDENTIBVS.

I. Seminibus tectis capſula.

(1) SIMPLICI.

CYPERELLA capitulis pſyllii. Cyperella Cordi; Grâ-

men hirſutum capitulis pſyllii C. *B.* P. 7. Juncus villoſus, capitulis pſyllii Tournef. Inſt. p. 246. Gramen cyperinum piloſum Tabern. icon. 219. Gramen exile hirſutum, cyperoides Lobelii J. *B.* 2. 493. In apricis, gramine tenui veſtitis hinc inde im Rauhenthale, & copioſius bey Rode, und auf denen Hügeln bey der neuen Schencke, floret Aprili.

CYPERELLA nemorenſis, capitulis in ſingulis petiolis ſingulis latifolia. Gramen ſylvaticum piloſum Tabern. icon. 227. Juncus nemoroſus, latifolius, major Tournefort. Inſtit. 246. Gramen hirſutum, latifolium, majus C. *B.* P. 7. In ſylvis & nemoribus frequens, v. g. im Rauhenthale, floret Martio & Aprili.

CYPERELLA altiſſima, montana. Gramen hirſutum, anguſtifolium, majus C. *B.* Prodr. p. 16. auf der Wellmeſe, floret Majo.

CYPERELLA latifolia, juncea panicula. C. *B.* Prodr. 15. vocat Gramen hirſutum, latifolium, minus, juncea panicula; cum præcedentibus.

CYPERELLA ſerotina, floſculis albicantibus. Juncus anguſtifolius, villoſus, floribus albis, paniculatis Tournefort. p. 247. Gramen hirſutum, anguſtifolium, minus, paniculis albis C. *B.* Gramen leucanthemum Dalechamp. Lugd. 426. In ſylvis cum præcedentibus floret Majo.

CYPERELLA ſylvatica & ſaxatilis, paniculâ ramoſa, capitulis ranunculi. An denen Felſen gegen Häynbüchen über, auch in denen Holtz-Schlägen bey Voltersrode. Floret Majo.

JVNCVS acutus, panicula ſparſa C. *B.* P. 11. Juncus foliaceus J. *B.* 2. 521. Juncus acutus Dodon. Pempt. 605. In locis humidis & ſylvoſis, v. g. auf der Wellmeſe, und bey dem Iſerſtädtiſchen Höltzgen, floret Julio. Binſe.

JVNCVS lævis, panicula ſparſa, major C. *B.* P. 12. Juncus panicula arundinacea J. *B.* 2. 520. Juncus lævis Dodon. Pempt. 605. Tabernæm. icon. 249. In locis uliginoſis & juncoſis ad vias & ſcrobes paſſim floret Junio & Julio.

JVNCVS lævis panicula non ſparſa C. *B.* P. 12. Jun-

cus

cus Matthioli J. *B.* 2. 520. Juncus lævis glomerato flore Lobel. icon. 84. Cum præcedente paſſim ad ſcrobes & vias publicas floret Iun. & Iul.

JVNCVS paluſtris, humilior, paniculâ laxiſſima. Juncus paluſtris humilior, erectus & repens Tournefort. Gramen nemoroſum, caliculis paleaceis, repens & erectum C. *B.* P. 7. Holoſteum Matthioli junceum J. *B.* 2. 510. In pratis juxta ſemitas & ad ripam Salæ frequens floret Junio & Iulio.

JVNCVS pratenſis humillimus, capitulis fuſcis. Cum præcedente.

JVNCVS foliis articuloſis, floribus umbellatis Tournefort. p. 247. Gramen junceum, folio articulato, aquaticum C. *B.* P. 5. Prodr. 12. Gramen aquaticum Tabernæm. icon. 214. In pratis ſubudis, juxta ſemitas v. g. im groſſen Paradieß, wo man nach Wöllnitz gehet, floret Iun. & Iul. Hujus monſtroſa ſoboles eſt

JVNCVS foliis articuloſis, floribus umbellatim & paniculatim diſpoſitis Tournefort. Inſtit. p. 247. ut &

JVNCVS foliis articuloſis, floribus umbellatis, cum utriculis Tournefort. Inſtit. 247. Gramen junceum, folio articulato, cum utriculis C. *B.* Prodr. 12. Juncus foliaceus, capſulis triangulis J. *B.* 2. 521.

JVNCVS nemoroſus, folio articuloſo Tournefort. Inſtit. pag. 247. Gramen junceum, folio articuloſo, ſylvaticum C. *B.* Pin. 5. Gramen junceum ſylvaticum Tabern. icon. 223. In paludoſis pratis & piſcinis bey Jena, Prieſeznitz und Schleben, floret Iun. & Iul.

JVNCVS parvus, cum pericarpiis rotundis J. *B.* 2. 522. Chabr. pag. 197. ubi figuræ ſunt transpoſitæ, & holoſtei Matthioli figura hujus noſtri deſcriptioni appoſita loco citato pag. vero 191 hujus noſtri junci cum pericarpiis rotundis, figura holoſtei Matthioli, ſive Junci bufonini deſcriptioni adjecta. In pratis riguis, nec non paſcuis frequens; Floret cum præcedentibus; Hunc male Tournefort. cum ſequente confundit.

JVNCVS alpinus, foliis rigidis, ſeſſilibus, caule nudo, floribus ſpicatis. Gramen junceum III. Tabern. icon. 214.

Gramen junceum foliis & ſpica junci C. B. P. 5. Gramen junceum maritimum Lobel. icon. Juncus Cambro-Britannicus Parkinſonii & Raji Hiſtor. In ericetis hinter Rutstersdorff nach Schleſreiſen zu, floret Iul. & Aug.

JVNCVS foliatus, minimus I. B. 2. 523. Chabr. Sciagraph. p. 197. In agris arenoſis cum anagalloide & thlaſpidio minimo, zwiſchen der neuen Schencke und Zöllnitz, item bey Hayn-Büchen und Städtgen Rode. Floret Iulio & Auguſto.

(2) CAPSVLA BIPARTITA.

SALICARIA vulgaris, purpurea, foliis oblongis Tournefort. p. 253. Tab. 129. Lyſimachia ſpicata, purpurea forte Plinii C. B. P. 246. Lyſimachia purpurea, quibusdam ſpicata I. B. 2. 902. In udis & ſalicetis ad ſcrobes v. g. wo man nach Cunitz gehet, item bey der Raſe-Mühlen und im groſſen Paradieß, floret Iulio. Germ. brauner Weiderich.

SALICARIA trifolia, caule hexagono Tournefort. l. c. cum præcedente, cujus eſt varietas.

SALICARIA hyſſopi folio latiore Tournef. Hyſſopifolia major, latioribus foliis C. B. P. Hyſſopifolia aquatica I. B. juxta vias publicas zwiſchen Weiſſenfelß und Marck-Rannſtädt ad ſcrobes floret Iul. & Auguſto.

(3) CAPSVLA TRIPARTITA.

LILIVM album vulgare I. B. 2. 685. Lilium album, flore erecto, & vulgare C. B. P. 76. In hortis paſſim. Iunio. Weiſſe Lilie.

LILIVM purpuro-croceum, majus C B. P. 76. Lilium rubens vel croceum, majus I. B. 2. 688. Lilium purpureum majus Dodon. Pempt. 198. Lilium aureum majus Tabernæm. icon. 639. Germ. Feuer-Lilien. Cum præcedente.

MARTAGON ſylvaticum. Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente C. B. P. 77. Lilium flore nutante ferrugineo, majus & minus I. B. 692. Wilde Lilie, Türckiſcher Bund, Gold-Wurtz. In ſylvis præcipue montoſis

toſis v. g. auf der Wellmeſe und im Rauheuthal, floret Majo & Junio; Floribus aliquando elegantiſſime ex albo punctatis variat, nec non copia florum admodum, ſpecioſa, quæ Tournefort. Inſtit. p. 370. Lilium floribus reflexis, montanum, flore maculis rubeis inordinatis aſperſo, & lilium montanum, floribus reflexis, longiore ſpica appellat, ad triginta flores numeravimus aliquando auf dem Fuchs-Berg; Noſtrum eſt hirſutum, quapropter ab hoc minime differre cenſeo. Lilium floribus reflexis, alterum, lanugine ſum, hirſutum C. B. P. 78. Lilium montanum, ſive ſylveſtre I. majus Cluſii Hiſtor. 134. Cultura enim lanuginem exuit & deponit; Radix hujus plantæ flava eſt, unde vulgo Gold-Wurtz appellant, & loco radicis aſphodeli utuntur in officinis. Pueris appendit vulgus contra dentitionem difficilem.

MARTAGON orientale, flore miniato. Lilium Byzantinum, miniatum C. B. P. 78. Lilium flore miniato, nutante, ſive hemerocallis chalcedonica aliquibus I. B. 2. 695. In hortis floret cum præcedentibus.

CORONA imperialis Dod. Pempt. 202. Lilium, ſive Corona imperialis, ſive Tuſai aliis I. B. 2. 697. Käyſers-Krone. In hortis variis floret Majo.

CORONA imperialis, folio vario. Tournefortii. Käyſers-Krone mit vergüldeten und verſilberten Blättern, cum præcedente.

CORONA imperialis flore pulchre luteo Tournef. Inſtit. p. 372. Lilium ſive Corona imperialis per omnia major H. Reg. Pariſ. cum præcedente.

TULIPA præcox, lutea, C. B. P. 57. Tulipa præcox, flava Cluſii Hiſtor. 138. I. B. 2. 666. In hortis frequens cum aliis variis & fere infinitis tuliparum præcocium pariter atque ſerotinarum ſpeciebus. Hujus flos odoratus eſt. De variis aliis tulipæ ſpeciebus. vid. Cluſius. Si flos fuerit major, & petala diſſecta, tunc monſtrum vocatur. Occurrit etiam flore pleno, quæ Tulipa pœoniæ quibusdam dicitur, quia ipſius flos pœoniæ florem fere refert. Floret Majo.

FRITILLARIA præcox, purpurea, variegata C. B. P. 64.

Meleagris, ſive fritillaria ſaturatior & dilutior I. B. 2. 681. Meleagris Dodon. Pempt. 233. In horto Seren. Principis floret Aprili & Majo.

DENS CANIS, latiore rotundioreque folio, flore ex purpuro rubente C. B. P. 87. Satyrium, quorundam Erythronium, bifolium, flore unico, radiato, purpureo I. B. 2. 680. Dens caninus purpuraſcente flore Cluſii Hiſtor. 266. In hortis curioſorum floret Aprili.

ORNITHOGALVM medium, umbellatum, anguſtifolium C. B. P. 70. Ornithogalum vulgare & verius, majus & minus I. B. 2. 630. Bulbus leucanthemus minor, ſive ornithogalum Dod. Pempt. 221. In hortis frequens floret Majo. Naſcitur copioſum in pratis prope Dresdam, uti etiam obſervavit Camerrrius in Matthiolum; variæ ornithogali figuræ vid. in Epit. Matthioli apud Camerar. Etern aus Bethlehem, Acker-Zwiebeln.

ORNITHOGALVM anguſtifolium, majus floribus ex albo vireſcentibus C. B. P. Aſphodelus bulboſus Dodonæi, ſive ornithogalum ſpicatum, flore virente I. B. 2. 627. Ornithogalum majus I. Cluſ. Hiſtor. 186. Im Fürſten-Garten cum præcedente.

ORNITHOGALVM luteum C. B. P. 71. & Tabernæm. icon. 633. Bulbus ſylveſtris Fuchſii, flore luteo, ſive ornithogalum luteum I. B. 2. 623. Bulbus ſylveſtris Dodon. Pempt. 622. In ſylvis & dumetis ſed rarius; iſt ſehr häufig auf dem Hartz bey Hefeld. Floret Martio & Aprili.

ORNITHOGALVM luteum minus C. B. P. 71. I. B. 2. 624. Ornithogalum Pannonicum luteo flore Cluſii Hiſtor. 185. in agris & vineis, frequens, v. g. auf dem Hauß-Berge floret Aprili, hujus varietas eſt.

ORNITHOGALVM anguſtifolium, bulbiferum C. B. ornithogalum anguſtifolium, campeſtre, luteum, minimum, bulbiferum Column. ecphraſ. p. 1. 323. quod rarius occurrit.

ORNITHOGALVM luſitanicum, latifolium, flore cæruleo Tournefort. Inſtitut. p. 381. Hyacynthus indicus, bulboſus, ſtellatus C. B. P. 47. Hyacynthus Peruvianus J. B. 2. 585. Hyacynthus ſtellatus, peruanus Cluſ. Hiſt.

182.

182. Im Fürſten-Garten, floret Majo & Jun.

ORNITHOGALVM luſitanicum, latifolium, flore albo Tournefort. Inſtit. 181. In horto medico floret cum præcedente.

ORNITHOGALVM flore cœruleo, ſpecioſo. Hyacynthi pulchra ſpecies J. B. vulgo Hyacynthus ſtellaris. In hortis variis floret Majo.

Ornithogali ſpeciebus merito annumeravit D. Tournefortius, SCILLAM off. quæ ſæpius in hortis Curioſorum occurrit, & facile germinat, ſi radices non fuerint nimis vetuſtæ. Germ. Meer-Zwiebel.

LEVCOJVM ſylvaticum. Narciſſo-leucojum vulgare Tournefort. Leucojum bulboſum, hexaphyllum cum unico flore, rarius bino J. B. 2. 590. Leucojum bulboſum præcox majus, ſeu I. Cluſ. Pan. pag. 179. & ſeqv. Narciſſus VII. Matth. Auf dem Cunitzer-Berge und im Cloſewitziſchen Holtze, floret Febr. & Martio. Germ. Mertz-Blumen, weiſſe Hornungs-Blumen, Schnee-Glöckgen.

LEVCOJVM hortenſe minus. Narciſſo-leucojum, trifolium minus Tournef. Inſtit. p. 387. Leucojum bulboſum, trifolium minus C. B. P. 56. Narciſſus VI. Matthioli, Leucojum bulboſum præcox minus Cluſ. Pan. p. 181. ſeq. In hortis floret Februario & Martio; Non recte dicitur triphyllon, cum ſit hexapetalus ejusdem flos, petaſis tribus majoribus, totidemque minoribus conflatus alternatim poſitis; flos fructui inſidet, nudus plane, adeoque dici non poteſt cum Tournefortio, quod calix abeat in fructum, ſiquidem calice deſtituatur, & embryo non abeat in aliud, quam quod antea fuit & ſaltim magis increſcat; de reliquis audis floribus embryoni inſidentibus, idem eſto judicium. Schnee-Tropffen.

LEVCOJVM ſerotinum, multiflorum. Narciſſo-leucojum pratenſe, multiflorum Tournefort. Inſtitut. p. 387. Leucojum bulboſum majus, ſive multiflorum, quod aliqui acrocorion Plinii ſtatuunt C. B. Leucojum bulboſum, polyanthemum, tardius florens, floribus minoribus, J. B. 2. 592. Leucojum bulboſum ſerotinum majus Cluſ. Pan. pag. 183. & ſeq. In horto medico floret Majo.

MOLT latifolium, flore albo. Allium latifolium, liliflorum Tournefort. p. 384. Moly latifolium, liliflorum C. B. P. 75. In horto Sereniſſimi Principis & medico floret Majo.

MOLT pyrenaicum, flore luteo. Allium latifolium, luteum Tournefort. Moly latifolium, luteum, odore allii, ſecundum C. B. P. 75. Moly latifolium flore flavo Eyſtett. In horto medicó floret Majo.

MOLT montanum, foliis narciſſi. Allium montanum foliis narciſſi, majus. Allium umbelliferum pratenſe J. B. 2. 564. In ſylvis montoſis, v. g. auf der Wellneſe, auf dem Hauß- und Cunitzer-Berge, floret tota æſtate.

MOLT ſylvaticum latifolium. Allium ſylveſtre, latifolium C. B. P. Allium urſinum bifolium, vernum, ſylvaticum J. B. 2. 565. Allium urſinum Matthioli. Auf dem Tautenburgiſchen Forſt und bey der neuen Günne, wird auch in dem Cloſewitziſchen Höltzgen gefunden. Germanis inferioribus Ramſel dicitur, iſt ſehr häuffig im Roſenthal bey Leipzig. Floret Majo.

MOLT alpinum, latifolium, caule maculato. Allium montanum, latifolium, maculatum C. B. P. 74. Allium alpinum J. B. 2. 566. Victorialis longa Cluſii Hiſt. 189. & officinarum. Ex Sileſia transmiſſa in hortum medicum, floruit Jun. Germ. Allermanns Harniſch.

ALLIVM ſativum C. B. P. 73. Allium vulgare & ſativum J. B. 2. 554. In hortis & agris ſatum, radicibusque, quas loco ſeminum in ſummitatibus gignit propagatum frequens. Floret Jun. & Jul. Knoblauch.

ALLIVM ſativum alterum, ſive allio-praſum, caulis ſummo circumvoluto C. B. P. 73. Scorodopraſum II. Cluſii Hiſtor. 191. Allii genus, ophioſcorodon dictum quibusdam J. B. 2. 559. In horto medico & alibi floret Junio. Schlangen-Knoblauch.

ALLIVM ſylveſtre, campeſtre, purpuraſcens C. B. P. 74. Porrum ſylveſtre, latifolium Taberæm. icon. 486. In pomariis v. g. im Fürſten-Garten unter den Bäumen, floret Junio.

ALLIVM ſylveſtre, bulbiferum, anguſtifolium. Allium ſylveſtre,

ſylveſtre, bicorne, flore obſoleto C. B. In vineis & agris frequens floret Junio. Hoc flores habet nucleis, ſive bulbulis intermiſtos, unde quidam proliferum denominarunt.

ALLIVM ſylveſtre, capitatum, purpuraſcens, minus C. B. P. 74. Cum præcedente v. g. nach Rothenſtein zu.

PORRVM radice granulata, ſive grumoſa. In vineis zwiſchen Jena und Ziegenhayn, floret Iun. & Iul.

PORRVM ſectivum, juncifolium C. B. P. 72. Porrum ſectile Matthioli. Cepa ſectilis, juncifolia, perennis Moriſon. H. O. P. 2. 383. Schnittlauch; In hortis floret Junio.

CEPA bicornis, tenuifolia, flore obſoleto Tournefort. Inſtit. 383. Allium bicorne, proliferum, flore intus albeſcente, cum ſtria purpuraſcente externe I. B. 2. 560. Allium ſylveſtre, bicorne, flore obſoleto C. B. P. 74. In vineis floret Junio.

CEPA vulgaris, floribus & tunicis purpuraſcentibus C. B. P. 71. Cepe, ſeu cepa rubra, rotunda I. B. 2. 547. In hortis & agris paſſim floret Jun. Zwiebel.

CEPA vulgaris, floribus & tunicis candidis C. B. c. l. Cepe, ſive cepa alba, rotunda I. B. 2. 547. Weiſſe Zippeln, weiſſe Zwiebeln: cum præcedente, ſed rarior hæc occurrit.

CEPA oblonga Dodon. Pempt. 687. Cepe, ſive Cepa oblonga I. B. 2. 547. cum præcedente. Germani Winter-Zwiebeln appellant.

CEPA ſectilis Camerar. in Matthiolum p. 170. Cepa ſiſſilis Matthioli. Germ. Schnitt-Zwiebeln cum præcedentibus.

CEPA aſcalonica Matthioli 556. Galli a voce aſcalonica corrupte Echalottes vocant, Germani vero magis corrupte Schalotten oder Eſch-Lauch, Eſch-Läuchel. In hortis floret raro vel nunquam, radice enim propagatur.

VERATRVM flore ferrugineo. Veratrum flore atro-rubente Tournefort. Inſtit. 273. Helleborus albus, flore atro-rubente C. B. 186. Helleborum album, flore nigro I. B. 3. 634. Helleborum album, floribus atro-rubentibus,

bus, præcox Lobelii icon. 311. Weiſſe Nieß-Wurtz a colore radicis. In hortis floret Jul. & Aug. iſt wild auf den Fichtelberge.

TVCCA fruteſcens, foliis mucronatis. Tucca foliis aſoes C. B. P. 91. Tucca nova, glorioſe elata, & opinata Lobel. Adverſar. In hortis floret Iulio & Auguſto. Ab hac planta probe diſtinguenda eſt Manihot, ex cujus radice Americani panem conficiunt, & cujus character & ſpecies vid. apud Tournef. pag. 655.

ASPHODELVS luteus, & flore & radice C. B. P. 28. Im Fürſten-Garten, floret Majo.

PHALANGIVM flore majore, ſive minus ramoſum. Phalangium aliud pulchrius, emaculato lilii candore conſpicuum Chabr. ſciagraph. p. 222. In Wäldern bey Altenbergen, und an denen jähen Felſen neben der Land-Straß bey Rothenſtein an dem hohen Ufer der Saale. Floret Junio.

PHALANGIVM parvo flore, ramoſum C. B. P. 29. Phalangium quibusdam, parvo flore, ramoſus I. B. 2. 635. Phalangium ramoſum Dodon. Pempt. 106. In montibus auf dem Hauß- und Cunitzer-Berge, floret Majo & Junio. Germanis dicitur weiſſer Wiederthon, teſte Camerar. in Epit. Matthiol 195.

PHALANGIVM narbonenſe, foliis fiſtuloſis. Aſphodelus foliis fiſtuloſis C. B. P. 29. Aſphodelus minor, flore fiſtuloſo I. B. 2. 631. Semina habet quaſi perforata. Im Fürſten-Garten, floret Iunio. Huc ſpectat PHALANGIVM alpinum paluſtre, iridis folio Tournefort. pſeudo-aſphodelus alpinus C. B. Pin. 29. qui parum differt a pſeudo-aſphodelo paluſtri, anglico ejusdem Bauhini; qui quidem hic non provenit, addere tamen volui, & monere, hunc eſſe gramen offifragum Norvegicum, de quo multa dixit Simon Pauli in Botanico quadripartito. vid. Petri Killingii flora Danica, & Joh. Raji hiſtoria plantarum univerſalis.

(4) CAPSVLA MVLTIPLICI.

BVTOMVS flore roſeo Tournefort. Inſtit. p. 271. Tab. 143. Butomus Cæſalpini 553. Juncus floridus, major C. B. P.

B. P. 12. Juncus floridus I. B. 2. 524. Gladiolus æquatilis Dodon. Pempt. 601. Ad ſtagna, fluvios & piſcinas bey Laucha an der Unſtruth, an den Obendorffiſchen Wieſen. Floret Julio & Auguſto.

II. Seminibus tectis.

(1) BACCA.

BERBERIS officinarum. Berberis dumetorum C. B. P. 454. Berberis vulgo, quæ & oxyacantha putata I. B. 1. 52. Spina acida, ſive Oxyacantha Dodon. Pempt. 750. Hic enim frutex procul dubio eſt oxyacantha Græcorum omnium. In ſepibus & dumetis floret Majo & Junio. Sauer-Dorn, Saurach, Erbſel-Beeren.

RVSCVS officinarum. Ruſcus myrtifolius, aculeatus Tournefort. Inſtit. 79. Ruſcus I. B. 1. 579. Oxymyrſine Græcorum. In horto medico & S. Principis floret Aprili & Majo; flores vero his noſtris in oris raro perficit, qui ſunt nudi, hexapetali, regulares, in quorum centro tubus quidam reperitur, qui tamen pro flore monopetalo minime eſt accipiendus; alias & flos Azadarach eſſet pro tali habendus; Semina communiſſime duo fovet ruſci bacca, uti ex baccis, quæ in officinis proſtant, patebit. In Germaniæ enim hortis raro aut nunquam maturantur. Rußken, Brûßken, Mäuſe-Dorn.

RVSCVS latifolius, fructu folio innaſcente Tournefort. Inſtit. 79. Laurus alexandrina, fructu folio inſidente C. B. P. 305. Laurus alexandrina I. B. 575. Laurus alexandrina, chamædaphne Column. Ecphraſ. p. 1. 165. Itali hujus ramos lardo appendunt, ad mures arcendos. In horto medico, floret cum præcedente. Uvulariam hortulani vocant.

RVSCVS anguſtifolius, fructu folio innaſcente Tournefort. c. l. Laurus alexandrina, fructu pediculo inſidente C. B. P. 304. Bonifacia, ſive Bislingua I. B. 1. 575. Hippogloſſum, Laurotaxa Column. Ecphraſ. p. 1. 165. Radix idæa, Hippogloſſum Column. Ecphraſ. Phytobaſ. 64. In horto medico cum præcedente. Smilaci Tournefortius

recen-

accenſet merito plantam illam, quam Jac. Cornutus vocavit POLYGONATVM SPICATVM, FERTILE. In hortis Curioſorum floret Majo.

SMILAX aſpera, fructu rubente C. B. P. 296. Smilax aſpera I. B. 2. 115. Smilax aſpera rutilo fructu Cluſ. Hiſt. 112. In horto medico floret Majo. Stechende Winde, oder Sarſaparilla (hæc enim planta a ſarſaparilla offic. parum vel nihil differt. vid. Matthiolus & Proſper. Alpinus.)

SMILAX lævis, foliis oblongis, acutis; Ruſcus anguſtifolius, fructu ſummis ramulis innaſcente Tournef. Inſtit. 79. Laurus alexandrina, ramoſa, fructu e ſummitate caulium prodeunte H. R. Pariſ. & H. L. Bat. in cujus appendice icon. exhibetur. In horto medico floret Majo & Junio.

ASPARAGVS ſativus. Spargeln corrupte dicitur Germanis. In hortis paſſim floret Jul. bacca vero maturat Septembri & Octobri. Spontaneus aliquando deprehenditur in pratis, v. gr. nach Löbſtädt zu. Aſparagi pariter dicuntur turiones lupuli, propter ſimilem & faciem & uſum; nam notiſſimum eſt, quod utriusque plantæ tempore verno prorumpentes ſtolones, comedantur.

ASPARAGVS ſpinoſus, corruda dictus: In hortis Curioſorum floret æſtate. Vid. Cluſ. hiſt. hiſp.

CLASSIS VII.

DE PLANTIS FLORE REGVLARI POLYPETALO GAVDENTIBVS.

I. Seminibus nudis.

ADONIS montanus, perennis, flore amplo, luteo. Ranunculus fœniculaceis foliis, hellebori nigri radice H. R. Monſpel. Helleborus niger, tenuifolius, buphthalmi flore C. B. P. 186. Helleborus Hippocratis Tabernæm. icon.

icon. 721. Auf dem Forſte, hinten am Berge, floret Aprili. Iſt überall häuffig neben denen Land-Straßen, wo man nach Franckenhauſen und Nordhauſen reiſſet; auch in denen Schmohniſchen Bergen. Ille, quem Menzelius exhibet, flore amplo, a vulgari noſtro, vulgo dicto Hippocratis Helleboro, vix & ne vix quidem differre videtur.

ADONIS arvenſis, flore phœniceo. Ranunculus foliis anthemidis, floribus rubicundis & ſplendentibus Cæſalpii 546. Adonis Matthioli 906. Adonis ſylveſtris, flore phœniceo, ejusque foliis longioribus C. *B.* P. 178. In agris frequens floret Junio. Adonis-Röslein, Teuffels-Augen.

ADONIS arvenſis, flore ochroleuco. Ranunculus arvenſis, foliis chamæmeli, flore citriato Tournefort. Inſtit. 291. Adonis ſylveſtris, flore pallido, ejusque foliis longioribus C. *B.* c. l. Inter ſegetes cum præcedente.

FICARIA vulgaris. Ranunculus vernus, rotundifolius, major Tournefort. Inſtit. p. 286. & minor ejusdem. ibidem. Chelidonia rotundifolia major & minor C. *B.* P. 309. Scrophularia minor, ſive chelidonium minus vulgo dictum I. *B.* 3. 468. Foliis violacea macula notatis variat; In pomariis & pratis frequens ad ſepes floret Aprili. Germ. Scharbock, Schmergel, Feig-Warzen-Kraut, klein Schöl-Kraut, Bieber-Höblin, Pfaffen-Höblin. Flore pleno aliquando occurrit.

HEPATICA flore ſimplici, cœruleo. Ranunculus tridentatus, vernus, flore ſimplici, cœruleo Tournef. Inſtit. p. 286. Trifolium hepaticum, flore ſimplici, cœruleo C. *B.* P. 330. Trifolium hepaticum, ſive trinitatis herba, flore ceruleo I. *B.* 7. 389. Trinitas Matthioii. Hepatica nobilis officinarum. In ſylvis noſtris paſſim floret Martio & Aprili. Leber-Kraut, Edel Leber-Kraut, Gülden-Klee.

HEPATICA flore ſimplici, ſubpurpureo & rubro. Cum præcedente v. g. in der Druſenitz bey Winzerla.

HEPATICA flore ſimplici, argenteo, ſive albo. Cum præcedente, ſed rarius v. g. auf dem Forſt.

HEPATICA flore pleno, cœruleo. In hortis.

HEPATICA flore pleno, purpureo. Cum præcedente; flore

flore albo pleno, raro, vel nunquam occurrit. Fruſtra has plantas D. Tournefort. cum ſequente nemoroſa ranunculis adjecit, cum & flore & fructu ab illis recedant. Perianthium hepaticæ eſt trifolium in cauliculi nudi, non ramoſi ſummitate floris baſin cingens, non tamen adeo arcte, quin poſſit conſpici quidam pediculus perbrevis poſt flores delapſos ſeminum glomeres ſuſtinens ſupra perianthium non deciduum; non ſecus ac videmus idem contingere in pulſatillæ, anemones & nemoroſæ ſpeciebus, in quibus plantis tamen longior eſt ille pediculus, & a perianthio varie, differto longius (præcipue poſt flores delapſos) remotus. Si vero quispiam cum D. Rajo hoc perianthium pro foliis accipere, & harum plantarum caules determinate foliatos dicere, maluerit, cum eo propterea non litigabimus.

NEMOROSA flore roſeo, albo, expanſo. Ranunculus phragmites albus vernus I. B. 3. 412. Anemone nemoroſa, flore majore C. B. P. 176. Anemone V. Dodon. Pempt. 435. In nemoribus paſſim floret Martio & Aprili, tempore adventus ciconiarum, unde quidam Storchs-Blumen appellant.

NEMOROSA flore purpuraſcente, connivente, & veluti campaniformi, floris dentis canis æmulo. Ranunculus nemoroſus, purpureus. Tabern. icon. 45. Cum præcedente.

NEMOROSA flore minore, luteo, modo unico, modo gemello. Ranunculus nemoroſus, luteus C. B. P. 178. Ranunculus phragmites, luteus, nemoroſus I. B. c. l. Nemoroſus ranunculus luteus Lobel. icon. 674. Cum præcedentibus. v. g. im Rauhenthale.

ANEMONE ſylveſtris alba, major C. B. P. 176. Anemone major, alba Tabernæm. icon. 23. Anemone ſylveſtris I. Cluſ. Pannon. & Hiſtor. Wind-Röslein, Anemon-Röslein. In montoſis, apricis, frequens floret Majo. Flore pleno aliquando occurrit bey der Diebs-Krippe.

ANEMONE tenuifolia multiplex rubra C. B. Pin. pag. 176. In horto flor. Majo.

PVL-

PVLSATILLA folio craſſiore & majore flore C. B. P. 177. Pulſatilla purpurea, cœruleaque I. B. 3. 409. Pulſatilla Dodon. Pempt. 433. In montibus apricis, Soli meridiano expoſitis paſſim floret Martio & Aprili. Flos hujus violaceus, formicarum majorum acervis nidisque impoſitus, propter harum ſal volatile acidum purpuraſcit. Incertus eſt harum plantarum petalorum numerus, adeoque ad polypetalas aptius rejiciuntur. Germ. Küchen-Schelle oder Oſter-Blumen.

FILIPENDVLA officinarum. Filipendula vulgaris an Molon Plinii? C. B. P. 163. Filipendula I. B 2. 189. In pratis montoſis variis v. g. auf der Tannicht-Wieſe, auch auf der Wieſe vor dem Cloſewitzer Höltzgen, im Walde hinter Jena-Prießnitz, floret Iun. & Iul. Filipendul-Wurtz, rother Steinbrech.

ACER montanum, candidum C. B. P. 430. Acer major multis, falſo platanus. I. B. I. 168. Acer major Dodon. Pempt. 840. In ſylvis variis v. g. im Rauhenthal, und hinter dem Fürſten-Brunnen auf der Wellneſe, floret Majo. Maßholder, Ahorn.

ACER platanoides Munting. Hiſt. 55. & Phytogr. Fig. II. Acer major Camerar. Epitom. 63. Aceris majoris varietas J. B. I. 168. Acer montanum, orientalis platani foliis, atrovirentibus Plükenet. Phytograph. Tab. 252. cum præcedente; folia habet ſubſtantiæ tenuiſſimæ & in acutos mucrones angulata, unde Caſp. Bauchino P. 431. Acer montanum tenuiſſimis & acutis foliis dicitur. Ex aceris virgis reſectis tempore verno ſtillat liquor copioſus, qui a quibusdam inſtar ſucci betulæ in potu uſurpatur, vid. Henricus Mundius. Aceris cymæ lacteſcunt.

ACER campeſtre & minus C. B. P. c. l. Acer vulgare, minore folio I. B. I. 166. Acer minor Dodon. Pempt. 840. In ſepibus, dumetis, ſylvisque frequens floret Majo. Virgarum craſſiorum & vetuſtiorum cortex valde rugoſus & profundis ſulcis exaratus conſpicitur, im Cloſewitziſchen Höltzgen. Kleiner Maßholder.

II. Seminibus tectis.

(1) CAPSVLA MVLTIPLICI.

POEONIA folio nigricante, ſplendido, quæ mas C. B. P. 323. Pœonia mas procerior J. B. 3. 492. Pœonia mas Dodon. Pempt. 194. Flore ſimplici & pleno in hortis frequens cum pœonia fœmina (quæ radicibus fuſiformibus, inſtar radicum aſphodeli a mare diſtinguitur. Floret Majo. Pœonien, Pœonien-Roſen, Gicht-Roſen, Pfingſt-Roſen, Bingen-Roſen, corrupte a voce Pœoniæ. Pœonia vel quaſi ſpontanea occurrit copioſa in vinea quadam neglecta zwiſchen Ammerbach und Lichtenhayn.

POEONIA fœmina flore rubro, albo & exalbido pleno. Cum præcedente.

NYMPHÆA alba, major C. B. P. 193. Nymphæa alba J. B. 3. 770. ut &

NYMPHÆA lutea major C. B. P. 193. Nymphæa lutea J. B. 3. 771. Dodon. Pempt. 585. Hic loci rarius proveniunt, occurrunt tamen bey Rudelſtadt, unde flores quotannis officinis inferuntur menſe Junio & Julio. Utraque etiam frequens eſt in ſtagnantibus aquis & foſſibus circa Lipſiam, nec non Wittebergam & Altenburgum atque Gieſſam & Alsfeldam. Waſſer-Lilien, See-Roſen, See-Blumen, See-Puppen, Waſſer-Mänugen, Tollingen, ꝛc.

TROLLIVS. Ranunculus flore globoſo quibusdam. Trollius flos J. B. 3. 419. Ranunculus flore globoſo Dodon. Pempt. 430. Helleborus niger, ranunculi folio, flore globoſo, majore Tournefort. Inſtit. p. 272. Inſtit. p. 272. In pratis præcipue uliginoſis, in der Zieke, auch bey Schlefreiſen, floret Jun.

ACONITVM. Helleborus niger, tuberoſus, ranunculi folio, flore luteo Tournefort. Inſtit. p. 272. Aconitum unifolium, luteum, bulboſum C. B. P. 183. Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberoſa J. B. 3. 419. Aconitum hyemale vulgo. In hortis floret Februario & Martio.

HELLEBORVS niger, anguſtioribus foliis Tournefort. Inſtit. p. 272. Helleborus niger flore roſeo C. B. P. 186.

Ellebo-

Elleborus niger, legitimus Cluſii Hiſt. 274. rechte ſchwartze Nieß-Wurtz, Chriſt-Wurtz a tempore florendi. In hortis floret Januario, Februario & Martio, aliquando & autumno floret.

HELLEBORVS niger, hortenſis, flore viridi C. B. P. 185. Helleborus niger, vulgaris, flore viridi vel herbaceo, radice diuturna J. B. 3. 636. In hortis cum præcedente, Germ. Chriſt-Wurtz, ſchwartze Nieß-Wurtz, Oel-Rößgen; radice utuntur Veterinarii ad equorum morbos.

HELLEBORASTER. Helleborus niger, fœtidus C. B. P. 185. Helleborus niger, ſylveſtris, adulterinus, etiam hyeme virens J. B. 3. App. 880. Pedicularia fœtida 3. Hier. Tragi. Cum præcedente floret Aprili.

NIGELLA arvenſis, cornuta C. B. P. 145. Melanthium ſylveſtre, ſive arvenſe J. B 3. 209. Inter ſegetes v. g. Zwiſchen Ober-Weimar und Ketſchau; auch noch viel häuffiger bey Laucha und Bebera; auch zwiſchen dem Rauhenthal und dem Jäger-Hauß. Floret Jun.

NIGELLA cretica, latifolia, odorata Parkinſon. Theatr. 1376. Nigella alba, ſimplici flore Proſp. Alpin. in Exot. 261. In agris inter carotas ſata frequens. v. g. im groſſen Paradieß, ohnweit Wöllnitz, floret Jun. & Jul. Germ. Schwartz-Kümmel.

NIGELLA flore majore, pleno, cœruleo C. B. P. 145. Melanthium, capite vel calice & flore majore, pleno J. B. 3. 208. Melanthium Damaſcenum, pleno flore Cluſ. Hiſtor. CCVIII. ut & eadem flore ſimplici. Cum præcedente.

AQVILEGIA ſylveſtris C. B. P. 144. Aquilegia, flore ſimplici J. B. 3. 484. Aquilegia Dodon. Pempt. 181. In ſylvis & pomariis v. g. in der Druſenitz bey Winzerla, im Walde über Jena-Prießnitz, zwiſchen Wöllnitz und den Fürſten-Brunnen, floret Majo & Jun.

AQVILEGIA hortenſis, tam flore ſimplici quam pleno, cujus in hortis paſſim plurimæ ſpecies occurrunt, quarum nomina recenſita videri poſſunt apud Tournefort. in Inſtit. p. 428. & 429. Ackeley, Glöcklein, Agley. Quamvis aquilegia diſſimilia habeat petala, altera nempe plana, al-

tera vero cucullata, irregularibus tamen propterea accenſeri non meretur, cum alterno ordine hæc petala ſint diſpoſita, adeoque floris regularitas ab illis non perturbetur.

FICOIDES africana, procumbens, latifolia, annua, floribus argenteis, minoribus Volkammeri Flor. Norimb. p. 166. & 167. In hortis variis floret Jun. & Jul.

FICOIDES peregrina, procumbens, maxima, foliis latiſſimis, una cum caulibus cryſtallina aſpergine ornatis. Volkammeri; cum præcedente.

FICOIDES africana, erecta, teretifolia, nonnihil glauca, ſummitatibus foliorum ſpinoſis, ſpinulis in ſtellam diſpoſitis Volkammeri p. 165. Cum præcedentibus. Et aliis Ficoidis ſpeciebus, quas qui noſſe cupit, adeat Volkammeri floram Norimbergenſem, & Boerhavii catalogum horti Lugduno-Batavi.

SEMPERVIVVM arboreſcens; Sedum majus, arboreſcens J. B. 3. 686. Sempervivum, ſive ſedum arboreſcens majus Dodon. Pempt. 127. In hortis variis, rarius tamen flores profert; ex ramulis vero aliquando fibras demittit, quæ terræ infixæ, in radices abeunt.

SEMPERVIVVM tectorum majus. Sedum majus vulgare C. B. P. 282. Sempervivum majus, alterum, ſive Jovis barba Dodon. Pempt. 117. In muris & tectis pagorum aliquando occurrit, floretque Jun. & Jul. Hauß-Wurtz, Hauß-Lauch.

SEMPERVIVVM tectorum minus. Sedum vulgari magno ſimile J. B. 3. 688. Hoc ſoboles gignit globuloſas, quæ ſæpe de ſe dimittit ex flagellis tenuioribus pendulas, auf der Stadt-Mauer, floret Jun. Hujus flos communiter eſt albus, interdum purpureus.

SEMPERVIVVM alpinum, foliis tomentoſis filamentis obductis. Sempervivum rubrum montanum, gnaphalodes Fab. Col. Sedum montanum tomentoſum C. B. Pin. pag. 284. Im Fürſten-Garten. Floret Jun. & Jul. vulgo ſedum gangrinum dicitur, vel cancrinum, propter folia veluti aranearum telis obducta; a voce germanica Kancker quæ araneam denotat.

III. Semi-

III. Seminibus tectis.

FRVCTV MOLLI.

PVNICA, quæ malum granatum fert, Cæſalpini 141. Malus punica, ſativa C. B. P. 438. Malus granata, ſive Punica ſativa Tabernæm. icon. 1033. In hortis floret Junio & Jul. ut &

PVNICA flore pleno, majore C. B. P. 636. Malus punica, flore pleno H. R. Pariſ. Balauſtia Hiſpanica J. B. I. 82. Balauſtia flore pleno, majore C. B. P. 438. Cum præcedente, Granat-Aepffel-Baum, mit einfachen und gefüllten Blättern.

OPVNTIA vulgo herbariorum J. B. I. 154. Ficus indica, folio ſpinoſo, fructu majore C. B. P. 458. In hortis floret Jun. Indianiſche Feigen. Hujus plantæ fructus maturus intus & extus ruber eſt, & ipſum lotium ſanguineo colore inficit, non ſine terrore eorum, qui comederunt, & hujus fructus proprietatis ignoti ſunt.

OPVNTIA maxima, folio ſpinoſo, latiſſimo & longiſſimo Tournefort. Inſtit. p. 240. Ficus indica, ſeu opuntia maxima, folio ſpinoſo, latiſſimo & longiſſimo H. L. Bat. In hortis cum præcedente. An hujus plantæ ſemen, an vero ſcarabæi quoddam parvum genus, ipſam hanc plantam depaſcere ſolitum, ſit coccionelle ſ. cochinilla officin. nondum inter Scriptores materiæ medicæ definituu eſt. vid. Sam. Dahle in pharmacologia, & Pomet dans l'hiſtoire des drogues.

CEREVS & melocactus a Tournefortio ad idem genus referuntur, videntur tamen ſatis notabiliter differre quoad florem, qui Cereo polypetalus, melocacto vero monopetalus.

OPVNTIA folio ſpinoſo, longiſſimo & anguſto H. L. Bat. cum præcedente.

MELOCACTVS americanus, flore albo, fructu atropurpúreo Tournef. Inſtit. App. p. 563. Cereus craſſiſſimus, fructu intus & extus rubro Sloane Cat. Plant. Jam.

196. Cereus Peruanus, ſpinoſus, fructu rubro nucis magnitudine C. B. P. 158. Cereus Peruvianus Tabernæm. icon. 705. In hortis Curioſorum, ubi tamen raro floret.

GRANADILLA. Granadilla Hiſpanis, flos paſſionis Italis Column. in Rechum 889. Clematis trifolia, flore roſeo, clavato C. B. P. 301. Maracot Indicum Aldini Hort. Farneſ. 50. 52. 58. In hortis variis floret æſtate. Germ. Paßions-Blume. Granadillam appellant a ſimilitudine fructus ipſius cum fructu punicæ, ſive mali granatæ; flos eſt quaſi bis vel ter polypetalus.

GRANADILLA folio tricuſpidi, flore parvo, flavescente Tournefort. Inſtitut. p. 240. Clematis paſſionalis, triphyllos, flore luteo Moriſon. Hiſtor. Oxon. p. 2. 7. Cum præcedente in horto medico. Ex hoc cenſu quoque eſt. Contrayerva off. vid. Muntingius & Plumerius.

CLASSIS VIII.

DE

PLANTIS FLORE REGVLARI COMPOSITO GAVDENTIBVS.

I. Ex regularibus & irregularibus ſimul.

(1) SEMINIBVS SOLIDIS.

SOL ampliſſimo nutante flore. Corona Solis Tabernæmont. Icon. 763. Helenium indicum maximum C. B. Pin. p. 276. Herba maxima J. B. 3. 107. In hortis paſſim (ubi Sonnen-Blumen appellant) floret tota æſtate & autumno, in brumam usque. Solem cum Rivino appellare malui, quam cum Tournefortio Coronam ſolis; cum

cum & Chymici ſuum habeant Solem, quidni & Botanici; quid quod Galli Soleil, hoc eſt, Solem appellant. Rarius florum numero variat, unde Corona Solis Tabernæmontani ſecund. icon. 763. Helenium indicum, ramoſum C. B. Pin. p. 77. Seminis colore pariter variat; hinc Corona Solis maxima, ſemine albo, cinereo & ſtriato Tournefortii; flore pleno aureo & ochroleuco, pariter in hortis noſtris occurrit.

SOL altiſſimus, radice tuberoſa, eſculenta. Corona Solis parvo flore, tuberoſa radice Tournefort. Inſtitut. pag. 489. Helianthemum indicum tuberoſum C. B. Pin. pag. 277. Flos Solis Farneſianus, Aſter peruanus, tuberoſus Col. part. II p. 13. Erd-Aepffel. In hortis & agris frequens, v. g. auf der Inſul, floret Septembri & Octobri.

SOL altiſſimus, virgæ aureæ foliis, radice tuberoſa. Corona Solis altiſſima, virgæ aureæ foliis Tournefort. Inſtitut. 490. Chryſanthemum ſcrophulariæ foliis, Americanum Plükenet Phytograph. Tab. 22. fig. 1. In horto medico floret Aug. & Septembri.

SOL foliis hydrophylli. Corona Solis foliis anguſtioribus, laciniatis Tournefort. Inſtitut. p. 490. Chryſanthemum americanum, laciniato folio, obſcurius virenti, minus Moriſon H. R. Bleſ. Aconitum helianthemum, canadenſe Cornut. p. 178. vulgo Doronicis annumerant, ſed perverſe. Elegantiſſimam hujus plantæ figuram vid. in Munting. Phytographia Fig. 154. ſub tit. Doronicum americanum. In hortis floret Aug & Sept.

VERBESINA, ſemine bi- vel tri-dentato, folio integro. Bidens folio non diſſecto Cæſalpin. pag. 488. Cannabina aquatica, folio non diviſo C. B. Pin. 321. Verbeſina pulchriore flore luteo J. B. 2. p. 1074. Eupatorium cannabinum, chryſanthemum Tabernæmont. Icon. 117. Floribus radiatis & non radiatis variat: ſequens vero folio tripartito hactenus nonniſi flore nudo nobis occurrit; quicunque vero ſcrupuloſius ſequentem alio transferre voluerit, cum eo non litigaverimus.

VERBESINA foliis tripartito diviſis. Bidens foliis tripartito diviſis Cæſalpin. 488. Cannabina aquatica, folio

tripartito diviſo C. B. P. 321. Verbeſina, ſive cannabina aquatica, flore minus pulchro, elatior ac magis frequens J. B. 2. 1073. In ſcrobibus & ad fimetoſa loca juxta ſtagna, &c. ubi per hyemem aquæ ſtagnarunt, floret Jul. & Aug. cum præcedente.

VERBESINA Curaſſavica, hieracii folio, caule alato. Bidens indica, hieracii folio, caule alato Tournefort. Inſtitut. 462. Chryſanthemum curaſſavicum, alato caule Paradiſ. Batav. In hortis Curioſorum floret Iulio & Auguſto. Hæc planta a multis pro Acmella venditatur, ſed male; ſiquidem acmella ſit quidem ſpecies bidentis, ſed non eadem cum hac noſtra. vid. diſſ. Breynii junioris de Acmella.

CHRTSANTHEMVM foliis matricariæ C. B. Pin. 134. Chryſanthemum majus ſolio valde laciniato, flore croceo J. B. 3. pag. 104. Chryſanthemum Matthioli; Chalcitis Tabern. Icon. 125. In hortis frequens floret tota æſtate. Gold-Blume.

CHRTSANTHEMVM majus, folio profunde laciniato, magno flore C. B. Pin. 144. Chryſanthemum creticum Cluſ. hiſtor. 335. In hortis cum præcedente, ſed rarius

GHRTSANTHEMVM flore partim candido, partim luteo C. B. Pin. pag. 134. Cum primo floret in hortis noſtris tota æſtate.

CHRTSANTHEMVM flore partim candido, partim luteo flore pleno ibidem.

CHRTSANTHEMVM arvenſe, folio glauco, dentato. Chryſanthemum folio minus ſecto, glauco J. B. 3. 105. Bellis lutea, foliis profunde inciſis, major C. B. Pin. 262. Chryſanthemum ſegetum Lobel. icon. 552. Inter ſegetes beym Thüringer-Walde und bey Oebernell zwiſchen Eiſenach und Berg an der Werre, auf den Aeckern. Floret Julio. Hoc a Germanis contra icterum extollitur.

BVPHTHALMVM Tanaceti minoris foliis Tournef. Inſtitut. 495. & C. B. Pin. pag. 134. Chamæmelum chryſanthemum quorundam J. B. 3. pag. 122. Buphthalmum vulgare, chryſanthemo congener Cluſ. hiſt. 432. Ochſen-Auge, Rinds-Auge. In agris, muris & vineis paſſim floret Jul. & Aug.

BVPH-

BVPHTHALMVM Tanaceti minoris folio, flore ſulphureo.

BVPHTHALMVM Tanaceti minoris folio, flore albo; cum præcedentibus, ſed rarius.

LEVCANTHEMVM vulgare Tournefort. Inſtit. 492. Bellis ſylveſtris, caule folioſo, major C. B. Pin. pag. 261. Bellis major Dodon. Pempt. p. 265. J. B. 3. pag. 114. In pratis frequens floret Jun. & Jul. Johannis Blume.

LEVCANTHEMVM vulgare, caule villis caneſcente Tournefort. l. c. Bellis ſylveſtris, caule folioſo, hirſuto, major, acutiore folio C. B. Pin. pag. 261. In aſperis, apricis, lapidoſis floret cum præcedente, a quo forſan parum, vel nihil differt.

LEVCANTHEMVM americanum, altiſſimum, foliis oblongis, rigidis. In hortis Curioſorum floret Aug. & Septembri.

LEVCANTHEMVM fruteſcens, ſapore pyrethri, foliis cotulæ. In hortis Curioſorum floret æſtate, autumno, & hyeme.

LEVCANTHEMVM ſylvaticum, tanaceti folio, ſemine umbilicato, flore majore. Matricaria Tanaceti folio, flore majore, ſemine umbilicato Tournefort. Inſtitut. p. 493. Tanacetum montanum inodorum, flore majore C. B. Pin. 132. Tanacetum inodorum I. Cluſ. hiſt. 338. In ſylvis & montibus circa Jenam paſſim floret Julio & Auguſto.

LEVCANTHEMVM ſylvaticum, tanaceti folio, ſemine umbilicato, flore minore. Matricaria tanaceti folio, flore minore, ſemine umbilicato Tournefort. Inſtitut. p. 493. Tanacetum montanum, inodorum, flore minore C. B. Pin. 132. Tanacetum inodorum II. Cluſ. hiſtor. pag. 338. Cum præcedente paſſim in ſylvis Jun. & Julio florens deprehenditur.

PYRETHRVM flore bellidis. C. B. Pyrethrum offic. Germ. Bertram-Wurtz, Zahn-Wurtz, Geifer-Wurtz, Speichel-Wurtz, in ſylvis montoſis zwiſchen dem Voigtlande und Böhmen; wird auch zuweilen in groſſen Wäl-

dern bey St. Micheln, Steinburg und Bebera gefunden; Floret æstate & autumno.

CALENDVLA multiflora, maxima.

CALENDVLA major, polyanthos, flore aureo,

CALENDVLA sativa, polyanthos, melina.

CALENDVLA multiflora, orbiculata,

GALENDVLA prolifera I. & II. Tabernæm. icon. 329. usque ad pag. 335. incluſ. Tales enim ejusdem varietates in hortis paſſim occurrunt, florentque Jun. Jul. & Aug. Germ. Ringel-Blumen.

CALENDVLA minor arvenſis. Caltha arvenſis C. B. Pin. 276. Caltha minima J. B. 3. pag. 103. Calendula arvenſis Tabernæm. icon. 335. In hortis cum præcedente. Spontaneam deprehendi in agris & vineis prope Wormatiam.

CALENDVLA africana, flore intus albo, foris violaceo Tournefort. Inſtit. pag. 499. Calendula humilis, africana, flore intus albo, foris violaceo, ſimplici H. L. Bat. In hortis Curioſorum floret Junio & Julio. Semina habet compreſſa, foliacea, cordiformia, ſeminis oreoſelini æmula; habet tamen & alia, his eleganti ordine interjecta, teretia, ſpadiceo-fuſca, ſuperficie granulata.

BELLIS ſylveſtris, minor C. B. Pin. 261. Bellis minor ſylveſtris ſpontanea J. B. 3. pag. 111. Bellis minor ſylveſtris Tabernæmont. Icon. 320. flore albo & ex purpureo mixto variat. In pratis, pomariis & paſcuis frequens floret toto fere anno. Germ. Maß-Lieben, Gänſe-Blümgen.

BELLIS ſylveſtris minor flore albo.

BELLIS ſylveſtris minor flore purpureo.

BELLIS hortenſis, flore pleno, magno.

BELLIS hortenſis, flore pleno parvo.

BELLIS hortenſis, flore pleno rubro.

BELLIS hortenſis, flore pleno albo & varia. In hortis frequens floret tota æstate.

BELLIS hortenſis, prolifera C. B. Pin. 262. cum præcedente.

BELLIS hortenſis, rubra flore multiplici, fiſtuloſo H. R. Pariſ. Cum præcedentibus im Fürſten-Garten.

BELLIS

BELLIS hortenſis flore pleno, ſemifloſculis ex altera parte albis, ex altera rubris. Cum præcedentibus.

BELLIS hortenſis, caule folioſo. Cum præcedentibus.

ASTERISCVS annuus, foliis ad florem rigidis, flore minimo, humilior Tournefort. Inſtitut. pag. 498. Chryſanthemum aſteris facie, foliis ad florem rigidis, flore minimo, humilius H. L. Bat. App. Im Fürſten-Garten, floret Majo & Jun.

ASTERISCVS flore nutante. Aſter cernuus Fab. Column. In hortis quandoque obvius floret Jun.

MATRICARIA vulgaris, ſeu ſativa C. B. Pin. pag. 133. Matricaria, vulgo minus Parthenium J. B. 3. 129. Artemiſia tenuifolia Tabernæm. icon. 8. In hortis frequens, auch zuweilen an ungebaueten Orten, v. g. am Löber-Thor auf der Stadt-Mauer. Floret Jul. & Aug. Germ. Mutter-Kraut, Metterich, Meter, Måler-Kraut.

MATRICARIA flore pleno C. B. Pin. 134. J. B. 3. pag. 130. Artemiſia tenuifolia, flore pleno Tabernæm. icon. 9. In horto medico & aliis floret cum præcedente.

CHAMÆMELVM vulgare. Leucanthemum Dioſcoridis C. B. Pin. 135. Chamæmelum vulgare, amarum J. B. 3. 116. Chamæmelum vulgare Dodon. Pempt. p. 257. Inter ſegetes frequens floret Iun. & Iul. Chamillen, Kumehlen, Hermigen.

CHAMÆMELVM nobile, ſive Leucanthemum odoratius C. B. Pin. 135. Chamæmelum odoratiſſimum, repens, flore ſimplici & multiplici J. B. 3. pag. 118. Chamæmelum Romanum, flore multiplici Tabern. icon. 19. In hortis v. g. im Fürſten-Garten, floret Majo & Junio. Edel Chamillen, Römiſche Chamillen.

CHAMÆMELVM inodorum C. B. Pin. 135. Chamæmelum inodorum ſive Cotula non fœtida J. B. 3. pag. 120. In agris frequens floret æſtate, ſequenti multo pumilius eſt, & reſupinum, foliisque incanis.

CHAMÆMELVM fœtidum, C. B. Pin. 135. Chamæmelum fœtidum, ſive cotula fœtida J. B. 3. 120 Cotula alba Dodon. Pempt. p. 258. juxta ſimeta floret cum præcedente præcipue bey Altenbergen, Kröten-Till, Hunds-Till.

MIL-

MILLEFOLIVM vulgare, album C. B. Pin. 140. Millefolium ſtratiotes, pennatum, terreſtre J. B. 3. pag. 136. Millefolium, ſive Achillæa Dodon. Pempt. pag. 100. In pratis, ſylvis & pomariis paſſim floret Jul. & Aug. In aſperis valde tomentoſum occurrit. Tauſend-Blat, Schaf-Garbe, Schaf-Rippe.

MILLEFOLIVM vulgare, purpureum, minus C. B. Pin. pag. 140. Cum præcedente.

MILLEFOLIVM purpureum, majus C. B. Pin. p. 140. Millefolium rubro colore Cluſ. Hiſt. pag. 331. Im Fürſten-Garten. Floret Jun.

MILLEFOLIVM fl. luteo. In hortis Curioſorum floret æſtate.

MILLEFOLIVM nobile Trag. pag. 476. Tanacetum minus, album, odore camphoræ, ſive Achillæa Dioſcoridis C. B. Pin. 132. Achillæa millefolia, odorata J. B. 3. pag. 140. In muris & parietibus zu Bebera, Laucha und Freyberg, wie auch Eckartsbergen und St. Micheln. Floret Jul. & Aug.

PTARMICA vulgaris, folio longo, ſerrato, flore albo J. B. 3. pag. 147. Dracunculus pratenſis, ſerrato folio C. B. Pin. 198. Draco ſylveſtris, ſive ptarmica Dodon pempt. p. 710. In ſylvis & pratis v. g. im Cluſewitzer Hölzgen und bey Rudersdorff floret Jun. & Jul. Weiſſer Bertram, vel potius weiſſer Dorand.

PTARMICA vulgaris, pleno flore Cluſ. Hiſt. XII. Dracunculus pratenſis, flore pleno C. B. Pin. p. 98. In hortis floret cum præcedente.

PTARMICA lutea, ſuaveolens Tournefort. Inſtitut. p. 497. Ageratum foliis ſerratis C. B. Pin. 221. Ageratum plerisque. Herba julia quibusdam J. B. 3. p. 142. Balſamita minor Dodon. pempt. p. 295. Ageratum, Eupatorium Meſuei Tabern. icon. 117. In hortis Curioſorum floret Jun. & Julio. Radius hujus plantæ eſt aureus, diſco concolor, atque breviſſimus.

(2) SEMI-

(2) SEMINIBVS PAPPOSIS.

HELENIVM officin. Helenium vulgare C. B. Pin. 276. Aſter omnium maximus, Helenium dictus Tournefort. Inſtitut. pag. 483. Helenium vulgare C. B. P. 276. Helenium ſive Enula campana J. B. 3. pag. 108. Inula Columellæ Helenium Dodon. pempt. 344. Alant. In hortis floret Julio & Auguſto. Differt Helenium ab Aſtere non ſolum petalorum apicibus crenatis, ſed & florum diſpoſitione, ut de perianthii craſſioribus ſquamis nihil dicam, nec de totius plantæ magnitudine.

DORONICVM officin. Doronicum radice ſcorpii brachiata C. B. Pin. 184. Aconitum pardalianthes Plinii, Matthiol. Tabern. Doronicum I. Tabernæm. icon. 336. In horto medico floret Majo & Jun. Gemſen-Wurtzel. Sponte provenit bey Gießen auf dem Hangelſtein.

ARNICA Schrœderi. Doronicum plantaginis folio, alterum C. B. Pin. 185. Doronicum Germanicum, foliis ſemper ex adverſo naſcentibus villoſis J. B. 3. p. 19. Aliſma Matthioli, ſeu plantago montana ejusdem 3. 20. Damaſonium I. Dioſcorid. icon. 738. In ericetis & ſylvis, hinter Rudersdorff nach Rode und Schlefreiſen, floret Junio & Julio circa feſtum D. Johannis, unde vulgo Johannis-Blume dicitur, non ſecus ac Leucanthemum vulgare; Johannis-Kraut vero Germanorum eſt hypericum: Alias dicitur etiam Mutter-Wurtz und Wolverley. De hujus plantæ virtute contra ſanguinem coagulatum & caſum ab alto vid. Ephemerides naturæ Curioſ. & acta Berolinenſia. Hinc etiam in Luſatia ſuperiori, a Pharmacopœis Zittavienſibus & aliis appellatur Fall-Kraut, quia in caſu ab alto cum cereviſia & aceto, vel apud pauperes aqua ſolum aut cereviſia coctum, plerumque uſurpatur. Zwingerus in ſuo herbario aſſerit flore cœruleo reperiri, quod nondum obſervavimus. Arnica differt a Doronico ſemifloſculorum apicibus integris: Es wächſt auch auf dem Forſt, und auf der Wellmeſe, aber nicht häuffig.

TVSSILAGO officin. Tuſſilago vulgaris C B. Pin. 197. Tuſſilago J. B. 3. pag. 563. Bechium, ſive Farfara Dodon.

Pempt.

Pempt. p. 596. Huff-Lattich, Brand-Lattich, Haber-Lattich, quia præcipue laudatur ea, quæ inter avenam naſcitur. Barbarorum turba, Filium ante patrem, vocat; quaſi folia eſſent pater florum. In agris ripisque fluviorum & torrentum frequens, Martio & Aprili floret paſſim v. g. an der Leiter. Tuſſilago differt ab Arnica ſemifloſculorum anguſtia, & perianthii ſtructura.

JACOBÆA vulgaris, laciniata C. *B.* Pin. 131. Jacobæa vulgaris I. *B.* pag. 1057. In aggeribus declivibus, pomariis & ad ſepes frequens, floret Iun. & Iul. Jacobs-Blume, Kröten-Kraut.

JACOBÆA altiſſima, foliis Erucæ artemiſiæve ſimilibus & æmulis; an Iacobæa vulgaris, foliis Inſtar Erucæ laciniatis C. *B.* Pin. pag. 131. In vineis & agrorum montoſorum terminis, floret Iun. Iul. & Aug.

JACOBÆA nemorenſis, latiore, rigidiore & hirſuto folio. Virga aurea, latifolia, ſerrata, quibusdam Solidago ſaracenica Chabr. pag. 333. In montoſis ſylvis frequens, v. g. im Walde bey Jena-Prießnitz und auf dem Forſt. Floret Iul.

JACOBÆA paluſtris, altiſſima, foliis ſerratis Tournefort. Inſtit. pag. 485. Conyza paluſtris, ſerratifolia C. *B.* Pin. 266. Virgæ aureæ ſive ſolidagini anguſtifoliæ affinis, lingua avis Dalech. I. *E.* 2. pag. 1063. Conſolida paluſtris, Tabernæm. icon. 555. In pratis uliginoſis, bey Laucha auf denen Obendorffiſchen Wieſen inter arundineta, nec non zwiſchen Leipzig und Halle auf denen Wieſen, bey dem ſo genannten Dreyer-Hauß. Floret Iun. & Iulio.

JACOBÆA montana, lanuginoſa, anguſtifolia, non laciniata C. B. Pin. 131. Jacobæa pannonica folio non laciniato I. *B.* 2. pag. 1058. Chabr. pag. 330. Jacobæa pannonica, folio non laciniato ſive Ilda Cluſ. Pann. pag. 573. ſeqv. & Hiſt. XXII. In ſylvis & montibus nemoroſis paſſim floret Majo.

JACOBÆA Senecionis folio incano, perennis Raji Hiſt. pag. 285. In ſylvis cæduis v. g. gegen dem Fürſten-Brunnen über, und nach Kleine hin, floret Iunio

nio & Iulio; flores habet minimos umbellatos & copioſos.

JACOBÆA viſcoſa & hirſuta. Jacobæa pannonica I. Cluſ. Hiſt. XXI. Senecio incanus, pinguis C. *B.* Pin. 181. Senecio hirſutus, viſcidus, major, odoratus I. *B.* 3. 1042. Erigeron tomentoſum, alterum Lobelii icon. 226. In muris tectis, vineis & circa pagos floret Iun. & Iul.

JACOBÆA maritima C. *B.* Pin. 131. Jacobæa marina, ſive cineraria I. *B.* 2. pag. 1058. Marina Jacobæa & artemiſia marina Neotericorum, ſive cineraria Lobel. icon. 227. In hortis frequens floret Majo Iun. & Iul.

JACOBÆA africana, annua, minor, ſenecionis folio, flore purpureo, elegantiſſimo Volkammeri, Flor. Norimberg pag. 225. cujus nitidam inſimul figuram exhibuit. In hortis frequens floret Iulio, Aug. & Sept.

JACOBÆA paluſtris altiſſima ſuaveolens foliis integris. Aſter incanus, verbaſci folio, villoſus Tournefort. Inſtit. pag. 482. Conyza incana C. *B.* Pin. 265. Conyza helenitis, mellita, incana Lobelii icon. 347. I. *B.* 2. 1052. Inter ſcirpos, typhas & arundines zu Leipzig im Stadt-Graben bey dem Thor, wo man nach Halle reiſet. Floret Iunio.

JACOBÆA paluſtris, altiſſima ſuaveolens, foliis diſſectis. Aſter paluſtris, laciniatus, luteus Tournefort. Inſtitut. pag. 483. Conyza aquatica, laciniata C. *B.* Pin. pag. 266. Conyza helenitis, foliis laciniatis Lobelii, icon. 347. Cum præcedente.

ASTER paluſtris, parvo flore globoſo Tournefort. Inſtitut. pag. 483. Conyza major, flore globoſo C. *B.* Pin. 266. Conyzæ mediæ minor ſpecies, flore vix radiato I. B. 2 pag. 1050. Conyza minima Dod. Pempt. p. 52. Ad ſcrobes frequens floret Iul. Aug. & Sept.

ASTER pratenſis, autumnalis, conyzæ folio Tournefort. Inſtitut. pag. 482. Conyza media, aſteris flore luteo, vel tertia Dioſcorid. C. *B.* Pin. pag 265. Conyza media Matthioli, flore magno, luteo, humidis locis proveniens I. *B.* 2. pag. 1050. Ad ſcrobes um Bothfeld und Franckfurth am Mäyn, floret Aug. & Sept.

ASTER

ASTER atticus, cœruleus, vulgaris C. B. Pin. 267. Aſter atticus, purpureo flore J. B. 2. 1046. After atticus Dodon. Pempt. pag. 266. In ſylvis & montoſis nemoribus paſſim floret Auguſto & Septembri. Flore albo variat. *Amellus Linn. Sp. Pl. p. 1226. 10.*

ASTER arvenſis, cœruleus, acris. Conyza cœrulea, acris C. B. Pin. pag. 265. Senecio ſive Erigeron cœruleus, aliis conyza cœrulea I. B. 2. 1043. Conyza cœrulea Tabernæmont. icon. 864. In aſperis & apricis murorum & vinearum floret Iulio, Auguſto & Septembri. Hæc eſt herba ruga D. D. Wedelii in ſyllabo materiæ medicæ p. 7. cap. IV. De abſtergentibus; & Hoffmann. in floræ Aldorffinæ deliciis ſylveſtribus teſtatur, hac quosdam uti contra ſodam. Flore albo variat, ne non pappi colore. *Erigeron acre.*

ASTER maritimus, paluſtris, cœruleus, ſalicis folio. Tournef. Tripolium majus, cœruleum C. B. Pin. 267. Tripolium Dodon. Pempt. p. 379. Tripolium majus I. B. 2. 1064. In pratis bey der ſaltzigen See floret Iul. & Auguſto. Et hæc aſteris ſpecies non ſolum florum colore, ſed & magnitudine variat. *Tripolium. Linn. Sp. Pl. p. 1226. 9.*

ASTER novæ Angliæ altiſſimus, hirſutus, floribus omnium maximis, purpureo violaceis, Prodrom. paradiſ. & Paradiſ. Batav. In hortis floret Septembri & Octobri. vid. Volkammerus Flor. Norinberg. pag. 50, ubi ſimul figuram ſub eodem nomine exhibet.

ASTER anguſtifolius, ſerotinus, canadenſis, flore cœruleo Moriſoni. After tenuifolius, ramoſus, canadenſis, flore minore, violaceo Schol. Botan. Aſter cœruleus, ſerotinus, fruteſcens Tradeſcant. Raji Hiſt. plant. In hortis floret Aug. Sept. Octobrique.

ASTER canadenſis, ſubhirſutus, ſalicis folio, ſerotinus, flore cœruleo Tournefort. Inſtitut. pag. 482. Cum præcedente.

ASTER autumnalis, elatior, flore cœruleo, minore H. R. Pariſ. After americanus, latifolius, maximus, puniceis caulibus H. L. Bat. App. Cum præcedentibus: Flore albo variat.

ASTER ramoſus, annuus, canadenſis, Moriſoni. Bellis ramoſa,

ramoſa, umbellifera Cornuti Plükenet. Almageſt. Botan. In horto medico, und drum herum auf Mauren, valde enim levi pappo ventorum arbitrio diſſeminatur. Floret Auguſto.

ASTER virginianus, anguſtifolius, ſerotinus, parvo, albente flore Parkinſon. After flore bellidis ſylveſtris minoris H. R. Bleſ. After ſerotinus, procerior, ramoſus, Bellidis ſylveſtris flore H. R. Pariſ. After canadenſis alter, Bellidis flore, minore Schol. Botan. Tournefort. In horto medico, frequens etiam in muris, Collegio vicinis. Floret Aug.

ASTER luteus, hirſuto ſalicis folio C. B. Pin. After luteus, lanuginoſus Parkinſon. After IV. pannonicus Cluſii. After lanuginoſo folio, ſeu Vtus ejusdem. After luteus hirſuto, ſalicis folio, J. B. In montibus & eorundem ſylvis, circa Jenam paſſim floret Jun.

ASTER montanus, luteus, ſalicis glabro folio C. B. Pin. 266. Conyza media Monſpelienſis, quibusdam aſteris attici genus, folio glabro, rigido J. B. 2. pag. 1049. Bubonium luteum Tabernæm. icon. 337. In ſylvis frequens cum præcedente, quo tamen ſerius floret.

ASTER luteus, major, foliis ſucciſæ C. B. Pin. p. 266. After primus, vel pannonicus major Cluſ. pannon. After tertius, ſive auſtriacus I. eidem in Hiſt. Plant. rar. an der Saal in ſalicetis, und ſonſt an feuchten Orten, frequens floret Aug. & Sept. folia, quæ ad terram ſunt, ſucciſæ folia ſic ſatis æmulantur.

VIRGAVREA, ſive Doria. Virga aurea ſerratis foliis Tabernæm. icon. 873. Virga aurea latifolia, ſerrata C. B. Pin. 265. In ſylvis frequens floret Aug. Gülden Wund-Kraut, Heidniſch Wund-Kraut.

VIRGAVREA Limonii folio, panicula uno verſu diſpoſita H. R. Pariſ. Virga aurea, Mexicana C. B. Pin. append. 517. In hortis Curioſorum floret Julio.

VIRGAVREA Canadenſis, hirſuta, floribus exiguis copioſiſſimis. Virga aurea, canadenſis, hirſuta, panicula minus ſpecioſa H. R. Pariſ. In horto medico floret Julio. Doria quibusdam dicitur virga aurea, a voce gallica d'or,

quod aurum notat, ab aureo florum virgatim, paniculatimve in thyrſo diſpoſitorum colore.

VIRGA aurea anguſtifolia, panicula ſpecioſa, canadenſis H. R. Pariſ. cum præcedente, v. gr. in Herr Pfündels Garten. Floret Aug.

VIRGAVREA Virginiana annua Zannoni 205. Aſter canadenſis, annuus, flore pappoſo H. R. Par. Conyza canadenſis, annua, acris, alba, linariæ folio Boccon. rarior. plant. 85. In hortis & muris variis totius fere Germaniæ veluti indigena facta hæc planta, pappo ſuo mire ſe propagans floret tota æſtate.

CTANVS montanus, latifolius, vel verbaſculum cyanoides C. B. Pin. 273. Cyanus alpinus, radice perpetua J. B. 3. 23. Cyanus major Dodon. Pempt. 251. In hortis Curioſorum floret Majo.

CTANVS floridus, odoratus, turcicus, ſive orientalis, major Parkinſon. Theatr. 481. In hortis frequens floret Junio, Julio & Auguſto, ubi cyanum moſchatum ab odore ſuaviſſimo appellant. Germ. Bieſem-Knopff, Bieſem-Blum.

CTANVS floridus, odoratus, Turcicus, ſive orientalis major, flore albo H. R. Pariſ. cum præcedente.

CTANVS floridus, odoratus, Turcicus, ſive orientalis major flore luteo H. L. Bat. Cum præcedentibus, quibus tamen tenerior multo eſt.

CTANVS ſegetum flore cœruleo C. B. Pin. 273. Cyanus hortenſis, flore ſimplici. Cyanus J. B. III. 21. Inter ſegetes frequens floret Junio & Julio. Korn-Blume, blaue Korn-Blume.

CTANVS ſegetum flore albo C. B. Pin. 273. Cyanus albus Tabernæm. icon. 147. Cum præcedente. Contradictionem in adjecto involvere videtur nomen hoc cyanus albus, ſed talia non curat Prætor, nam Virgauream flore albo & cœruleo pariter poſſe dici, quis negaverit? Germ. weiſſe Korn-Blume.

CTANVS hortenſis, flore incarnato.

CTANVS hortenſis, flore rubro.

CTANVS hortenſis, flore purpureo.

CTA-

CTANVS hortenſis, diſco rubro, cum corona candida.

CTANVS hortenſis, diſco carneo cum corona candida.

CTANVS hortenſis, diſco purpureo, cum corona candida.

CTANVS hortenſis, diſco immaculati candoris, cum corona carnea.

CTANVS hortenſis, diſco purpuraſcente, cum corona cœrulea.

CTANVS hortenſis dilute janthino, h. e. violaceo. Hæ varietates in hortis paſſim occurrunt, florentque cum cyano ſegetum.

JACEA nigra, pratenſis, latifolia C. B. Pin. 271. Jacea nigra, vulgaris, capitata & ſquamata J. B. 3. 27. Jacea nigra Tabernæm. icon. 152. In pratis frequens pariter atque in ſylvis floret æſtate. Flocken-Kraut, Flock-Blume.

JACEA nigra, anguſtifolia, vel lithoſpermi arvenſis foliis, caule lævi C. B. Pin. 275. prodr. 127. cum præcedente, v. g. bey Sultze.

JACEA latifolia, capite hirſuto C. B. Pin. 271. Jacea auſtriaca ſecunda, vel Jacea montana villoſo capite, ſive IV. elatior eidem in Hiſtor. Jacea pannonica, capitulo criſpo Camerar. in Thalium. Cyanus ſylveſtris κυανολαυροφύλλος Thalii in ſylva harcynia, auf dem Forſt und auf den Wieſen gegen dem Geraiſchen Schloſſe. Floret tota æſtate ante & poſt fœniſecium; ab hac nonniſi floris colore differt

JACEA alba, hirſuto capite C. B. Pin. 271. quam Bauhino D. Furerus Northuſa miſerat nomine Jaceæ auſtriacæ, majoris, villoſo capite, flore albo, it. flore purpureo.

JACEA vulgaris laciniata, flore purpureo Tournefort. Inſtitut. 443. Scabioſa major, ſquamatis capitulis C. B. Pin. 269. Centaureum collinum Geſneri, flore purpureo J. B. 3. 32. Scabioſa major Matthioli 969. Flore albo & hæc variat, quæ Centaureum collinum Geſneri, flore albo J. B. Tournefort. Inſtitut. 443. In vineis & agrorum montoſorum terminis floret Jun. & Jul.

JACEA auſtriaca tertia Cluſii pan. pag. 545. Bey Gieſſen in der Linder-Marck und im Herrn-Wald, floret Auguſto. Hujus ſquamæ nigris veluti coliis ſunt circumcinctæ; Flore albo variat aliquando, folia ipſius communiter ſunt integra, raro diſſecta. Huic plantæ quoad ſtructuram perianthii multum ſimilis eſt Jacea vulgaris, laciniata Tournefortii.

JACEA foliis cichoraceis, villoſis, altiſſimis, flore purpureo Tournefort. Inſtitut. 444. Stœbe major, foliis cichoraceis, mollibus lanuginoſis C. B. Pin. 273. Stœbe Salmanticenſis prior Cluſii, ſive Jacea intybacea J. B. 3. 36. Stœbe Salmantica I. Cluſ. Hiſtor. IX. In hortis floret Jun. & Jul. Flore albo & hæc occurrit.

JACEA foliis candicantibus, laciniatis, cauliculis non ſplendentibus Tournefort. Inſtitut. 444. Stœbe major cauliculis non ſplendentibus C. B. Pin. 273. Centaurei majoris ſpecies tenuifolia J. B. 3. 31. Bey Sultze und Eckhards-Berge. Floret Junio & Julio. Occurrit etiam flore albo zwiſchen der ſaltzigen See und Eißleben, zwiſchen Erdeborn und Heffta..

JACEA foliis erucæ, lanuginoſis Tournefort. Inſt. 444. Stœbe major, foliis erucæ mollibus, lanuginoſis C. B. Pin. 273. Stœbe Salmantica II. Cluſ. Hiſt. IX. Jaceæ genus, ſtœbe Salmantica, foliis mollibus, lanuginoſis, caule infirmo I. B. 3. 30. In hortis Curioſorum floret Iunio & Iulio. Flore purpureo & albo variat.

CRVPINA Belgarum; a feminis lubrica lævitate; Crepen enim vel cruypen Batavis proſerpere denotat. Jacea annua, foliis laciniatis, ſerratis, purpuraſcente flore C. B. Pin. 130. Cyanus pulchro ſemine, centaurei majoris I. B. 3. 24. Senecio-Carduus, apulus Columnæ Part. I. 34. In hortis variis floret Iunio & Iulio. In ſingulo flore communiter nonniſi duo vel tria ſemina gignit, pulchra, nigricantia, lubrica, pappo nigro criſtata, ſtellatimve coronata.

CALCITRAPA ſive ſolſtitialis flore luteo, caule alato. Carduus ſolſtitialis Dodon. Jacea lutea, capite ſpinoſo, majori C. B. Pin. In horto medico floret æſtate.

CAL-

CALCITRAPA. Carduus ſtellatus, ſive calcitrapa I. B. 3. 89. Carduus ſtellatus, foliis papaveris erratici C. B. Pin. 387. Spina ſtella Tabernæm. icon. 701. Hippophæſtum Fab. Colum. phytobaſan. 107. Flore intenſe purpureo, ſuave rubente & albo variat. An Land-Straſſen und um die Dörffer, v. g. bey Halle, wo man nach Zörbig gehet, und Franckfurth am Mäyn. Floret Iunio & Iulio. Calcitrapa differt a Jacea & Crupina radii, ſive coronæ brevitate vix conſpicua, a carduo vero non ſolum tota facie, ſed & ſpinis robuſtis capitulum vallantibus, & radio ſive corona, qua carduus deſtituitur. Stern-Diſtel.

II. Ex regularibus tantum.

(1) SEMINIBVS PAPPOSIS.

CARDVVS lanceatus, latifolius, C. B. Pin. 385. Carduus lanceolatus ſive ſylveſtris Dodon. I. B. 3. 58. Carduus lanceolatus Tabernæm. icon. 699. Ad vias, ſcrobes & agrorum terminos, juxta ſepes floret Innio & Iulio. Capitulorum magnitudine variat, præcipue bey Mechterſtädt.

CARDVVS lanceatus, latifolius, flore albo H. R. Pariſ. Ibidem.

CARDVVS caule criſpo I. B. 3. 59. Carduus ſpinoſiſſimus, anguſtifolius vulgaris C. B. Pin. 385. Cum præcedente paſſim v. g. an der Land-Straße nach Zwetzen und Borſtendorff an Rändern floret tota æſtate. Flore albo & hic nonnusquam eſt obvius. Tabernæm. icon. Polyacantham Theophraſti inſcribit. p. 701.

CARDVVS nutans I. B. 3. 56. In vineis & agris montoſis, ſterilibus, nec non juxta vias floret Iulio & Auguſto; flore purpureo, carneo & albo quandoque vidimus. Flos hujus ſuaveolet & ad Cyanum turcicum moſchatum accedit; ſpinis vero, quibus capitulorum perianthia armata ſunt, olfacientium nares infeſtat. Foliorum latitudine, nec non ſpinarum duritie ac longitudine variat.

CARDVVS acanthoides I. B. 3. 56. In ſalicetis, aliquando occurrit nach Wenigen-Jena, und auf der Inſul; Iſt auch bey Kleine zu finden, und in Ammerbach und

Bebera, nicht weit von dem Geſund-Brunnen. Floret Iul. & Aug. Floris colore & hic ludit.

CARDVVS albis maculis notatus, vulgaris. *C. B.* Pin. 380. Carduus marianus, ſive lacteis maculis notatus I. *B.* 3. 52. Carduus leucographus Dodon. Pempt. 722. Carduus Mariæ officinarum. In hortis frequens, unde aliquando inter hortorum quisquilias projecto ſemine germinans, quaſi ſpontaneus occurrit, floretque Julio & Aug. Germ. Marien-Diſtel, Frauen-Diſtel, Stech-Körner, Beh-Diſtel.

CARDVVS tomentoſus, acanthi folio, vulgaris Tournefort. Inſtit. 441. Spina alba, tomentoſa, latifolia, ſylveſtris C. *B.* Pin. 382. Spina alba, ſylveſtris Fuchſio I. *B.* 3. 54. Acanthium vulgare flore purpureo Tabern. icon. 686. Ad vias, ſepes & rudera floret Jul. & Aug. Flore albo & hic carduus variat.

CARDVVS capite rotundo, tomentoſo *C. B.* Pin. 382. Carduus capite tomentoſo I. *B.* 2. 57. Carduus eriocephalus Dodon. Pempt. 723. & Caroli Cluſ. Hiſt. Plant. rarior. Bey Ammerbach, und an dem Wege nach Weimar zu. Et hæc cardui ſpecies rarior flore albo, interdum aurem capite minus tomentoſo variat, am Wege zwiſchen Eiſenach und Mechterſtädt. Floret Auguſto. Carduorum variorum feminibus, juxta vias publicas naſcentium, non ſecus ac ſeminibus lactucarum nec non cichorei delectantur avienlæ canoræ, cardueles dictæ, quæ exinde Haſſis, Diſtel-Fincken; alias Stieglitz dicuntur.

CINARA hortenſis, foliis non aculeatis *C. B.* Pin. 383. Carduus, ſive ſcolymus ſativus, non ſpinoſus I. *B.* 3. 48. Cinara Dodon. Pempt. 724. In hortis oleraceis floret Iulio & Aug. Germani Artiſchocken appellant a voce gallica Artichaut.

CINARA hortenſis, aculeata *C. B.* Pin. 383. Carduus, ſive ſcolymus ſativus, I. ſpinoſus I. *B.* 3. 48. Cum præcedente.

CHIRONIA Rivini. Centaureum majus officinarum & Tournefort. Centaureum majus folio in lacinias plures diviſo *C. B.* Pin. 117. Centaureum majus, juglandis folio

folio I. *B.* 3. 38. In hortis *Curioſorum* quandoque obvium floret æſtate. Ad evitandum Botanicorum ſcandalum, homonymiam inquam, cum Rivino *Chironiam* appellare placuit, quamvis *Chiron* idem fuerit apud antiquos, qui *Centaurus*, modo alia ſit nominis externa ſaltim pronunciatio, non ſecus ac Tournefort. Hippocaſtanum græce vocavit plantam, quæ aliis æquivoce caſtanea equina dicebatur, de qua poſtea ſuo loco.

CIRSIVM ſingularibus capitulis parvis *C. B.* Pin. 377. *Cirſium* foliis non laciniatis, virore Braſſicæ & macrocaulon I. *B.* 3. 45. *Cirſium* tertium montanum *Cluſ.* Hiſt. CXLIX. auf der Wellmeſe floret Majo & Jun.

CIRSIVM pratenſe, Aſphodeli radice, latifolium Tournef. Inſtitut. 448. *Carduus* pratenſis, Aſphodeli radice, latifolius *C. B.* P. 377. *Carduus* bulboſus Monſpelienſium, ſive Acanthus ſylveſtris quibusdam, foliis laciniatis I. *B.* 3. 43. *Carduus* bulboſus Monſpelienſium Lobel. icon. 10. In pratis über Jena/Prieſenitz, auf der ſo genannten Riet/Wieſe. Floret Iulio.

CIRSIVM arvenſe, ſonchi folio, radice repente, flore purpuraſcente Tournefort. Inſtitut. 448. *Carduus* vinearum repens, ſonchi folio *C. B.* Pin. p. 377. *Ceanothos* Theophraſti Fab. Column. Ecphraſ. Part. I. pag. 46. In arvis paſſim Agricolis nimis odioſa hæc planta, propter radicem ſerpentem, floret Iun. & Iul. florum colore & capitulorum magnitudine variat.

CIRSIVM pratenſe, polycephalon, vulgare Tournefort. Inſtitut. 448. *Carduus* paluſtris *C. B.* Pin. 377. Prodr. 156. Hujus capitula ſunt viſcoſa, & florum pariter hoc cirſium colore variat. In pratis & ſylvis v. g. bey Cluſewitz und Bubeck, auch bey Schleben; capitula habet viſcoſa & conglomerata in ſummo caule. Floret Iunio & Iulio.

CIRSIVM acaulos, flore purpureo Tournefort. Inſtit. 448. *Carlina* acaulos, minore, purpureo flore *C. B.* Pin. 380. *Chamæleon* exiguus Tragi I. *B.* 3. 62. *Carlina* minor, purpureo flore *Cluſ.* Hiſt. CLVI. in agris, vineis, paſcuis & ſylvis frequens floret tota æſtate. Flore car-

neo & albo variantem aliquando deprehendi auf dem Forſt.

SERRATVLA ſylvatica. Serratula I. *B.* 3. 23. Dodon. Pempt. 42. Matthioli, Lobel. Cluſ. Hiſt. In ſylvis & nemoribus paſſim floret Iulio & Auguſto. Germ. Scharten Kraut, Färber-Scharten. Differentia in foliis ratione inciſuræ quadruplex eſt, ut recte Thalius, & poſt eum Caſp. Bauhinus obſervaverunt. (1) Foliis omnibus ſerratis, ſed inciſura carentibus: etiam flore candido, quæ ſerratula tinctoria I. Tabernæm. Icon. 156. (2) Foliis ad radicem integris, reliquis profunde inciſis, quæ Serratula II. tinctoria Tabernæmont. icon. 157. (3) Folia occurrunt utroque latere omnia ſimilibus diviſionibus divulſa, quæ ſerratula tinctoria III. Tabernæ. icon. 157. Serratulam ad Jaceas non recte retulit Tournefort. in Inſtitut. pag. 444. cum & flore non radiato, & perianthio cylindraceo a Jaceis ſatis longe recedat. Egregiæ ſunt hujus plantæ virtutes, quas vid. apud Matthiolum in Commentar. ad Dioſc. cap. de Betonica.

LAPPA & BARDANA officinarum. Lappa major, arcium Dioſcoridis *C. B.* Pin. 198. Perſonata, ſive Lappa major, aut Bardana I. *B.* 3. 570. Perſonata, Lappa major, Bardana Lobel. icon. 588. Klette, groſſe Klette. Ad ſepes, vias & rudera, pagosque frequens floret Aug.

LAPPA ſive Bardana major, flore albo Moriſon. Hiſtor. part. 3. 147. Rarius occurrit Jenæ, ſæpius bey Weimar. Floret cum præcedente.

LAPPA major, montana, capitulis tomentoſis; ſive arctium Dioſcorid. *C. B.* Pin. 198. Perſonata altera, vulgaris, capitulis magis minusve tomentoſis I. *B.* 3. p. 571. Cum præcedente paſſim. Bardanæ perianthium recurvis aculeis & veluti hæmulis eſt cinctum, unde veſtibus prætereuntium facile adhæret, non ſecus ac ſemina caryophyllatæ.

CNICVS ſylveſtris, hirſutior ſive carduus Benedictus *C. B.* Pin. 378. Carduus benedictus I. *B.* 3. 75. Dod. pempt. 737. In hortis floret Aug. Cardobenedicten.

CNICVS pratenſis, acanthi folio, flore flaveſcente Tournefort. Inſtit. 450. Carduus pratenſis, latifolius *C.*

B. P.

B. P. 376. Carduus pratenſis Tragi Lobel. icon. II. J. B. 3. 42. quæritur: quomodo ab hac planta differat Carlina polycephalos, alba, ad bicubitalem altitudinem excreſcens, cujus, folia ſuperiora candida *C. B.* P. 380. In pratis paſſim floret Aug. & Sept. Germ. Wieſen-Kohl.

CNICVS pratenſis humilior flore purpuraſcente. Cnicus pratenſis, acanthi folio, flore purpureo Tournefort. Inſtitut. 450. Cum præcedente, v. g. um Ziegenhayn, und auf denen Wieſen bey Ketſchau, hæ duæ plantæ ad cirſia referri poſſunt.

CNICVS atractylis lutea dictus H. L. Bat. Atractylis lutea *C. B.* Pin. 379. Atractylis vera, flore luteo J. B. 3. 83. Atractylis Dodon. Pempt. 736. In hortis Curioſorum floret tota æſtate.

PETASITES major, & vulgaris *C. B.* Pin. 197. Petaſites vulgaris, rubens rotundiore folio J. *B.* 3. 566. Petaſites Dod. Pempt. 597. Thuſilago major Matthioli. Roß-Pappeln, Peſtilentz-Wurtz, groſſer Hufflattig, Krafft-Wurtz, Neun-Krafft, Schweiß-Wurtz. Hujus duæ diverſæ plane ſpecies hinc inde locis aquoſis & riguis occurrunt, quarum prima perianthium habet ſquamoſum, verticoſius, & inſtar perianthii Sonchi in ſummitate coarctatum, & floſculos duplicis generis figuræve & magnitudinis, alteros perexiguos, quaſi ſemifloſculos, limbumque floris cingentes, cum intermediis, majuſculis brevioribus, amplioribusque floſculis duobus, tribusve; Altera vero petaſites flores habet meros tales, quales prior in meditullio habet, & perianthium non ſquamoſum, ſed parallelis ſegmentis cylindrum efformantibus conſtructum: poſſet itaq; hæc poſterior ad cacaliam referri; præcedens vero, quæ duplicis generis floſculos gerit, inſpecie petaſites appellari Prima itaq; ſpecies, quæ fert flores compoſitos ex regularibus & irregularibus ſimul provenit in der Ziske, auch bey Coſpida, Ziegenhayn, vorne bey dem Teiche u. Ammerbach; altera vero ſpecies quæ flores fert compoſitos ex regularibus tantum, uti bene perſpexi, creſcit bey Schleben am Teichen und kleine Neuhauſen an dem Mühl-Graben, it. ad ſcrobes wo man nach Eunitz gehet. Ex quo patet, quod hæc

planta, non ſecus ac bidens, cotula Tourneſ. matricaria, & chamæmelum ad utrumvis genus poſſit referri. Florent majo & Junio.

SENECIO minor, vulgaris *C. B.* Pin. 131. Senecio vulgaris, Erigeron J. *B.* 2. 1041. Senecio, ſive Erigeron Lobel. icon. 225. Germ. Creutz-Wurtz, Grind-Kraut ꝛc. In muris, tectis, cultis atque incultis paſſim toto fere floret anno. Senecionis perianthium ex muris parallelis, minime ſquamatim ſibi incumbentibus ſegmentis eſt conſtructum. Aviculis canoris vulgus præbet hujus plantæ pappoſa ſemina. Cito pappeſcit, etiam evulſa, unde nomen tam græcum quam latinum.

EVPATORIVM cannabinum *C. B.* Pin. 320. Eupatorium adulterinum J. *B.* 2. p. 1065. vulgare Hepatorium Dodon. Pempt. 28. Cannabina aquatica mas Lobelii. Kunigund-Kraut, Waſſer-Doſt, Alp-Kraut. In riguis ad torrentum limbos ripasve frequens floret Junio & Julio. Flore albo variat zwiſchen Wöllnitz und dem Fürſtens Brunnen.

EVPATORIVM novæ Angliæ, urticæ foliis, floribus purpuraſcentibus maculato caule H. L. Batav. append. Eupatorium urticæ foliis Paradiſ. Batav. Floret Junio & Julio. In hortis Curioſorum. Flore albo variat.

EVPATORIVM novæ Angliæ, Betonicæ foliis villoſis, flore albo Paradiſ. Batav. cum præcedente.

EVPATORIVM peruanum, fruteſcens: Elichryſo affinis; peruana, fruteſcens Herm. Hort. Acad. Lugdun. Batav. Agerato affinis, peruana, fruteſcens Prodr. Paradiſ. Batav. In hortis Curioſorum aliquando, ſed rariſſime floret. Tournefortius ad Conyzam refert, ſed immerito.

CONTZA major, vulgaris *C. B.* Pin. 265. Conyza major, Matthioli; Baccharis quibusdam I. *B.* 2. 1051. Baccharis offic. apud Sam. Dale, in ſuppl. pag. 68. In campeſtribus, apricis, aſperis, ut & in vineis floret Iul. & Aug. Dürr-Wurtz.

CONTZA foliis primulæ veris. Vulneraria ad fluvium Pfrim Hieronymi Tragi; an unterſchiedlichen Orten bey Halle, quæ vid. in Knauth. pag. 149. Es iſt auch bey Sultze

Sulze an denen Hecken hin und wieder anzutreffen, ſed floribus radiatis, qui in Hallenſi ſunt nudi, quod tamen ſpeciem non conſtituit diverſam, uti videmus bidentem flore radiato & non radiato, Cotulam Tournefortii flore nudo & radiato; figura radiatæ vid. in Thalii ſylva Harcynia a Camerario edita; hæc planta in Palatinatu multum laudatur contra obſtructiones menſium.

CONTZA africana, fruteſcens, foliis Salviæ, odore Camphoræ Tournefort. inſtitut. 455. Elichryſo affinis, africana, arboreſcens, floribus purpureo-violaceis, foliis ſalviæ, odore roris marini H. L. Batav. In hortis Curioſorum v. g. zu Naumburg im Wertheriſchen Garten, aſt rarius floret, craſſos quamvis ſæpe gignit truncos.

CONTZA linariæ folio Tournefort. Inſtitut. 455. Linaria folioſo capitulo, luteo, major C. *B.* Pin. 213. Heliochryſos Tragi, ſive Linaria tertia J. *B.* 3. 151. Coma aurea Germanica Park. Linoſyris nuperorum Lobel. icon. 409. Linaria aurea major & minor Tabernæm. icon. 825. In aſperis & apricis bey Freiburg und ad pagos zwiſchen Weiſſenfels und Naumburg. v. g. bey Leißnig. Floretque Jul. & Aug.

ELICRTSVM, ſeu ſtœchas citrina, anguſtifolia C. *B.* Pin. 264. Stœchas citrina, tenuifolia, Narbonenſis J. *B.* 2. 154. Stœchas citrina Dodon. Pempt. 268. In hortis, v. g. In horto medico & Sereniſſ. Principis floret Jun. & Jul.

ELICHRTSVM, ſeu ſtœchas citrina, latifolia C. *B.* Pin. 264. Stœchas citrina, germanica, latiore folio J. *B.* 3. 153. Amaranthus luteus I. Tabernæm. icon. 387. hujus plantæ Fig. 242. vid. in Munting. Phytogr. In apricis & aridis camporum, juxta vias publicas in arenoſis v. g. nach Zöllnitz und Städgen Rode hin, auch nach Kahle zu. Floret Jun. & Jul. Germ. Matten-Kraut, Rein-Blumen, quaſi dicas flores aggeribus familiares. Calice citrino, ſive melino, ſanguineo, & ex aureo rutilante variat, de quo vid. Breynius Cent. I. 145.

ELICHRTSVM americanum, latifolium, perianthio argenteo. Elichryſum americanum, latifolium Tournefort.

fort. Inſtitut. 453. Gnaphalium latifolium, americanum C. *B.* P. 263. Gnaphalium americanum Cluſ. Hiſtor. 327. J. *B.* 3. 162. In horto medico & aliis hortis floret æſtate. Cluſius argyrocomen vocavit, & nitidam ejusdem figuram exhibuit.

ELICHRTSVM ſpicatum Tournefort. Inſtitut. p. 453. Gnaphalium majus, anguſto, oblongo folio alterum C. *B.* P. 263. Gnaphalium rectum J. *B.* 3. 160. Gnaphalium Anglicum vel Belgicum, folio longiore Lobel. icon. 482. In ſylvis paſſim floret Majo, Jun. & Jul. Perianthii colore & hæc planta ludit.

ELICHRTSVM montanum, flore rotundiore Tournef. Inſtit. 453. Gnaphalium montanum rotundiore C. *B.* Pin. 263. Gnaphalium montanum Lobel. icon. 483. Hiſpidula Rivini. In aſperis, montoſis, lapidoſisque v. g. zwiſchen dem Rauhenthale und der Papier-Mühlen auf dem kahlen Berge ꝛc. Floret Majo. Germ. Katzen-Pfötgen. Flore variat ſubpurpureo, candido, ſuave rubente & variegato &c. vid. Tab. icon. 391. 392.

ELICHRTSVM montanum, longiore & folio & flore Tournef. Gnaphalium montanum longiore & folio & flore C. *B.* Pin. 263. Et hoc non ſecus ac præcedens colore floris variat. Quidam curioſiores in hoc ſexum deprehendiſſe ſibi viſi ſunt, ut rotundioribus capitulis ſit quaſi mas, altera vero capitulis oblongis, ſit quaſi fœmina, non ſecus ac otites hac ratione differt a Muſcipula, quod ulteriori indagini relinquimus, ſiquidem id nondum videre potuerim. Cum præcedente floret.

ELICHRTSVM annuum, floribus conglobatis, ſaxatile. Elichryſum ſylv. latifolium, capitulis conglobatis C. *B.* Gnaphalium minus latioribus foliis ejusdem Bauhini in Pin. p. 263. Chryſocome, Amaranthus luteus, ſtœchas citrina officin. Tab. icon. 186. Sed non recte, figura enim titulo non quadrat. Gnaphalium ad ſtœchadem citrinam accedens J. *B.* In ſaxoſis & petroſis bey Hayn-Büchen und Städtgen Rode; wird auch zuweilen an der Saale gefunden, floretque Jun. & Jul.

FILAGO,

FILAGO, ſeu herba impia Dodon. Pempt. 66. Gnaphalium Germanicum J. *B.* 3. 158. Gnaphalium vulgare majus C. *B.* Pin. 263. Herba dyſenterica Catal. Altorff. a germanico nomine Ruhr-Kraut. In agris vineisque lapidoſis, montoſis, & apricis v. g. copioſiſſime, vor den Coſpidaiſchen Pfarr-Höltzgen. Germ. Ruhr-Kraut, Feld-Kätzlein, Hynſch-Kraut, Engel-Blumen, ꝛc. Floret Jun. Jul. & Auguſto. Magnitudine, capitulorumque diſpoſitione variat.

FILAGO vulgaris, floribus per caulem ſparſis Tournefortii. Cum præcedente.

FILAGO altera Dodon. Pempt. 67. Gnaphalium majus, anguſto oblongo folio C. *B.* Pin. 263. Cum præcedentibus.

FILAGO minor. Ger. Emacul. 641. Gnaphalium minimum J. *B.* 3. 159. Gnaphalium minus, repens C. *B.* Pin. 263. In agris montoſis & lapidoſis, nec non vineis cum præcedente.

FILAGO paluſtris, capitulis nigricantibus, ſupina. In locis, ubi per hyemem aquæ ſtagnarunt, v. g. in alten Fuhr-Wegen, floret Jun. & Jul.

FILAGO vulgaris, tenuiſſimo folio, erecta Tournefort. Inſtit. 454. Gnaphalium vulgare, tenuifolium J. *B.* 3. 159. In agris & vineis floret poſt ſegetes.

(2) SEMINIBVS NON PAPPOSIS SIVE SOLIDIS.

TANACETVM officinarum. Rheinfaren, quaſi dicas filicem aggeribus gaudentem, propter ſimilitudinem foliorum filicis & tanaceti. Germ. etiam audit Wein-Faren, Wurm-Faren, Wurm-Saamen, Revier-Kraut ꝛc. Tanacetum vulgare, luteum C. *B.* Pin. 132. Ad fluviorum, torrentumque ripas inter ſalices floret Jul. & Aug.

TANACETVM hortenſe, foliis & odore menthæ Hort. Lugd. Batav. append. Mentha hortenſis corymbifera, ſive coſtus hortenſis J. *B.* 3. 144. Marien-Münz, Pfannen-Kuchen-Kraut. In hortis floret Aug. & Sept.

SAN-

SANTOLINA foliis teretibus incarnis Tournefort. Inſtit. 480. Abrotanum, fœmina, foliis teretibus C. B. Pin. 136. Chamæcypariſſus J. B. 3. 133. Polium Theophraſti & Dioſcoridis atque Arabum, verniculato folio Fab. Column. Ecphraſ. Part. 1. 54. Abrotanum fœmina Lobel. icon. 768. In hortis frequens floret Jul. & Aug.

SANTOLINA foliis obſcure virentibus, flore ſulphurei coloris Tournefort. Inſtit. 491. Abrotanum fœmina, viride C. B. Pin. 137. Abrotanum fœmina VI. Cluſ. Hiſt. 342. In hortis floret cum præcedente.

ABROTANVM mas, anguſtifolium, minus C. B. Pin. 136. Abrotanum cum pulchris corymbis J. B. 3. 194. Abrotanum odoratum humile, denſe fruticoſum Lobel. icon. 769. In hortis floret Jul. & Aug.

ABROTANVM mas anguſtifolium, majus C. B. Pin. 136. Abrotanum vulgare J. B. 3. 192. Abrotanum mas Dodon. Pempt. 21. Cum præcedente. Stab-Wurtz, Citronen-Kraut, Aebereiß, Aeberaute, Gartenheil.

ABROTANVM campeſtre, cauliculis albicantibus C. B. Pin. 136. Abrotanum ſylveſtre inodorum, cauliculis purpuraſcentibus Schwenkf. 5. Artemiſia tenuifolia III. Cluſ. Hiſt. Artemiſia tenuifolia I. Cluſ. pannon. in campeſtribus & vineis paſſim floret Aug. & Sept. hujus rami ſæpe in monſtroſa capita extuberant. Wilde Stab-Wurtz.

ABROTANVM linifolio acriore & odorato Tournefort. Inſtit. Dracunculus hortenſis C. B. Pin. 98. Dracunculus hortenſis, ſive Tarchon. I. B. 3. 148. Draco herba Dodon. Pempt. 709. Galli enim Eſtragon vocant, vel potius êtragon. In hortis culta planta hæc plane aromatica floret Julio & Aug. Dragun, Dragoncell, Käyſers-Salat.

ARTEMISIA vulgaris major C. B. Pin. 137. Artemiſia rubra & alba Tab. Icon. 7. & 8. Artemiſia officin. Floris atque caulis colore variat, ita, ut modo iis purpuraſcentibus, modo ſpadiceis aut ſubcallentibus ſit conſpicua, quod recte annotavit C. B. l. c. ad aggeres paſſim v. g. auf der Inſul. Floret Julio & Aug. Germ. Beyfuß, Johannis-Gürtel.

ABSIN-

ABSINTHIVM Ponticum, ſeu Romanum officinarum, ſive Dioſcoridis C. B. Pin. 138. Abſinthium vulgare majus J. B. 3. 168. Abſinthium latifolium Dodon. Pempt. 23. In hortis & agris tam circa urbem, quam pagos floret Jul. & Aug. Gemeiner Wermuth, wächſt auch wild vor und hinter Wöllnitz an dem ſteilen Berge vid. Tabernæm. in iconibus.

ABSINTHIVM Ponticum, tenuifolium, incanum C. B. Pin. 138. Abſinthium ponticum vulgare, folio inferius albo J. B. 3. 175. Abſinthium ponticum Galen. Tabern. icon. In hortis floret Jul. & Aug. wächſt wild um Leißnig und Schönborn, zwiſchen Naumburg und Weiſſenfels.

ABSINTHIVM arboreſcens Lobel. icon. 753. J. B. 3. 173. Abrotanum latifolium, arboreſcens C. B. Pin. 136. In hortis Curioſorum floret Jul. & Aug.

ECHINOPVS major J. B. 3. 69. Carduus ſphærocephalus latifolius vulgaris C. B. Pin. 381. Carduus Sphærocephalus Dodon. Pempt. 721. In horto Sereniſſimi Principis floret Jul. & Aug.

CARTHAMVS officinarum, flore croceo, Tournefort. Inſtit. 457. Carthamus ſive Cnicus J. B. 3. 79. Cnicus ſativus, ſive Carthamum officinarum. J. B. Pin. 378. Cnicus vulgaris Cluſ. Hiſt. CLII. Flore albido aliquando variat. Saffior. Floret Jul. & Aug. in agris.

III. Plantæ flore gaudentes regulari, compoſito ex irregularibus tantum:

(1) SEMINIBVS PAPPOSIS.

DENS Leonis latiore folio C. B. Pin. 126. Hedypnois, ſive Dens Leonis Fuchſii J. B. 2. 1035. Dens Leonis, Roſtrum porcinum Tabern. icon. 175. Taraxacon officinarum. Löwen-Zahn, Mönchs-Kopff, Dotter-Blum, Eyer-Blum, ꝛc. In pomariis, hortis, pratis & ad ſepes frequens floret Aprili & hinc toto fere anno. Foliis lucit, hinc

DENS Leonis ampliſſimo folio Tournefort. Inſtitut. 468.

DENS Leonis anguſtiore folio C. B. Pin. 126. Aphaca anguſtioris folii Cæſalp. 508.

DENS

DENS Leonis tenuiſſimo folio C. B. Pin. 126. Prodr. 62. Cum præcedentibus.

DENS Leonis, foliis minimis hirſutis & aſperis Tournefort. Inſtit. 469. Hieracium parvum, hirſutum, caule aphyllo, criſpum ubi ſiccatum. Cum præcedentibus.

HIERACIVM narbonenſe, caule aphyllo, folio ſinuato, hirſuto, Chabr. 322. Hieracium Dentis Leonis folio, hirſutie aſperum, minus C. B. Prodr. 62. deſcript. & icon. In pratis & ſylvis floret Majo Jun. & Jul. Hieracium Dentis Leonis folio, monoclonon ſubaſperum C. B. Pin. 127. vocat. Germanis dicitur Habicht's-Kraut.

HIERACIVM majus, erectum anguſtifolium, caule lævi C. B. Pin. 127. Hieracium majus Dioſcoridis Tabern. icon. 180. In pratis ſylvisque floret Majo & Jun.

HIERACIVM Dentis Leonis folio, flore ſuave rubente C. B. Pin. 127. Hieracium apulum, flore ſuaverubente Column. Part. 1. 242. Item Chondrilla purpuraſcens fœtida C. B. Prodr. 68. Chondrilla hirſuta flore rubente Chabr. Sciagraph. p. 318. ubi Violæ tricoloris icon. a typographo inepte appoſita. In hortis variis floret Jun.

HIERACIVM amygdalas amaras olens, ſeu odore apuli ſuaverubentis, H. R. Pariſ. Hieracium parvo flore, luteo, Apuli flore ſuaverubenti odore æmulum H. R. Bleſ. Hieracium foliis cichorei, ſylveſtris, odore caſtorei Botan. Monſpel. in vineis, acclivibus, aſperis & apricis juxta vias publicas, floret Jun. & Jul.

HIERACIVM minus præmorſa radice, ſive hieracium minus Fuchſii Chabr. 321. Hieracium minus Dioſcoridis Tabern. icon. 181. In acclivibus & ad ſepes pomariorum floret Aug. Hoc flores habet omnium Hieraciorum minimos obſervante Rajo.

HIERACIVM Dentis Leonis folio, monoclonon, glabrum C. B. Pin. 127. Auf dem Forſt, ſed rarius. Cum præcedente.

HIERACIVM minus, dentisque leonis folio oblongo C. B. Pin. pag. 127. Hyoſſeris altera vel anguſtifolia Tabernæm. in agris arenoſis bey Hummelshayn. Floret æſtate.

HIE-

HIERACII aſpera ſpecies, quibusdam hyoſeris anguſtifolia, aſpera Chabr. pag. 319. Hyoſeris anguſtifolia Tabernæm. icon. 180. Hieracium minus, Dentis Leonis folio oblongo, glabro C. B. Pin. 127. In vineis frequens, v. g. auf dem Hauß-Berge. Floret Majo & Jun.

HIERACIVM latifolium, glabrum Chabr. 322. Hieracium montanum, latifolium, minus Tabern. icon. 86.

HIERACIVM minus, Dentis Leonis folio ſubaſpero C. B. Pin. 127. Hypochœris, porcellia Tabernæm. icon. 179. In agris arenoſis, nach der neuen Schencke zu, floret Jun. & Jul.

HIERACIVM aſperum, majore flore J. B. 2. 1029. Cichorium montanum, anguſtifolium, hirſutie aſperum C. B. Pin. 126. Hieracium intybaceum, aſperum Tabernæm. icon. 184. Hieracium aſperum, flore tuſſilaginis Chab. 320. In vinearum & agrorum terminis tumetoſis floret Junio & Julio. Foliis variat, hinc duæ figuræ apud Tabern. primo loco allegata, & altera pag. 172. ſub nomine cichorei lutei.

HIERACIVM Dentis Leonis folio obtuſo, majus C. B. Pin. 127. Hieracium macrocaulon, junceum, ſive minus primum Dodonæo J. B. 2. 1031. Hieracium longius radicatum Lobel. icon. 338. Hieracium macrocaulon & macrorrhizon, flore hedypnoidis luteo Chabr. pag. 321. In pratis, paſcuis & vineis glabrum & hirſutum occurrit, floretque tota æſtate.

HIERACIVM foliis coronopi C. B. Pin. 128. Hieracium nigrum Tabern. icon. 181. In nemoribus & Alnetis nach Zöllnitz hin und Laaßdorff. Floret æſtate.

HIERACIVM montanum, rapifolium C. B. Pin. 128. Prodr. 65. In ſylvis & pinetis bey Kleine floret Jun. & Jul.

HIERACIVM folio piloſiſſimo, minimum, auf der Wellmeſe, floret Iun. & Iul.

HIERACIVM murorum, folio minus piloſo, non maculato H. R. Par. Hieracium pulmonaria non maculata dictum foliis indiſſectis Moriſon H. R. Bleſ. Cum præcedentibus frequens, floret tota æſtate.

HIERACIVM murorum piloſum, latifolium, altiſſimum

multiflorum, an dem hohen Ufer der Saale, wo man nach Cunitz gehet, floret æstate.

HIERACIVM fruticosum, latifolium, hirsutum C. B. Pin. 129. Hieracii sabaudi varietas I. Erinus quibusdam Matthioli dicta J. B. 2. 1030. Hieracium frutescens, latifolium polyanthos. In sylvis & montibus floret Julio & Augusto. Hieracii sabaudi varietas alia Chabr. 321.

HIERACIVM fruticosum, angustifolium, majus C. B. Pin. 129. Hieracium rectum, rigidum, quibusdam sabaudum J. B. 2. pag. 1030. Hieracium primum Dodon. Pempt. 638. In montosis, v. g. bey dem Fuchs-Thurme, und wo man aus dem Rauhenthale nach Closewitz gehet, floret Jul. & Aug.

HIERACIVM latifolium, præmorsa radice, caule singulari, piloselle majori affine Chabr. 322. In sylvis montosis v. g. bey Cospida und Vierzehnheiligen, frequens floret Jun. & Jul. vid. egregia in sciagraph. stirpium hujus plantæ figura apud Chabræum loco citato.

HIERACIVM alpinum, latifolium, maculatum, hirsutie incanum, flore magno C. B. Pin. 128. Hieracium pannonicum, latifolium Clusii maculatum & non maculatum Chabr. p. 320. vid. & Clus. Pan. pag. 640. Hieracium phlomoides Tabern. icon. 184. Herba costa officinarum. In montibus & sylvis frequens floret Majo & Jun. Foliis maculatis & non maculatis, ut & caule ramoso & non ramoso variat, uti recte observavit Rajus in addendis & emendandis ad historiam plantarum universalem; ramosum Tabern. expressit & Clusius pannon.

HIERACIVM murorum folio pilosissimo C. B. Pin. Pulmonaria Gallorum, flore hieracii Clus. & Lobel. Piloselle major quibusdam, aliis pulmonoria flore luteo J. B. Chabr. 324. Pulmonaria gallica, sive aurea Tabernæm. icon. 194. In muris, vineis & sylvis frequens floret Jun. & Jul. Buch-Kohl.

HIERACIVM murorum, laciniatum, minus pilosum, folio angustiore C. B. Pin. 129. Piloselle majoris, sive pulmonariæ luteæ species, angustifolia J. B. 2. 1034. Pulmonaria gallica, tenuifolia Tabern. icon. 195. In sylvis, sed rarius.

HIE-

HIERACIVM Echioides, capitulis Cardui benedicti C. B. Pin. 128. Hieracium capitulis cardui benedicti, maximum, Bugloſſum Echioides quibusdam J. B. 2. 1028. Chabr. pag. 320. In hortis Curioſorum floret æſtate & autumno.

HIERACIVM luteum, hirſutum, aliis cichorium luteum, hirſutum Chabr. 310. In pratis v. g. im kleinen Paradieße floret Majo & Junio, occurrit quandoque & glabrum, quod hieracium luteum, glabrum, aliis cichorium luteum, glabrum Chabr. p. 319. Dens Leonis III. Tabernæmont. icon. 175.

HIERACIVM fruticoſum, ſtrictiſſimo folio. Cum præcedente.

Folia hieracii murorum piloſiſſimi quandoque parte inferna rubent, aliquando & gallarum æmulas piloſiſſimas gerunt excreſcentias modo ad radicem, modo ad foliorum alas, de quibus videatur Tragus, & Heucherus, qui hieracium myophoron appellavit, & figuram ſuo proventui præfixit: ſimiles excreſcentias in hieracio fruticoſo, anguſtifolio obſervavimus auf dem Fuchs-Berge & in abrotano campeſtri paſſim.

PILOSELLA montana, hiſpida, parvo flore C. B. Pin. 262. Piloſella major, umbellifera, μακροκαύλος, montana & pratenſis Fab. Col. Ecphraſ. Part. I. 248. Hieracium montanum, umbelliferum, anguſtifolium Tournefort. Inſtitut. 471. Piloſella minor, folio anguſtiore, minus piloſo, repente Chabr. Sciagraph. 323. Hieracium murorum anguſtifolium, non ſinuatum C. B. Prodr. 67. In aſperis & apricis, lapidoſis, v. g. in vineis um Cunitz ꝛc. floret Junio, Julio & Auguſto; flagellis prorepit, adeoque ad piloſellam referri omnino meretur. Tournefortius cum C. Bauhino eandem plantam bis exhibuit, primo p. 469. ſub dente Leonis, & poſtea ſub Hieraciis. Differt vero & a dente Leonis, & ab hieracio, quod flagella de ſe emittat, ut alia taceam.

PILOSELLA peregrina, flore ſaturate croceo. Hieracium hortenſe, non laciniatum, floribus atro-purpuraſcentibus C. B. Prodr. 65. Pin. 128. Auricula muris hiſpani-

ca, aliis hieracium pannonicum, flore ſaturate croceo J. B. 2. 1040. Chabr. p. 324. Hieracium peregrinum, phlomoides Eyſtett. Piloſella indica Cornut. 209. In hortis floret Junio & Julio; & hæc planta flagella de ſe emittit, adeoque ab hieraciis differt, & ad piloſellam referenda eſt.

PILOSELLA officinarum. Dens Leonis, qui piloſella officinarum Tournefort. Inſtitut. 369. Piloſella major, repens, hirſuta C. B. Pin. 262. Piloſella, auricula muris Tabernæm. icon. 196. Piloſella majore flore, ſive vulgaris, repens J. B. 2. 1039. Chabr. 323. Germ. Mauß-Oehrgen, Nagel-Kraut. In apricis, aſperis, tenui gramine veſtitis floret paſſim Jun. & Jul.

PILOSELLA major repens, minus hirſuta C. B. Pin. 262. Auricula muris minor ſecunda Tragi. Lactucella ſylveſtris repens Camerar. hort. Piloſella major Camerar. Epit. 709. Dens Leonis, qui piloſella folio minus villoſo Tournefort. Inſtitut. 469. ubi piloſellam minorem, folio auguſtiore, minus piloſo, repentem J. B. pro hujus ſpeciei ſynonymo venditat. Hæc enim non adeo alte aſſurgit, nec tot in cacumine fert flores, rarius enim ultra tres flores habet. Creſcit in locis uliginoſis v. g. wo man aus dem Rauhenthale nach Cluſewitz gehet, ut & in aſperis v. gr. neben dem Fuß-Pfade, ſo über den Hauß-Berg nach Ziegenhayn führet. Floret Julio & Auguſto, figura vid. in Matthiolo & Tabernæmontano, quos Caſparus Bauhinus edidit.

PILOSELLA major erecta C. B. P. 262. Auf dem Fuchs-Berge, floret Majo & Jun.

SONCHVS aſper, non lanciniatus C. B. P. 123. Sonchus minor, lancinioſus, aſperior, ſive ſpinoſior J. B. 2. 1014. Sonchus lævis, tenerior Lobel. icon. 235. In hortis & agris paſſim inter olera floret Jun. Jul. & Aug.

SONCHVS aſper, non laciniatus, dipſaci vel lactucæ foliis C. B. Pin. 124 cum præcedente.

SONCHVS aſper, laciniatus folio dentis leonis C. B. Pin. 124. Sonchus laciniatus, ſpinoſus J. B. 2. 1016. Sonchus aſpera Matthioli 496. Sonchus aſper; cicerbita aſpera

aſpera Tabernæm. icon. 189. Cum præcedente. Germ. Gänſe-Diſtel, Sau-Diſtel.

SONCHVS repens, multis hieracium majus J.B.2.1017. Hieracium majus, folio ſonchi, vel hiæracium ſonchites C. B. Pin. 126. Hieracium majus Lobel. icon. 237. In agris cum cirſio arvenſi radice repente! paſſim floret tota æſtate.

SONCHVS aſper, arboreſcens C. B. Pin. 124. Edit. 2. Hieracium arboreſcens paluſtre ejusdem Pin. 127. edit. 1. Sonchus lævior, auſtriacus V. altiſſimus Cluſ. Hiſt. CXLVII. in dem Stadt-Graben zu Franckfurth am Mayn v. gr. beym Bockenheimer Thor. Floret Jul. & Aug.

SONCHVS aſper, laciniatus, creticus C. B. Pin. 124. Prodr. 60. Chondrillæ creticæ nomine miſſa, ſemine criſpo J. B. 2. 1022. Chabr. 318. vid. & Heucherus, qui pro nova ſonchi ſpecie deſcribit, ut & hieracium capitulis cardui benedicti Caſp. Bauhinus etiam ſub hieracio recenſet p. 127. ſub nomine hieracii majoris, foliis ſonchi, ſemine curvo.

SONCHVS tingitanus papaveris folio Tournefort. Inſtit. 475. Chondrilla tingitana floribus luteis, papaveris hortenſis foliis H. L. Bat. append. In hortis Curioſorum floret Jun Jul. & Aug.

SONCHVS æthiopicus, perianthio membranaceo, flore ſulphureo. In hortis Curioſorum, ubi vulgo hieracium von der Cap vocant.

SONCHVS lævis, laciniatus, latifolius C. B. Pin. 124. Sonchus minus laciniosus, mitior, ſive minus ſpinoſus J.B. 2. p. 1014. Sonchus lævis, laciniatus, latifolius C. B. Pin. 124. Sonchus lævis Dodon. Pempt. 643. Germ. Haſen-Kohl. In hortis oleraceis & agris nimis frequens floret Jun. Jul. & Auguſto.

SONCHVS lævis, laciniatus flore ſulphureo. Sonchus lævis, laciniatus flore niveo C. B. Pin. 124. Sonchus lævis tertius Tabernæm. icon. 191. Cum præcedente v. g. um Wenigen-Jena herum inter olera.

SONCHVS lævis minor, paucioribus laciniis C. B. Pin. 124. Sonchus laciniatus, non ſpinoſus J. B. 2.

1016. Sonchus lævis, latifolius Tabernæm. icon. 190. Cum præcedentibus.

SONCHVS lævis, folio integro per ambitum denticulato. Cum præcedentibus: an ſonchus aſper ſubrotundo folio C. B. P. 124. & Prodromo?

SONCHVS lævis, quartus, flore cœruleo Tabern. icon. 191. Sonchus lævis, laciniatus cœruleus, vel ſonchus alpinus, cœruleus C. B. Pin. 124. Sonchus lævior, auſtriacus, cœruleo flore Cluſ. Hiſt. Pannon. In denen Schmohniſchen Bergen, auch in Büſchen zwiſchen Schmohne und Wendel-Stein floret Jul. Tournefort. ad Lactucam refert; ſed rationem non video.

CHONDRILLA cœrulea Tabernæm. icon. 176. Lactuca perennis, humilior, flore cœruleo Tournefort. Inſtit. p. 473. Chondrilla cœrulea altera, Cichorii ſylveſtris folio C. B. Pin. 130. Chondrille vel Chondrilla cœrulea J. B. 2. p. 1019. In agris & vineis um den Fuchs-Berg herum bey Ziegenhayn, auch bey Ammerbach, wie auch bey der Diebs-Krippe, und über dem Teuffels-Loche. Floret Junio & Julio. Vulgo Scorzoneram nigram appellant, & una cum Scorzonera vulgari divendunt; flore albo nec non purpureo v. g auf dem Fuchs-Berge, quandoque variat: figura vid. apud Chabr p. 317.

CHONDRILLA juncea, viſcoſa, arvenſis, quæ prima Dioſcoridis C. B. Pin. pag. 130. Chondrilla juncea, viminea; arvenſis Tabernæm. icon. 178. Chondrilla viminea I. B. 2. 1021. Chabr. 317. ubi figura & deſcriptio exacte quadrant, niſi quod flores in ſummis ramulis ſolum hærere aſſerat, cum in noſtra & elatere caulis erumpant. In agris nach Lichtenhayn, Ammerbach und Jena-Prießnitz hin, floret Iul. & Aug.

CHONDRILLA ſonchi folio, flore luteo-palleſcente Tournefort. Inſtitut. 475. Sonchus lævis, laciniatus, muralis, parvis floribus C. B. Pin. p. 124. Lactua ſylveſtris murorum, flore luteo I. B. 2. 1004. Sonchus ſylvaticus IV. Tabernæm. icon. 194. In ſylvis frequens v. g. auf der Wellmeſe floret Iul. Aug. & Sept.

CHON-

CHONDRILLA Sonchi folio, flore purpuraſcente major Tournefort. Inſtit. pag. 475. Lactuca montana, purpuro-cœrulea, major C. B. Pin. 123. Lactuca ſylvatica, purpurea I. B. 2. 1005. Sonchus montanus, purpureus, tetrapetalus Column. Part. I. 244. In ſylvis zwiſchen Böhmen und Sachſen bey Tippelts-Walde und Königſtein, auch bey Pirna. Floret Iun. & Iul.

LACTVCA ſativa C. B. Pin. 122. Lactuca ſativa vulgaris non capitata I. B. 2. 997. In hortis & agris paſſim cum aliis lactucæ ſpeciebus floret Iun & Iul. Germ. Lattich, Lattucke, Schmaltz-Kraut, Salat, quæ foliis maculatis conſpicua eſt Germanis dicitur Forellen-Salat, a ſimilitudine macularum hujus piſcis.

LACTVCA ſylveſtris, coſtâ ſpinoſa C. B. Pin. 123. Lactuca ſylveſtris, ſive Endivia multis dicta, folio laciniato, dorſo ſpinoſo I. B. 2. 1003. Lactuca ſylveſtris Dod. Pempt. 646. hujus plantæ ſemen officinæ ſemen ſcariolæ vocant. Ad ſepes & rudera frequens floret Iulio & Aug. Wilder Lattich, Salat.

LACTVCA ſylveſtris altera, anguſto ſaligno folio, coſta albicante; bey Sultze ad ſalinas, item an der ſaltzigen See bey Artzberſſ, auch ad ſcrobes zwiſchen Lützen und Marck-Rannſtädt, Buttſtädt und Erfurth.

LACTVCA ſylveſtris, odore viroſo C. B. Pin. 123. Lactuca ſylveſtris, lato folio, ſucco viroſo I. B. 2. 1002. In confiniis Haſſiæ & Thuringiæ hinter Creutzburg. Ad ſepes floret Iun. & Iul.

SCORZONERA latifolia, ſinuata C. B. Pin. pag. 275. Tragopogon Hiſpanicus, ſive Eſcorzonera aut Scorzonera I. B. 2. 1060. Scorzonera major, hiſpanica I. Cluſ. Hiſt. CXXXVII. In hortis frequens floret Iun.

SCORZONERA latifoliæ altera C. B. Pin. 275. Scorzonera germanica I. Tabern. icon. 602. In montibus & pratis montoſis, v. g. bey Coſpida, Ziegenhayn und Jena, Prießnitz floret Majo & Iunio. Scorzonere, Scorzoner-Wurtz, Schlangen-Mord, Hafer-Wurtz, Natter-Wurtz, Viper-Graß.

SCORZONERA anguſtifolia, altera C. B. Pin. 275. Scorzonera tenuifolia, prima Thalii. Cum præcedente.

SCORZONERA latifolia humilis, nervoſa C. B. P. 275. Scorzonera humilis, latifolia, ſive ſecunda Cluſ. pannonica II. in Hiſt. Floret Iunio. In ſylvis bey Schmohne und nach Wendelſtein zu; auch im Laub-Froſch bey Halle.

SCORZONERA laciniatis foliis Tournefort. Inſtitut. 477. Tragopogon laciniatum, luteum C. B. Pin. 274. Tragopogon folio laciniato, flore pallido I. B. 2. 1059. Tragopogon laciniatis foliis Col. phytobaſ. 21, ut & Scorzonera capillaceo folio Tournefort. l. c. Hieracium capillaceo folio C. B. Pin. 129. Prodr. 66. In apricis, tenui gramine veſtitis an denen Wegen, wo ſonſt auch die Piloſella pflegt zu wachſen, floret Jun. & Jul.

TRAGOPOGON pratenſe, luteum majus C. B. Pin. 274. Tragopogon flore luteo J. B. 1058. Tragopogon Dodon. Pempt. 256. In pratis v. g. auf der Inſul, floret Majo, Jun. & Jul. Germ. Bocks-Bart.

TRAGOPOGON purpuro-cœruleum, porri folio C. B. Pin. 274. Barbula hirci purpuro cœrulea Tabern. icon. 599. In hortis, wird auch bey Freyburg im Hacken-Höltzgen, auch bey Halle wild gefunden, floretque Jun. & Jul. Utriusque hujus Tragopogonis capitula ſæpe loco ſeminum continent quidpiam fuligini ſimile, quod etiam obſervavit Camer. Epit. Matthiol. p. 167. his verbis: aus dieſen braunen Blumen werden bißweilen groſſe Knöpffe, darinnen viel ſchwartzes Staubs verſchloſſen, ſolches iſt nichts anders denn ein vitium, welches man den Brand nennet; wird zu Zeiten, doch nicht ſo offt, auch am gelben Bocks-Bart gefunden.

(2) SEMINIBVS NON PAPPOSIS, SIVE SOLIDIS.

CICHORIVM ſylveſtre ſive officinarum C. B. Pin. 125. Cichorium ſylveſtre, Picris Dodon. Pempt. 635. Cichorium ſylveſtre J. B. 2. 1007. Ad ſepes & juxta vias publicas paſſim floret circa Solſtitium, unde Germanis Sonnen-

Drat

Drat nomine venit, quaſi ſolſtitialem dicere voluiſſent: flore variat, communiter eſt cœruleo, rarius roſeo, albove. Hindläuffte, Wegwart, Sonnenwedel.

CICHORIVM ſativum C. B. Pin. 125. J. B. 1007. In hortis floret cum præcedente, a quo Rajus non differre cenſet, niſi cultura. Flore pariter variat cœruleo & albo, quod ultimum flore albo, a multis ſuperſtitioſis ad magicos uſus magni æſtimatur, & valdè expetitur, quod merito vitandum; hi enim ſunt abuſus, non uſus plantarum.

CICHORIVM latifolium ſive Endivia vulgaris Tournefort. Inſtitut. 479. Intybus ſativa, latifolia, ſive Endivia vulgaris C. B. Pin. 125. Intybum ſativum, latifolium J. B. 2. 1011. Intybus major, ſativa: Cichorium domeſticum Tabern. icon. 173. In hortis floret Jul. floribus cœruleis & candidis variat.

CICHORIVM criſpum Tournefort. Inſtit. pag. 479. Intybus criſpa C. B. Pin. p. 125. Intybum ſativum, criſpum J. B. 2. pag. 1011. Intybus criſpa, Endivia criſpa Tabern. icon. 173. Inter olera floret cum præcedentibus. Endivgen-Salat, Andivgen, krauße Endivgen.

LAMPSANA Dodon. Pempt. 675. J. B. 2. 1028. Soncho affinis, Lampſana domeſtica C. B. Pin. 124. Ad ſepes, & inter olera frequens, nec non inter ſegetes floret Julio & Auguſto. Folia Lampſanæ aliquando in agris ſanguineis vel violaceis maculis notantur non ſecus ac lactucæ ſylveſtris coſta ſpinoſa C. B. Papillaris aliquibus dicitur Lampſana, quia fiſſuras papillæ in mammis ſanare traditur, unde Anglis Nipple-Wort dicitur.

LAMPSANA ſylvatica elatior. Soncho affinis, Lampſana ſylvatica C. B. Pin. in nemoribus nach Krippendorff und Eckartsberge hin floret Aug.

HEDTPNOIS Tournef. Hieracii ſpecies juxta C. B. in Pin. ſed hieracium non poteſt dici, cum non pappeſcat; nec poteſt cum Hermanno ad Calendulas referri, cum non habeat florem compoſitum ex regularibus & irregularibus ſimul, ſed ex irregularibus tantum.

ZAZINTHA Tourn. & Matth. Cichorium verrucari-

um vulgo. De hujus virtute contra verrucas vid. Matthiolus. In hortis Curioſorum floret æſtate.

RHAGADIOLVS alter Cæſalpini 511. Hieracium ſiliqua falcata C. B. Pin. pag. 128. Hieracium ſtellatum J. B. 2. 1014. Hieracium Narbonenſe, falcatum Lobel. icon. 240. In hortis floret Jun. & Jul.

HYOSERIS latifolia. Hyoſeris maſcula Tabern. icon. 179. Hieracium minus, folio ſubrotundo C. B. Pin. 127. Hieracium minimum vel VIII. Cluſ. pannon. Inter ſegetes hinter der neuen Schencke nach den Städtgen Rode zu, floret Junio & Julio; Semen hujus plantulæ non eſt pappoſum, uti jam olim obſervavit C. B. in Pin. Moriſon ſuo more multa genera uno titulo complectens ad Endiviam retulit.

SCOLYMVS Tournefort. Scolymus chryſanthemos C. B. Pin. 354. Scolymus Theophraſti Cluſ. hiſt. pag. 446. Spina lutea J. B. 3. 84. Carduus chryſanthemus Dodon. Pempt. 725. In hortis Curioſorum floret Julio & Auguſto.

TAGETES maximus, rectus, flore ſimplici, ex luteo pallido J. B. 3. 100. Tanacetum Africanum, majus, ſimplici flore C. B. Pin. 133. Flos africanus major, ſimplici flore Tabern. icon. 13. In hortis floret Jul. & Aug. Studenten-Blume, Sammet-Blume.

TAGETES maximus, rectus, flore maximo, multiplicato J. B. 3. 100. Tanacetum, ſive Flos africanus, major, flore pleno C. B. Pin. 132. Flos africanus major, aureus, multiflorus Tabern. icon. 13. Cum præcedente.

TAGETES indicus, minor, ſimplici flore, ſive Caryophyllus indicus, ſive Flos africanus J. B. 3. 98. Tanacetum africanum, ſive flos africanus minor C. B. Pin. 133. Flos africanus minor, ſimplici flore Tabernæm. icon. 12.

TAGETES indicus minor, multiplicato flore J. B. 3. 99. Flos africanus minor, multiflorus Tabernæm. icon. 12. Tanacetum africanum, ſive Flos africanus, minor, flore pleno C. B. Pin. 133. Flore pleno, luteo-rubeſcente.

TAGETES indicus, minor, flore pleno luteo. Ibidem.

TAGE-

TAGETES Indicus minor, ſemifloſculis, partim luteis coccineis, cum præcedante.

TAGETES indicus, flore ſimplici, fiſtuloſo H. L. Bat. Tanacetum, ſive flos Mexicanus, flore fiſtuloſo, ſimplici C. B. Pin. 133. Caryophyllus Mexicanus, flore fiſtuloſo, ſimplici Column. Part. 2. pag. 46. Cum præcedentibus: idem flore pleno occurrit.

TAGETES indicus, minimus, flore ſericea hirſutie obſito H. L. Bat. Tanacetum africanum, minimum, ſericea hirſutie obſitum C. B. Pin. p. 133. Caryophylli Hiſpani dicti varietas ſeptima & octava Column. deſcript. Part. 2. 47. Cum præcedentibus. Perianthium Tagetis eſt monophyllum, membranaceum, tubuloſum, anguloſum & ſuperius dentatum: Semina ſunt oblonga, angulata, capitulo foliato inſtructa: Floſculi ſunt irregulares, latiſſimi tamen limbum occupant & coronam efformant. Hos flores ſuſpicione venenoſæ qualitatis non carere teſtantur Ephemerides Nat. Cur. Germ. quod etiam odor gravis & vaporoſus confirmare videtur.

IV. Plantæ flore gaudentes compoſito ex polypetalo & irregularibus.

STOEBE Rivini. Jacea Oleæ folio, capitulis ſimplicibus C. B. Pin. pag. 272. Ptarmica auſtriaca Cluſ. pannon. & Hiſtoria. Ptarmica altera Matthioli. Xeranthemum flore ſimplici, purpureo, majore H. L. Bat. Xeranthemum aliud, ſive Ptarmica quorundam J. B. 3. 25. In hortis floret Junio, Julio & Auguſto. Floris colore variat. Germ. Perpetuel-Blume, Papier-Blume.

STOEBE flore pleno variorum colorum, cum præcedente.

V. Plantæ flore compoſito ex polypetalo & regularibus.

CARLINA acaulos, magno flore C. B. Pin. pag. 380. Carlina acaulos J. B. 3. pag. 64. Carlina altera Dodon. Pempt.

Pempt. II. p. 727. In apricis, aſperis montium paſſim floret Aug. & Sept. Noſtræ radix eſt perennis quam maxime, hinc quæritur: quomodo Carlina acaulos, flore magno, radice perenni, montis aurei H. R. Pariſ. ab hac noſtra differat?

CARLINA cauleſcens, magno flore *C. B.* Pin. pag. 380. Carlina caulifera J. *B.* 3. p. 64. Carlina, ſive Leucantha Dodon. Pempt. pag. 727. Cum præcedente: hujus pariter atque præcedentis radices quotannis a Rhizotomis copioſe eruuntur, & Lipſiam deportantur venales. Eber-Wurtz. Germanis dicitur, non ſecus ac præcedens.

HERACANTHA Tabernæmont. & Rivini. Carlina ſylveſtris, vulgaris Cluſ. Hiſtor. CLVI. Cnicus ſylveſtris, ſpinoſior *C. B.* Pin. pag. 378. Carlina ſylveſtris quibusdam, aliis Atractylis J. *B* 3. 81. in apricis, aſperis cum Carlina paſſim, floretque Julio & Auguſto.

Obſ. 1. Hanc plantam Celeberrimus Wedelius noſter Carlinam ſcandentem appellat, & contra ſodam commendat, vid. Amœnitates Materiæ medicæ ipſius pag. 175. unde & Germ. Sood-Diſtel vocatur, nec non Creutz-Diſtel, unde forſan nomen Heracanthæ ortum; potius Dreu-Diſtel ſcribendum eſſe puto, ſiquidem Hieronymus Tragus teſtatur, præcipue eam, quæ terna gerit capita, præ cæteris extolli & æſtimari.

2. Eandem proprietatem Carlinæ vulgari attribuit Camerarius in Epit. Matthioli Germanica pag. 220. his verbis: Etliche hencken den dornichten Blumen-Kopff von der Eber-Wurtzel über den Tiſch, vermeinen, ſo man ihn anſiehet, helffe er wider das Kotzen und Sood des Magens, addit Camerarius: gehört ein ſtarcker Glaube darzu.

3. D. Mauritius Hoffmannus in floræ Aldorfinæ deliciis ſylveſtribus huic pariter ſynonymon facit Carlinam ſylveſtrem minorem Cluſ. in Hiſtor. hiſp. pag. 451. Mirandum vero, ſi hoc ita ſit, Cluſium hanc plantam nullibi quam aridis circa Salmanticam locis obſervaſſe, cum ubivis ſit obvia. Aliquando caule lato, monſtroſe faſciato occurrit, quæ Carduus monſtroſus figura Cornu copiæ Imperati C. B. Pin. pag. 379. cujus figura videatur in Chabræo.

CLAS-

CLASSIS IX.

DE PLANTIS FLORE PERFECTO, SIMPLICI IRREGVLARI, MONOPETALO GAVDENTIBVS.

I. Semine nudo unico.

VALERIANA major, odoráta radice J. B. 3. part. 2. 209. Valeriana hortenſis Dodon. Pempt. 349. Phu ponticum; Valeriana pontica Tabernæm. icon. 164. Valeriana hortenſis: Phu oluſatri folio Dioſcoridis C. B. P. 164. In hortis floret Junio. Germ. Baldrian, Katzen-Wurtzel, quia cati inſigniter delectantur hujus radicibus, præcipue tempore verno, iisque miris geſtibus, (quos Matthiolus facete & graphice pag. 38. deſcripſit) ſe ſupervolutant.

VALERIANA ſylveſtris major. *C. B.* P. 164. Valeriana major, herba benedicta Tabernæm. icon. 165. auf der Wellmeſe, und auf den Forſt, floret Jun. & Jul.

VALERIANA paluſtris major. *C. B.* c. l. Valeriana paluſtris, major, profunde laciniata C. *B.* Prodr. 86. In pratis uliginoſis im groſſen Paradieß floret cum præcedente.

VALERIANA paluſtris minor *C. B.* P. 164. Valeriana minima Dod. Pempt. In pratis uliginoſis bey Ziegenhayn und den Fürſten-Brunnen, noch häuffiger auf denen feuchten Wieſen, wo man nach Jena-Prießnitz gehet, auch im groſſen Paradieß. Floret Majo.

VALERIANA aquatica minor, flore minore. Raji Hiſtor. 389. Cum præcedenti, hujus figura videatur in D. Rivini ordine plantarum flore irregulari monopetalo. Hæc præce-

præcedente altius aſſurgit, & folia communiter terna habet oppoſita.

VALERIANA foliis calcitrapæ C. B. Valeriana annua, altera Cluſii Hiſt. LIV. In hortis Curioſorum. Floret Iun. & Iul.

PHV foliis glaſti. Valeriana rubra C. B. P. 165. Valeriana rubra latifolia I. B. c. l. In hortis Curioſorum flore rubro & albo occurrit. Floret Iunio & Iulio. Phu differt a Valeriana flore caudato, ſeve calcari donato, uti antirrhinum differt a Linaria. Nugæ veterum quorundam Botanicorum facile eluceſcunt, qui ex hac planta varia effinxerunt, de quo vid. C. B. in Matthiol.

PHV folio anguſtiore. Valeriana rubra anguſtifolia C. B. P. 165. I. B. 2. p. 2. 211. Cum præcedente.

VALERIANELLA arvenſis, præcox, humilis, ſemine compreſſo. Moriſ. Umb. Valeriana campeſtris inodora, major C. B. P. 165. Locuſta Rivini. Locuſta herba I. B. 3. 323. Herba ramiſtica Jungermanni. Lactuca agnina Tabernæm. Germ. Rapúnțigen, Feld- oder Lämmer-Lattig, Nüßgen-Salat. Sæpe in monſtroſa & folioſa capita degenerat. In arvis & inter ſegetes floret Majo; foliis integris & ſerratis variat.

VALERIANELLA arvenſis, ſerotina, altior, ſemine turgidiori Moriſ. Umbell. Cum præcedente: Semina nuda gemella hanc plantam habere, Clariſſ. Rivinus tradit, ſed reclamat autopſia.

SCABIOSA pratenſis hirſuta, quæ officinarum C. B. P. 269. Scabioſa major, communior, hirſuta, folio laciniato I. B. 3. 2. Scabioſa arvenſis, ſive ſegetalis Tabernæ: icon. 159. Apoſtem-Kraut, Scabioſen. In pratis v. g. auf der Inſul, im Paradieße & alibi floret æſtate; ſæpiusque flore quaſi pleno deprehenditur nach Cunitz hin, ejusque colore quoque variat, hinc occurrit quandoque.

SCABIOSA pratenſis flore albo, cum priori.

SCABIOSA multifido folio, flore flaveſcente C. B. P. 270. Scabioſa ochroleuco flore, ſive VII. Cluſ. Hiſtor. III. In Campeſtribus montoſisque v. g. an Hecken und Straßen

Straſſen nach Camburg, und Eckartsberge zu, floret Jul. & Aug. Interdum gemino capite, ut & ſobolibus abundans occurrit.

SCABIOSA capitulo globoſo C. B. P. 270. Scabioſa minor vulgaris I. B. 3. 3. Scabioſa V. Cluſii Hiſt. II. magnitudine variat & foliorum ſegmentis; hinc IV. figuræ apud Tabernæmont. icon. 160. 161. 162. In montoſis, apricis & vineis floret tota æſtate; iſt auch häuffig auf dem Forſt. Interdum prolifera deprehenditur, non ſecus ac ſucciſa, & ſcabioſa americana. Occurrit & flore pleno.

SCABIOSA ſtellata, folio laciniato, major *C. B.* P. 271. Scabioſa major cum pulchro ſemine I. *B.* 3. 9. Scabioſa major Hiſpanica, ſive prima Cluſii Hiſt. I. In horto medico, floret Iul. & Aug.

SCABIOSA peregrina rubra, capitulo oblongo *C. B.* Pin. pag. 270. rubra peregrina quibusdam Indica J. B. In hortis paſſim floret autumno in brumam usque; flore albo, carneo, atro-purpureo, nec non variegato, & aliis coloribus multum variat. Aliquando & prolifera occurrit, quæ forſan ſcabioſa prolifera Lobel. Tabern. & Cluſ.

SCABIOSA alpina, foliis centaurei majoris *C. B.* Pin. 270. In horto medico floret Iun. & Iul. Magna eſt ſimilitudo inter quasdam Valerianellæ & ſcabioſæ ſpecies, unde facile patet, quod non ad flores compoſitos referri debeant ſcabioſæ, inſpiciatur Valerianella ſemine ſcabioſæ ſtellato, de qua Fab. Column.

SVCCISA hirſuta *C. B.* P. 269. Scabioſa folio integro hirſuto Tournefort. Inſtit. p. 466. Succiſa, ſive morſus diaboli I. *B.* 3. 11. Auf dem Forſt, und im Cluſewitzer Holtze, floret Auguſto; Foliis glabris, & hirſutis nec non anguſtioribus variat, aliquando & flore carneo alboque occurrit, nec non prolifera, deprehenditur, quæ ſucciſa alpina, flore prolifero, cœruleo H. R. Pariſ. Germ. Abbiß, Teuffels-Abbiß.

DIPSACVS ſativus *C. B.* P. 185. I. *B.* 3. 73. Carduus fullonum, ſive dipſacus ſativus Lobelii icon. 17. Labrum veneris Matthioli. Weber-Karthen, Karthen-Diſtel. In agris circa pagos ſatus: Bey Weimar und Eckartsberge

bergen, item nach Apolda hin. Floret Julio & Auguſto.

DIPSACVS ſylveſtris, aut Virga paſtoris major *C. B.* P. c. l. Dipſacus ſylveſtris, ſive Labrum veneris I. *B.* 3. 74. & Lobel. icon. 18. Labrum veneris alterum Matthioli. Ad ſepes & ſcrobes paſſim in agrorum, vinearumque limitibus, juxta vias publicas floret Aug.

DIPSACVS folio laciniato *C. B.* Pin. pag. 385. Dipſacus ſecundus Tabernemontani, ad vias publicas juxta ſcrobes zwiſchen Worms und Franckenthal. Floret Julio & Auguſto.

DIPSACVS ſylveſtris, capitulo minore, vel Virga paſtoris minor *C. B.* P. 385. Virga paſtoris Matthioli. Dipſacus minor Thalii. Ad torrentum ripas v. g. am Mühl-Graben vor dem Johannis-Thor, auch an den Stadt-Graben hinter dem horto Medico, und bey Cloſewitz, floret Aug.

GLOBVLARIA vulgaris Tournefortii Inſtit. 467. Bellis cœrulea, caule folioſo *C. B.* P. 262. Aphyllanthes Anguillaræ, ſive globularia bellidi ſimilis I. *B.* 3. 13. floret Majo, provenitque in ſylvis, bey Freyburg und Schmohne, it. hinter Naumburg, v g. in Hackens Höltzgen, auch bey Halle in der Heyde, flore albo aliquando variat. Semen habet nudum, unicum, & flores irregulares, barbatos tantum, trifida barba inſtructos.

II. Seminibus nudis quaternis.

ECHIVM vulgare *C. B.* P. 525. I. *B.* 3. 586. Echium Dodon. Pempt. 631. In locis Campeſtribus paſſim juxta vias publicas floret Iun. & Iul. Flore cœruleo, rubro & albo variat. Germ. wilde Ochſen-Zunge.

ECHIOIDES flore cœruleo Rivini. Bugloſſum ſylveſtre minus *C. B.* P. 256. Echium Fuchſii, ſive Borrago ſylveſtris I. *B.* 3. 581. Bugloſſa ſylveſtris Dodon. Pempt. 628. In agris frequens, ſonderlich bey der neuen Schencke und auf der Inſul, floret Iun. Iul. & Aug.

ECHIOIDES flore albo Rivini. Echioides alba Column. Part. I. 185. Bugloſſum arvenſe, annuum, litho-

ſpermi

ſpermifolio. Tournefort. Inſtit. p. 134. Lithoſpermum arvenſe, radice rubra C. B. P. 258. Lithoſpermum nigrum quibusdam, flore albo, ſemine echii. I. B. 2. 592. Inter ſegetes floret Aprili & Majo, aliquando etiam Octobri refloret. Germ. Schminck-Wurtz.

ECHIOIDES flore pullo Rivini. Echium flore pullo Cluſii. Echium ſylveſtre lanuginoſum, pullo flore Chabræi p. 517. In agris eorumque limitibus bey Borſtendorff und Jena-Prießnitz, auch wo man nach Ammerbach gehet, floret Jun. & Jul.

ECHIOIDES flore pullo, calice amplo Riv. conſulatur & Raji hiſtor. plantar. inter ſegetes bey Apolda und Laucha floret cum præcedente.

BVGLOSSOIDES cretica Rivini. Pulmonaria cretica, annua, calice veſicario Tournefort. inſtit. p. 137. In hortis floret Jun. & Jul.

CHAMÆDRYS minor, repens. C. B. P. 248. Chamædrys repens, minor Dodon. Pempt 43. In apricis & montoſis, nec non vineis paſſim floret Jun. & Jul. Gamanderlein, oder Berg-Scordien.

CHAMÆDRYS minor, repens, flore albo. Sæpius occurrit auf dem Hauß-Berge cum præcedente.

TEVCRIVM Bæticum Cluſ. Hiſpan. 229. I. B. 3. 291. Teucrium peregrinum, folio ſinuoſo C. B. P. 247. In hortis floret Jun. & Jul.

SCORDIVM C. B. P. 247. Chamædrys paluſtris, caneſcens, ſive ſcordium officinarum Tournefort. Inſtit. 205. Lachen-Knoblauch, Scordien. In pratis uliginoſis bey Laucha, auf denen Obendorffiſchen Wieſen, auch ſonſten an der Unſtruth, floret Jul. Interdum etiam occurrit im groſſen Paradieße, ſed rarius.

SCORODONIA Riv. chamædrys fruticoſa, ſylveſtris, meliſſæ folio C. B. Pin. 205. Scordium alterum ſeu ſalvia ſylveſtris C. B. P. 247. bey Gießen in Wäldern, v. gr. in der Linder-Marck, und auf den Dießberge, floret Majo & Junio.

MARVM Cortuſi. J. B. 3. 242. Chamædrys maritima, incana, fruteſcens, foliis lanceolatis Tournefort. pag.

505. In hortis floret Jun. & Jul. Vulgus marum verum vocat, unde aliqui ſatis inepte effinxerunt wahrhafftig bitter, quaſi amarum verum latine diceretur.

CHAMÆPITYS officinarum. Chamæpitys lutea, vulgaris, ſive folio trifido *C. B.* P. 249. Chamæpitys odorata, flore luteo I. *B.* 3. 295. Ajuga, ſive Chamæpitys mas Dioſcoridis Lobel. icon. 382. Schlag-Kräutlein, Schlag-Kraut, Erd-Kiefer, Feld-Cypreß, Erd-Pin. in agris montoſis & lapidoſis, v. g. bey dem Forſt, bey dem Jäger-Hauſe, und bey Wage, floret Jul.

AJVGA folio integro Rivini. Polium lavendulæ folio *C. B.* P. 220. Polium pannonicum vel majus Cluſii Pannon. Polium montanum officinarum. Foliis aliquando denticulatis variat. In apricis paſſim in vineis & montoſis, aſperis, meridiei expoſitis floret Jun. & Jul. Germ. Wilder Roßmarin, wilder Lavendel, Berg-Lavendel.

OCIMVM latifolium, maculatum & criſpum *C. B.* Pin. Baſilicum indicum maculatum Eyſtett. In hortis variis floret Jul. & Aug. Germ. Baſilien-Kraut.

OCIMVM caryophyllatum majus *C. B.* Pin. pag. 226. cum præcedente, color tam foliorum, quam florum, in alio albus, in alio niger eſt.

OCIMVM vulgatius *C. B.* l. c. ocimum medium Matth. cum præced.

HORMINVM coma purpuro-violacea I. *B.* 3. 309. Horminum ſativum *C. B.* P. 238. In hortis quandoque obvium floret Jun. & Jul.

HORMINVM ſylveſtre latifolium Cluſio. I. B. 3. 314. Hormium ſylveſtre III. Cluſii Hiſtor. XXIX. Horminum ſpurium Riv. In horto medico, ubi vulgo horminum foliis betonicæ vocant: Floret cum præcedente

HORMINVM ſylveſtre ſalvifolium minus. *C. B.* Pin. p. 239. Horminum ſylveſtre, V. ſpecies prior Cluſ. hiſt. In pratis & campeſtribus, juxta vias publicas & in cœmeteriis bey Erdeborn, groſſen Ehrig und Eißleben, auch bey Alſtädt floret æſtate.

HORMINVM pratenſe, flore minore; cum vulgari, v. g. auf der Inſul.

SCLA-

SCLAREA Tabernæm. icon. 373. Horminum ſclarea dictum *C. B.* P. 238. Gallitrichum ſativum. I. *B.* 3. 309. Orvala. Dodon. Pempt. 292. Germ. Muſcateller-Kraut, quia vina hujus additione vina muſcatellina mentiuntur. Scharlach-Kraut. In hortis floret æſtate.

SCLAREA vulgaris lanuginoſa, ampliſſimo folio Tournefort. Æthiopis foliis ſinuoſis *C. B.* P. 241. Æthiopis multis I. *B.* 3. 309. Horminum flore albo Rivini; In hortis floret Jun. & Jul.

SCLAREA Pratenſis, foliis ſerratis, flore cœruleo Tournefort. Inſtit. p. 179. Horminum pratenſe Rivini. Horminum pratenſe, foliis ſerratis *C. B.* P. 238. Gallitrichum ſylveſtre vulgo, ſive ſylveſtris ſclarea flore cœruleo, magno I. *B.* 3. 311. In pratis frequens floret Jun. & Jul. wilde Salbey.

SCLAREA pratenſis, foliis ſerratis, flore albo. Item floribus ex cœruleo & albo variegatis utraque reperitur in pratis, hinter denen Gärten, wo man nach Löbſtädt gehet.

SCLAREA pratenſis, foliis ſerratis flore ſuave rubente. In hortis & pratis paſſim cum vulgari cœruleo ſ. violaceo, ſed rarius multo. Floret Jun. & Jul.

SCLAREA hiſpanica Tabernæm. icon. 374. Horminum ſylveſtre lavendulæ flore *C. B.* P. 239. In cœmeteriis, ruderatis, & ad pagos zwiſchen Rulsdorff, Erdeborn, Eißleben und Altſtädt, occurrit Jul. & Aug.

SALVIA major, an Sphacelus Theophraſti *C. B.* P. 237. Salvia latifolia I. *B.* 3. 304. In hortis frequens floret Jun. & Jul. floris colore variat. Salbey.

SALVIA cretica baccifera Camerar. Epit. Matth. pag. 242. pariter in hortis Curioſorum aliquando occurrit, cujus baccæ ejusdem farinæ & originis eſſe videntur cum gallis quercuum, & excreſcentiis monſtroſis hieracii ſabaudi & pulmonariæ gallica dicti, nec non hederæ terreſtris atque roſæ ſylveſtris.

SALVIA major, foliis verſicoloribus *C. B.* P. 237. cum præcedente.

SALVIA major, foliis ex luteo & viridi variegatis H. R. Pariſ. Jun. & Jul.

SALVIA altera, perelegans, tricolor, argentea Belgarum H. R. Pariſ.

SALVIA latifolia, ſerrata *C. B.* P. 237. Prodr. 113. Salvia ſerrata criſpa I. *B.* 3. 305. Im Fürſten-Garten, floret Jun. & Jul. cum præcedente.

SALVIA minor, non aurita *C. B.* In hortis paſſim floret cum ſequenti.

SALVIA minor, aurita *C. B.* Salvia minor, auriculata. I. *B.* Salvia minor Dodon. In hortis frequens floret æſtate. Germ. Creutz-Salbey.

SALVIA minor, foliis variegatis H. R. Pariſ. App. cum præcedentibus floret.

DRACOCEPHALON americanum Breynii Prodr. t. 34. Digitalis indica, anguſtifolia, profunde ſerrata, folio perſicæ H. R. Pariſ. In hortis curioſorum floret Jul.

CASSIDA paluſtris, vulgatior, flore cœruleo Tournefort. Lyſimachia cœrulea, galericulata, vel gratiola cœrulea *C. B.* P. 246. Tertianaria, aliis Lyſimachia galericulata I. *B.* 3. 435. Ad fluviorum & torrentum ripas in ſalicetis um Rode und Hanſpitzen, wie auch im groſſen Paradieß; item an dem untern Raths-Teiche vor dem Löber-Thore, in denen Sümpffen des Cloſewitziſchen Pfarr-Höltzgens, auch zwiſchen der alten Sinne und Lißden; in alnetis & piſcinis neglectis, copioſa eſt. Floret Junio Jul. & Auguſto.

CASSIDA paluſtris, vulgatior, flore albo. Tournefort. cum præcedente aliquando occurrit.

PRVNELLA major, folio non diſſecto *C. B.* P. p. 260. Prunella flore minore, vulgaris I. B. 3. 428. In pratis, paſcuis & ſylvis frequens floret Julio. Flore albo & purpuraſcente variat. Prunelle, Braunellen.

PRVNELLA cœruleo, magno flore *C.* B. P. 261. Prunella flore magno, folio non laciniato I. B. 3. 429. Prunella I. Cluſii Hiſtor. XLIII. In aſperis & apricis frequens floret Jun. Jul. & Aug. & hæc floris colore variat, nec non foliis profunde inciſis.

PRV-

PRVNELLA hyſſopifolia *C.* B. Prunella anguſtifolia I. B. 3. 430. bey Liſſla; ſed rarius floret cum præcedente.

PRVNELLA folio laciniato, flore albo. H. R. Pariſ. Brunella folio laciniato *C.* B. P. c. I. Prunella flore albo, parvo, folio laciniato I. B. 3. 429. Prunella II. non vulgaris, albo flore Cluſii Hiſt. XLIII. An denen Hecken der Weins Berge im Lerchen-Felde floret æſtate.

LAMIVM purpureum, fœtidum, ſive Galeopſis Dioſcoridis *C.* B. P. 230. Galeopſis, ſive urtica iners, folio & flore minore I. B. 3. 323. Urtica iners altera Dod. Pempt. 153. todte Neſſel, taube Neſſel. In cultis & arvis frequens floret totò fere anno; flore albo quandoque variat.

LAMIVM, folio oblongo, flore rubro Parkinſon. Theatr. 606. Lamium purpureum, non fœtens, folio oblongo. *C.* B. P. 231. Galeopſis, ſive urtica iners, flore purpuraſcente, majore, folio non maculato I. B. 3. 321. Ad ſepes in und um Ammerbach, auch bey Zöllnitz und Laaßdorff an der Rode, und zu Liſſde an denen Hecken. Lamium alba linea notatum ab hoc vix differt, occurrit vero tale zu Liſſde an denen Hecken u. bey Eiſenach nach Eichert zu; floret tota æſtate & autumno. Floret Aprili & Majo, nec non tota æſtate.

LAMIVM vulgare, album, ſive archangelica, flore albo Parkinſon. Theatr. 604. Lamium album non fœtens, folio oblongo *C.* B. P. 231. Galeopſis, ſive urtica iners, floribus albis I. B. 3. 322. Ad ſepes paſſim, floret cum præcedente. Germ. taube Neſſeln.

LAMIVM alba linea notatum *C.* B. P. Galeopſis folio maculato I. B. cum præcedente aliquando occurrit; iſt ſehr häuffig an denen Hecken, wo man von Eiſenach ausgehet nach Eichert; flores habet purpureos. vid. Solenander, qui Milzatellam vocat, & contra affectus lienis valde extollit.

LAMIVM folio caulem ambiente *C.* B. P. Galeopſis, ſive urtica iners, minor, folio caulem ambiente I. B. 3. App. 853. Morſus gallinæ folio hederulæ alter Lobel. icon. 463. Galeopſis foliis caulem ambientibus Rivini. Affines ſpe-

cies Tabern. icon. 714. In agris paſſim floret toto fere anno, & magnitudine variat.

CEDRONELLA Rivini. Moldavica betonicæ folio, flore cœrulco Tournefort. inſtit. 184. Meliſſa peregrina, folio oblongo C. B. P. 229. Meliſſa turcica mutis dicta I. B. p. 2. 234. Meliſſa turcica Tabernæm. icon. 355. Flore albo variat, floretque in hortis Iul. & Aug. ſremde Meliſſe, Türckiſche Meliſſe.

CEDRONELLA orientalis, ſalicis folio Riv. Moldavia orientalis ſalicis folio Tournef. In hortis cum præcedente floret.

MOLDAVICA americana, trifolia, odore gravi Tournef. Meliſſa forte cavarina, triphyllos, odorem camphoræ ſpirans penetrantiſſimum Plukenet. Almag. Botan. 400. & phytograph. Tab. 325. fig. 5. In hortis Curioſorum floret autumno v. g. zu Gotha in des Herrn geheimden Raths Avemanns Garten.

BALLOTE Matthioli 825. Marrubium nigrum, ſive Ballote I. B. 3. 318. Marrubium nigrum, fœtidum C. B. P. 230. Ad ſæpes paſſim floret Iun. & Iul. Flore albo etiam variat. Germ. ſchwartzer Andorn.

GALEOPSIS procerior, fœtida, ſpicata Tournefort. Inſtit. 185. Lamium maximum, ſylvaticum, fœtidum C. B. P. 231. Galeopſis, ſive Urtica iners, magna, fœtidiſſi- I. B. 3. App. 853. Urtica herculea Tabernæm. icon. 536. Stachys ſylvatica Rivini; Galeopſis legitima Dioſcord. & Cluſii. Ad ſepes & in dumetis floret Iun. & Iul. v. gr. bey Ziegenhayn.

GALEOPSIS procerior, caliculis aculeatis, flore purpuraſcente Tournefort. Urtica aculeata, foliis ſerratis C. B. P. 232. Cannabis ſylveſtris quorundam, urticæ inerti affinis I. B. c. l. Cannabis ſylveſtris ſpuria, altera, lamium quorundam Lobel. icon. 527. Ad ſepes & rudera frequens floret tota æſtate. Floribus magnis & parvis purpureis & albicantibus variat v. g. auf der Inſul an denen Hecken.

GALEOPSIS altera, caliculis aculeatis, flore flaveſcente Tournefort. Cannabis ſpuria, flore majore Rivini; Hujus barba ex purpureo, luteo & albo colore eleganter variegata

riegata eſt. An Galeopſis anguſtifolia, flore variegato Tournefort. Inſtit. 185. Cannabis ſpuria, anguſtifolia, variegato flore polonica? vid. Rajus in Hiſt. Ad ſepes & ſcrobes. Um Laaßdorff und Bürgel, floret Jun. Jul. & Aug.

GALEOPSIS patula ſegetum, flore purpuraſcente Tournefort. Sideritis arvenſis, anguſtifolia rubra *C. B.* P. 233. Laudanum ſegetum Rivini. Alyſſum Galeni, flore purpureo Tabern. icon. 541. Flore albo variat; In vineis nach dem Rauhenthal hin im Lerchen-Felde, & inter ſegetes paſſim, v. g. wo man nach der Papier-Mühle gehet, floret æſtate.

GALEOPSIS patula ſegetum, folio latiore; Ladanum ſegetum latifolium; cum præcedente v. g. nach Hummels-Hayn, wo man von dar nach Kahla reiſet. Alia hujus plantæ ſpecies mihi occurrit in agris arenoſis bey Hummels-Hayn, floris colore multum varians, cujus fig. exhibuiſſe videtur Dominicus Chabræus in append. ad ſciagraphiam ſtirpium.

GALEOPSIS paluſtris, betonicæ folio, flore variegato Tournefort. Inſtit. p. 185. Stachys paluſtris, fœtida *C. B.* P. 236. Galeopſis anguſtifolia fœtida I. *B.* 3. App. 854. panax Coloni apud Gerh. Anglum. vid. Raji hiſt. plant. univerſalis. Inter ſegetes & in ſcrobibus floret Jun. & Jul. Cl. Rivinus Stachyn paluſtrem appellavit.

GALEOPSIS, ſive Urtica iners, flore luteo I. *B.* 3. 323. Lamium flore luteo Rivini. Lamium folio oblongo, luteum *C. B.* P. 231. Urtica iners tertia, ſive lamium, luteo flore Dodon. Pempt. 153. In nemoribus v. g. Im Rauhenthale, im Cluſewitzer Hölzgen, floret Majo; Foliis maculis albis, nigriſque notatis variat, quæ

GALEOPSIS lutea, amplioribus foliis maculatis Tournefort. Inſtit. 186. & Bœrhavii Enumerat. Plant. Hort. Lugd. Bat. cum præcedente auf dem Cunitzer Berge.

STACHYS alpina. Pſeudo-Stachys alpina *C. B.* in ſylvis montoſis, v. g. auf dem Dießberge bey Gießen floret Jul.

STACHYS arvenſis minima Riv. Sideritis lato obtuſo folio in agris frequens bey Wittenberg und Gießen floret æſtate & autumno.

STACHYS major germanica C. B. P. 236. Stachys Fuchſii I. B. 3. 319. Stachys Dioſc. Lobel. icon. 530. Stachys montana Rivini. In agris montoſis, ſterilibus, & vineis, v. g. Um den Fuchs-Berg, Wellmeſe, und um den Forſt herum, floret Junio, Julio & Aug. flore albo variat.

CARDIACA I. B. 3. 320. Marrubium, cardiaca dictum, forte I. Theophraſti C. B. P. 230. Hertz-Geſpann, Hertz-Geſperr, Wolffs-Fuß, Wolffs-Trapp. Ad ſepes & rudera v. g. in und um Zweyen, und Burgau floret Junio, Julio & Auguſto; Flore albo quandoque variat, bey der Wellmeſe, nec non foliis elegantet criſpatis, de qua vid. P. Hermannus.

LEONVRVS perennis, africanus, ſideritidis folio, flore phœniceo, majore Breynii Prodr. 2. Leonurus capitis bonæ ſpei, Breyn. Cent. I. Cardica africana, perennis, foliis ſideritidis, floribus longiſſimis, phœniceis, villoſis. H. L. Bat. In hortis floret æſtate, in brumam usque denſos ſpecioſiſſimorum florum verticillos explicans.

MOLVCCA lævis Dodon. Pempt. 92. Meliſſa Moluccana, odorata. C. B. P. 229. Meliſſa lævis Moluccana Munt. Phytogr. Fig. 217. Molucca I. B. 3. p. 2. 234. In hortis floret Jul. & Aug.

PSEVDO-DICTAMNVS acetabulis moluccæ C. B. P. 222. In hortis Curioſorum floret Jun. & Jul.

PSEVDO-DICTAMNVS verticillatus, inodorus C. B. c. l. Dictamnum adulterinum, quibusdam, verticillatum, vel potius gnaphalium veterum I. B. 3. p. 2. 255. In hortis floret Jul. & Aug.

MENTHASTRVM folio rugoſo, rodundiore, ſpontaneum, flore ſpicato, odore gravi I. B. 3. p. 2. 219. Mentha ſylveſtris, rotundiore folio C. B. P. 227. Ad ſcrobes um Bothfeld, und in der Pfaltz überall, floret Jun. & Jul. Ab hac nonniſi cultura differt

MENTHASTRVM ſpicatum, cultum, foliis rotundiore rugoſo, I. B. Mentha rotundifolia, ſpicata, altera C. B. c. l. Siſymbria, mentha agreſtis Lobel. icon. 508. Interdum foliis variegatis variat, quæ

MEN-

MENTHASTRVM ſpicatum, folio criſpo rotundiore, colore partim cinereo vel virente I. B. 3. p. 2. 219. Menthaſtrum anglicum Riv. Mentha ſpicata, folio variegato C. B. In horto medico floret Jul.

MENTHASTRVM ſpicatum, folio longiore, candicante I. B. Ad ſcrobes & loca uligine madentia ſepium floret Jun. Jul. & Aug.

MENTHA paluſtris, folio oblongo C. B. P. 228. Menthaſtri aquatici genus hirſutum, ſpica latiore I. B. 3. p. 2. 222. Calamintha tertia Dioſcoridis Lobel. icon. 510. In riguis vor den Rauhenthale, floret Jul. & Aug.

MENTHA ſylveſtris, longioribus, nigricantibus, & minus incanis foliis C. B. c. l. Mentha ſpicata folio longiore, acuto, glabro, nigriori I. B. an der Leiter, und hin und wieder in Gärten, floret Jul. & Aug.

MENTHA rotundifolia, criſpa, ſpicata C. B. P. Mentha altera Dodon. Pempt. 95. Krauſemüntze. In hortis paſſim floret Jul. & Aug.

MENTHA rotundifolia, paluſtris, ſeu aquatica, major C. B. P. 227. Mentha aquatica, ſive ſiſymbrium I. B. 3. p. 2. 223. Chabræi p. 215. Mentha ſpicata Rivini. Calamintha aquatica, calamenthum aquaticum Tabern. icon. 353. Bach-Müntze, Kröten-Müntze, Kröten-Balſam. In ſcrobibus & torrentibus frequens, floret Jul. & Aug. v. g. wo man nach Ziegenhayn zu dem Fürſten-Brunnen gehet.

MENTHA arvenſis, verticillata, hirſuta I. B. 2. p. 2. 217. Calamintha arvenſis, verticillata C. B. P. 229. Calamintha arvenſis I. Tabernæm. icon. 352. In agris præcipue humidioribus, & in locis ubi per hyemem aquæ ſtagnarunt; occurrit & quandoque multo major & altior in ſcrobibus. Floret cum præcedentibus.

PVLEGIVM latifolium C. B. P. 222. Mentha aquatica, ſeu pulegium vulgare Tournefort. Inſtit. 189. Poley. In hortis floret Jul. & Aug. Spontaneum eſt prope Wittebergam in lacuſtribus & paludoſis pratis & paſcuis anſerum zwiſchen den Elb-Thor, und dem Fähr-Hauß. Flore albo quandoque variat.

PVLEGIVM anguſtifolium C. B. c. l. Mentha aquatica, ſaturejæ folio Tournefort. Inſtit. p. 190. Pulegium cervinum, anguſtifolium I. B. 3. p. 2. 257. In hortis floret cum præcedente, ſed rarius eſt multo.

MARRVBIASTRVM ſideritidis folio, caliculis aculeatis, flore flavo, nigro-purpureo, capite medio croceo Column. p. 1. 196. In hortis Jun. & Jul.

MARRVBIASTRVM cardiacæ folio Bocconis Muſ. Part. 2. Tab. 98. & Tournef. Provenit copioſiſſime in paludoſis circa Wittebergam, nec non interdum ſcrobibus zwiſchen Naumburg und Leißnig; floret Jul. & Aug. Vel ex hac ſola planta agnoſcere quivis poteſt Germanorum Botanicorum ſcordiam, dicam an invidiam; ſiquidem hæc planta juxta Wittebergam paſſim proveniat, licet Celeberr. Botanicorum vel quaſi coryphæo Rivino in ſuo ordine plantarum flore irregulari monopetalo gaudentium, hactenus quod noverim non ſit depicta.

LYCOPVS paluſtris, glaber Tournefort. Inſtitut. 191. Pſeudo-marrubium Rivini. Marrubium aquaticum quorundam I. B. In ſcrobibus frequens floret Junio, Julio & Auguſto; Foliis hirſutis, nec non in profundas lacinias diviſis, variat.

BETONICA purpurea C. B. P. 235. Betonica vulgaris purpurea I. B. 3. 302. In pratis, præcipue ſiccioribus, auf der Tannig-Wieſe und auf dem Forſte, auch in dem Hölzgen bey Cloſewitz und Iſerſtädt, item auf dem Cunitzer-Berge, floret Junio, Julio & Auguſto. Betonien, braune Betonien, Batenige.

BETONICA alba C. B. P. 235. Betonica flore albo I. B. Cum præcedente, præcipue hinter Schlefreiſen.

SIDERITIS flore albo, barba luteola Rivini. Betonica arvenſis, annua, flore ex albo flaveſcente Tournefort. Inſtit. p. 203. Sideritis arvenſis, latifolia, glabra C. B. P. 233. Sideritis glabra, arvenſis I. B. 3. 427. Chabr. 473. Alyſſum majus Tabern. icon. 541. Inter ſegetes, in montoſis & lapidoſis frequens floret tota æſtate.

SIDERITIS perennis ſupina. vid. Cluſ. Hiſtor. pannon.

non. in arenoſis bey Wittenberg an der Elbe hinunter nach Coßwick zu floret æſtate & autumno.

SIDERITIS flore luteo Rivini & officinarum. Sideritis pratenſis, vulgatiſſima. Sideritis foliis hirſutis profunde crenatis C. B. P. 233. In pratis paſſim floret Junio & Julio; Vulgo Zeißgen-Kraut, Beruff-Kraut vocant.

BVGVLA Dodon. Pempt. 135. Conſolida media, pratenſis, cœrulea C. B. P. 260. Conſolida media, quibusdam bugula I. B. 3. 430. Germ. Günßel, Günſel. In pratis & pomariis frequens v. g. im kleinen Paradieße, floret Majo; Flore albo, vel cinereo, & carneo variat, de qua poſteriore videatur Cluſius, quam Tournefortius immerito pro varietate ſequentis montanæ villoſæ habuit.

BVGVLA montana Rivini. Bugula ſylveſtris villoſa, flore cœruleo Tournefort. Inſt. 209. Conſolida media Genevenſis I. B. 3. 432. Conſolida media pratenſis, hirſuta H. R. Pariſ. In aſperis, apricis, gramine tenui veſtitis floret Majo; Et hæc flore albo pariter atque ſuave rubente variat.

MARRVBIVM album, vulgare C. B. P. 209. Marrubium album I. B. Marrubium, ſive Praſium album Tabernæm. icon. 539. Ad ſepes & vias publicas paſſim floret Jun. Jul. & Aug. weiſſer Andorn.

MARRVBIVM album anguſtifolium, bey Erdeborn und Helffta, floret cum vulgari.

MELISSA hortenſis C. B. P. 229. Meliſſa vulgaris, odore citri I. B. 3. p. 2. 232. In hortis floret Julio. Meliſſe, Mutter-Kraut, Citronen-Kraut.

MELISSOPHTLLVM Rivini. Meliſſa humilis, latifolia, maximo flore, purpuraſcente Tournefort. Inſtit. 193. Meliſſa Tragi 12. Lamium montanum, meliſſæ folio C. B. P. 231. Meliſſa adulterina quorundam, amplis foliis & floribus non grati odoris I. B. 3. p. 2. 233. Meliſſa Fuchſii Lobel. icon. 515. In altioribus montibus v. g. auf dem Tautenburgiſchen Forſte, floret Majo & Junio. Flore variat albo, & barba rubra ornato, de quo vid. Cluſius in hiſt. pannon.

CALAMINTHA vulgaris, vel officinarum. Germaniæ C. B. P.

C. B. P. 228. Calamintha flore magno, vulgaris I. B. Calamintha montana Dodon. Pempt. 98. In hortis Curioſorum floret æſtate. Berg-Müntze, wilder Poley ꝛc.

CALAMINTHA pulegii odore, ſive Nepeta C. B. P. Calamintha flore minore, odore pulegii I. B. 3. p. 2. 229. Pulegium ſylveſtre, ſive Calamintha altera Dod. Pempt. 98. Calamintha arvenſis 2. Tabern. In hortis cum præcedente.

CALAMINTHA incana, ocymi foliis C. B. c. l. Calamintha folio & flore, parvo, in cana I. B. 3. p. 2. 236. Calamintha II. incana Lobel. icon. 514. Im Fürſten-Garten floret Jul. & Aug.

CHAMÆCISSVS Rivini; Hedera terreſtris ejusdem, & officinarum. Calamintha humilior, folio rotundiore. Tournefort. Inſtit. 194. Hedera terreſtris, vulgaris C. B. P. 306. Donner-Reben, Gundermann, Ad ſepes & in pomariis paſſim Majo & Aprili; Magnitudine vatiat, pro loci natalis diverſitate, ſed non differt, teſte D. Rivino in Ord. Plant. fl. irreg. monop. Hederæ terreſtri aliquando adnaſcitur tuberculum quoddam galliforme, ab inſecti punctura, uti reliqua hujus generis, ortum, quod diſſectum vermiculos ab inſecti ovulis ortos continere deprehenditur; hujus figura vid. in Pancovii herbario portatili.

CHAMÆCISSVS flore purpureo. Hedera terreſtris, vulgaris, flore purpureo H. R. Pariſ. cum præcedente v. g. bey Schleſreiſen. Variat & hæc magnitudine pro loci natalis diverſitate:

CLINOPODIVM origano ſimile, elatius C. B. P. 225. Clinopodium quorundam, origani facie I. B. 3. p. 2. 250. Ad ſepes, in ſylvis, dumetis & vineis floret Junio & Julio. Wirbel-Doſten. Variat verticillis pluribus vel paucioribus.

ACINOS Rivini. Acinos multis I. B. 3. p. 2. 259. Ocimum ſylveſtre, acinos Dodon. Pempt. 280. Clinopodium montanum C. B. P. 225. In vineis frequens, & agris arenoſis ſterilibus, floret Jun. & Jul. Flore albo aliquando variat.

ROS-

ROSMARINVS hortenſis, anguſtiore folio *C.B.P.* 217. Roſmarinus coronarius, fruticoſus, ſive nobilior, anguſtiore folio I. B. 2. 15. λιβανώτις τεφανωματική Dioſcoridis ab odore thuri ſimili. Roſmarinum coronarium Dodon. In hortis paſſim floret Jun. & Jul. Roßmarin.

ROSMARINVS hortenſis, anguſtiore folio, argenteus H. R. Pariſ. cum præcedente.

ROSMARINVS ſpontaneus, latiore folio *C.* B. Rosmarinus coronarius, fruticoſus, ignobilior I. B. 2. 15. cum præcedente.

ROSMARINVS folio variegato. Tournefort. Inſtitut. Roſmarinum ſtriatum, ſive aureum Parkinſ. Theatr. 74. cum præcedentibus.

SATVREJA ſativa. I. B. 2. 272. Satureja hortenſis, ſive Cunila ſativa Plinii *C.* B. P. 218. Satureja Dod. In hortis paſſim floret æſtate. Saturey, Zatrey.

THTMVS vulgaris folio latiore, *C.* B. P. 219. Thymum durius. Dod. Pempt. 276. Thymian. In hortis paſſim floret Jun. & Jul. Thymian.

SERPILLVM vulgare, majus, flore purpureo & albo. *C.* B. P. 220. Ad ſepes & in vineis frequens floret Maj. Jun. & Julio.

SERPILLVM vulgare, minus *C.* B. P. 220. Serpillum vulgare I. B. 3. p. 2. 269. Flore purpureo, & albo etiam variat. Germ. Quendel, Quenelchen, Feld-Quendel, Feld-Kümmel. In ericetis & formicarum acervis paſſim juxta vias floret Jun. Jul. & Aug. Interdum flore albo occurrit.

SERPILLVM citratum Rivini & Tabernæm. icon. 360. Serpillum foliis citri odore *C.* B. P. 220. In acclivibus juxta vias publicas, zwiſchen Lobaba, und der neuen Schenke, & alibi floret cum præcedentibus.

SERPILLVM anguſtifolium, hirſutum, *C.* B. c. l. Serpillum anguſto, lanuginoſoque folio I. B. Serpillum Pannonicum III. Cluſ. Hiſt. 360. In apricis, aſperis, meridiei expoſitis floret tota æſtate v. gr. auf den Fuchs-Berge.

SER-

SERPILLVM hirſutum latifolium. C. B. Pin. pag. 220. quod I. in prodromo; ad aggeres hortorum & vinearum, wo man den Fuß-Pfad nach dem Rauhenthale gehet, floret Jul.

THTMBRA hiſpanica, majoranæ folio. Tournefort. Inſtit. 197. Sampſuchus, ſive Majorana, maſtichen redolens C. B. P. 224. Clinopodium quibusdam, Maſtichina Gallorum I. B. 3. p. 2. 243. vulgo marum verum. In hortis floret æſtate; Confundi vero minime debet cum maro Cortuſi, quod ſuperius ſuo loco recenſuimus inter flores barbatos tantum.

LAVANDVLA latifolia C. B. P. 216. Pſeudonardus, quæ lavandula vulgo I. B. 3. 281. Spica officinarum, Spick, Spicanard. Ex hac planta paratur oleum ſpicæ, quod ſingulari virtute pollere creditur ad gummi Copal reſolvendum pro vernice. In hortis variis floret æſtate; Flore albo quandoque variat.

LAVANDVLA anguſtifolia C. B. P. 216. Lavandula altera Dodon. Pempt. 273. Lavendula officinarum Germ. Lavendel; Et hæc flore albo variat; In hortis frequens occurrit & floret æſtate cum præcedente.

LAVANDVLA folio diſſecto C. B. P. 216. Lavandula multifido folio I. B. 3. 181. Cluſii Hiſtor. 345. In hortis floret æſtate & autumno; Flore albo variat.

STOECHAS folio ſerrato C. B. P. 216. Stœchas ſerrato & criſpo folio I. B. 3. 279. Stœchas criſpo folio Cluſii Hiſt. 345. Lavendula foliis crenatis Tournef. Inſt. pag. 198. In hortis floret Iul. & Aug.

STOECHAS purpurata C. B. P. 216. Stœchas arabica vulgo dicta I. B. 3. 277. Stœchas brevioribus ligulis Cluſ. Hiſt. 344. In hortis quandoque occurrit, ſata ex ſeminibus in officinarum capitulis Stœchadis arabicæ obviis, vid. Camerarius in ſuo Matthiolo cap. XXVII. p. 338. floretque Iul. & Aug.

MAJORANA vulgaris C. B. P. 244. Majorana majori folio, ex ſemine nata I. B. 3. p. 2. 241. In hortis paſſim floret Auguſto; Semina vero hic terrarum raro perficit Majoran, Meiran.

MA-

MAJORANA rotundifolia, villoſa, ſaturejæ odore Tournefort. Inſtit. In hortis Sereniſ. Principis.

MAJORANA rotundifolia, ſcutellata, exotica H.R. Pariſ. Majorana rotundifolia, cochleata, radice perenni Jonequet. Hort. Origano cognata Zatarendi C. B. P. 223.

MAJORANA tenuifolia C. B. P. 224. Majorana tenuior & lignoſior I. B. 3. p. 2. 241. In hortis.

ORIGANVM ſylveſtre, cunila bubula Plinii C.B.P.223. Origanum vulgare ſpontaneum I. B. 3. 236. Origanum ſylveſtre Dodon. Pempt. 285. In vineis & ſylvis paſſim floret Iun. & Iul. flore albo, quandoque variat. Doſten, Wohlgemuth, Drant.

ORIGANVM heracleoticum, culina gallinacea Plinii C. B. P. Origanum heracleoticum I. & II. Tabernæm. icon. 345. In hortis ubi Winter-Majoran vocant, floret Iul.

ORIGANVM folio ſubrotundo C. B. c. l. Origanum Monſpelienſe, pulchrum Camerar. Epitom. 468. In aſperis & apricis quandoque floret cum vulgari.

ORIGANVM fruteſcens oblongo folio. In horto Medico & Seren. Principis floret Iul.

DICTAMNVS Creticus offic. rechter Diptam aus Candia. In hortis Curioſorum floret Aug.

NEPETHA Rivini. Cataria Tournefortii. Menthà cataria vulgaris & major C. B. P. 228. Cataria herba Dodon. Pempt. 99. auf der Inſul, und nach der Papier-Mühle hin, floret Iul. & Aug. Germ. Katzen-Kraut, Katzen-Müntz.

VERBENA communis cœruleis & albidis floribus C.B. P. 269. Verbena vulgaris I. B. 3. 443. Verbena recta Dodon. Pempt. 150. Ad ſepes & vias publicas paſſim floret Iul. & Auguſto. Eiſenhart, Eiſen-Kraut, Tauben-Kraut.

HYSSOPVS officinarum cœrulea, ſeu ſpicata. C. B. P. 217. In hortis, & muris urbis nec non cœmeterii frequens, floret tota æſtate. Yſop, Eiſopen.

HYSSOPVS vulgaris, alba C. B. P. 218. Hyſſopus albis floribus Lobelii Icon. 435. Cum præcedente.

HYSSO-

HYSSOPVS rubro flore C. B. P. 217. Hyſſopus Arabum flore rubro Lobel. c. l. cum præcedentibus.

III. Seminibus tectis capſula.

(1.) SIMPLICI.

PINGVICVLA Geſneri, ἰόνυγος ejusdem. Sanicula montana flore calcari donato C. B. P. p. 243. In pratis udis bey Arnſtadt, nach der Fürſtin Hauß, & in paſcuis montoſis floret Majo & Aprili. Flore albo, variat, ſed rarius, de quo vid. C. Cluſ. Pan. p. 360. & J. Rajus in hiſt. plant. univerſa i. NB Hujus plantæ flos eſt calcari donatus, adeoque nomen irregularis meretur, non ſecus ac Phu.

LENTIBVLARIA Geſneri & Rivini Millefolium aquaticum, lenticulatum C. B. P. 141. Fœniculum aquaticum, galericulatum Tabernæmontani. Millefolium aquaticum, flore galericulato Lobel. In ſtagnis & putridis ſcrobium aquis v. g. in piſcinis bey Schieben, auch in lacuſtribus bey der frölichen Wiederkunfft, item bey Schlefreiſen, magnitudine variat; Rivinus huic plantæ ſemen unicum tribuit, Knauthius vero plurima, minutiſſima, intermedio ſtilo nutritivo adnata floret Iulio.

OROBANCHE major, caryophyllum olens C. B. P. 87. Orobanche flore majore I. B. 2. 780. Limodorum, ſive Orobanche Dodon. Pempt. 552. Flore & caule luteo, & fuſco paſſim variat. In montibus tenui gramine obſitis v. g. auf dem Gleißberge, und auf denen dürren Wieſen nach Cunitz hin unter dem Jentzig. Floret Majo & Jun.

OROBANCHE ramoſa, floribus cœruleis C. B. P. 88. Inter cannabim in arvis v. g. bey Wöllnitz im groſſen Paradieß, floret Julio & Aug. Thuringiæ aliqui agricolæ Hanffmähgen vocant; Floribus quandoque purpureis nec non albis variat; hinc

OROBANCHE minor, purpureis floribus, ramoſa Chabræi p. 257. cum præcedente. NB Orobanches ſpeciebus aliqui adnumerant hypociſtin, ſed male, ſiquidem hæc planta genus ſeparatum ab orobanche conſtituat; vid.

Came-

Camerar. Epit. Matthiol. & Tournefort. Corollar. ad Inſtitut. rei herbariæ.

SQVAMARIA Rivini. Anblatum Tournefortii in generibus plantarum recens inſtitutis pag. 48. ubi a vocibus germanicis ohne i. e. ſine, & Blat folium (quaſi plantam foliis carentem diceres) potius ohnblatum dici debere judicat. Squamaria Loniceri. Dentaria major Matthiol. Orobanche radice dentata major C. B. P. 88. Germ. Schuppen-Wurtz, Anblat, Freiſam-Kraut, St. Georgen-Wurtz. vid. Camer. p. 415. In nemoribus auf dem Cunitzer Berge und im Rauhenthale, auch hinter den Fürſten-Brunnen zur rechten Hand, floret Aprili. Quæritur an Orientalis anblati ſpecies, quam Tournefortius l.c. recenſet, differat a noſtra? nam & C. B. in Pin. l. c. duas ſpecies refert. Vid. & Scheutzer. Itin. alpin.

(2) CAPSVLA BIPARTITA.

MELAMPTRVM purpuraſcente coma C. B. P. 234. Melampyrum multis, ſive triticum vaccinum I. B. 3. 493. Triticum vaccinum Dodon. Pempt. 541. Inter ſegetes frequens, floret Jun. Jul. & Aug. quandoque & coma alba variat. Germani vocant. Wachtel-Weitzen. Hujus ſemen frumentis permiſtum, farinam cœruleo colore inficit, unde agricolis odioſa eſt hæc planta.

MELAMPTRVM ſylvaticum Rivini. Melampyrum cœrulea coma C. B. P. Parietaria Lipſienſium Tragi. In ſylvis paſſim floret tota æſtate; Hæc flores habet aureos violaceis comæ foliis eleganti ſpectaculo interjectos; quandoque & folia comæ alba ſunt; flores tamen aurei, uti in violacea coma. An circæa Dioſcoridis? ob hanc colorum miſcellam Germanis Tag und Nacht dicitur, oder Kuh-Weiden, quia vaccæ hæc planta delectantur. it. Kuh-Weitzen. Aliqui peſſimo errore, tam latina, quam germanica nomina hujus plantæ & Parietariæ officinarum confundunt.

MELAMPTRVM montanum Rivini. Melampyrum luteum, latifolium C. B. P. 234. Parietaria ſylveſtris II. Cluſii Pannon. & Hiſtor. Plantar. Rar. Milium ſylvati-

cum I. & II. Tabern. In montoſis ſylvis v. g. auf der Wellmeſe floret tota æſtate. Wald-Hirſe.

MELAMPTRVM criſtatum Rivini & I. B. 3. 440. Melampyrum luteum anguſtifolium C. B. P. 234. Melampyrum luteum, linariæ folio Prodr. 112. Auf der Wellmeſe, und auf dem Forſte floret Jul.

ODONTITES Rivini & Tabernæm. icon. 242. Pedicularis ſerotina, purpuraſcente flore Tournefort. Inſtitut. 172. Euphraſia pratenſis rubra C. B. P. 234. Euphraſia parva, purpurea I. B. 3. 433. Euphraſia altera Dodon. Pempt. 55. In paſcuis & ſubudis juncetis floret Julio & Aug. Quandoque etiam flore albo variat.

ODONTITES flore luteo Tabernæm. & Rivini. Pedicularis ſerotina, lutea Tournefort. Inſtit. 172. Euphraſia pratenſis lutea C. B. P. 234. Coris monſpeſſulana lutea I. B. 3. 433. Euphraſia ſylveſtris major, lutea, anguſtifolia Column. Ecphraſ. In apricis, aridis, ſaxoſis, & tenui gramine veſtitis locis variorum montium, v. g. hinter Ziegenhayn, und zwiſchen dem Rauhenthale und Cluſewitz, floret Aug. & Sept.

CRISTA GALLI major, & elatior, calice floris hirſuto, rictus limbo violaceo. Pedicularis pratenſis lutea, erectior, calice floris hirſuto Tournefort. Inſtit. 172. Criſta galli mas I. B. 3. 436. Hahnen-Kamm. Floret Jun. Jul. & Aug. in paſcuis & pratis, ſæpe etiam inter ſegetes, ubi pariter agricolis odioſa eſt, quia farinam cœruleo colore inficere creditur. Germ. Glitſch.

CRISTA GALLI pratenſis, humilior, coma fuſca. Criſta galli fœmina I. B. 3. 436. Pedicularis pratenſis lutea, vel criſta galli C. B. P. 163. cum præcedente.

CRISTA GALLI, anguſtifolia, montana, ſerotina. Criſta galli anguſtifolia, montana C. B. P. p. 86. In montoſis ſylvis bey Jena-Prießnitz, und der Wellmeſe floret Julio & Aug.

PEDICVLARIS major. Pedicularis paluſtris, rubra, elatior Raji Hiſtor. 770. Circa ſtagna & in pratis uliginoſis cum linagroſti v. g. zwiſchen Wöllnitz und dem Fürſten-Brunnen, floret Majo & Jun.

PEDI-

PEDICVLARIS humilior. Pedicularis pratenſis purpurea C. B. P. 163. Pedicularis quibusdam, criſta galli flore rubro & albo Chabr. 476. In paſcuis nach Ruttersdorff und Städtgen Rode, floret cum præcedente.

EVPHRASIA officinarum C. B. P. 233. Euphraſia I. B. 3. 432. Dodon. Pempt. 54. Augen-Troſt. In pratis montoſis v. g. auf der Wellmeſe und auf dem Forſt, floret Auguſto.

EVPHRASIA ramoſa, pratenſis, flore albo Eyſtett. Cum præcedente.

EVPHRASIA minus ramoſa, flore ex cœruleo purpuraſcente. Cum præcedentibus.

VERBASCVM mas, latifolium, luteum C. B. P. Verbaſcum vulgare, flore luteo, magno, folio maximo I. B. 3. App. 871. Verbaſcum latius Dodon. Pempt. 143. Woll-Kraut, Königs-Kertze, Fackel-Kraut. Ex hujus floribus aliqui oleum quoddam per putrilaginem elicere conantur multi uſus, quod tamen olei nomen non magis merebitur quam folia hyoſc. laudantur a multis contra dyſenteriam. In aſperis v. g. nach der Wellmeſe zu floret Jul. & Aug.

VERBASCVM nigrum, flore ex luteo purpuraſcente C. B. P. 240. Verbaſcum nigrum, flore parvo, apicibus purpureis I. B. 3. App. 873. Verbaſcum nigrum Dodon. In ſalicetis & ad rivulorum margines auf der Inſul, wird auch zuweilen in Wäldern gefunden v. g. im Coſpidaiſchen Holtze floret Jul.

VERBASCVM nigrum, floribus albicantibus bey denen Teichen zu Schleben cum priori.

VERBASCVM anguſtifolium, ramoſum, flore aureo, folio craſſiore I. B. Verbaſcum foliis viridibus, craſſioribus Moriſ. Hiſtor. 488. In muris & vineis paſſim, floret Jun. & Julio. v. g. hinter dem Collegio im Stadt-Graben, auch hinter D. Förtſchens Hauſe und dem Fecht-Boden.

BLATTARIA lutea, folio oblongo, laciniato C. B. P. 240. Blattaria Dodon. Pempt. 145. Germ. Schaben-Kraut, Gold-Knöpffgen, wächſt wild bey Wittenberg an der Elbe. In hortis floret tota æſtate.

BLATTARIA flore purpureo &
BLATTARIA flore albo cum præcedente.

SCROPHVLARIA nodoſa, fœtida *C. B.* P. 235. Scrophularia vulgaris & major I. *B.* 3. 421. Scrophularia Dodon. Pempt. 50. Braun-Wurtz, oder ſchwartzer Nacht-Schatten, Knoten-Kraut. Ad ſepes & in dumetis paſſim, floret tota æſtate; Foliis & caulibus hirſutis quandoque variat.

SCROPHVLARIA aquatica major. *C. B.* P. 5. 235. Scrophularia maxima, radice fibroſa I. *B.* 3. 421. Betonica aquatica Dodon. Pempt. 50. Germanis Waſſer-Betonien, oder weiſſer Nacht-Schatten. Ad rivulos v. g. zwiſchen dem Fürſten-Brunnen und Wöllnitz, floret tota æſtate.

SCROPHVLARIA ſambuci folio, flore magno & ſpecioſo. Sideritis ſambuci folio Alpin. exot. in hortis Curioſorum floret æſtate.

SCROPHVLARIA flore luteo *C. B.* P. 236. Prodr. 112. Scrophularia lutea, magna, ſimplis foliis I. *B.* 3. 422. In hortis floret Aprili & Majo.

SCROPHVLARIA folio urticæ *C. B.* P. 236. Scrophularia flore rubro Camerarii I. *B.* 3. 422. Scrophularia peregrina Camerar. Hort. Tab. XLIII. & Epit. Matthiol. p. 397. In horto medico floret Jun. & Jul.

ANTIRRHINVM vulgare I. *B.* 3. 462. Antirrhinum majus, alterum, folio longiore *C. B.* P. 211. In hortis paſſim, ubi floris colore variat, floretque tota æſtate.

ANTIRRHINVM arvenſe majus *C. B.* P. 212. Antirrhinum anguſtifolium, ſylveſtre. I. *B.* Antirrhinum ſylveſtre, Phytevma Dodon. Pempt. 182. Hundes-Kopf, Dorant, Kalbs-Naſe. In arvis inter ſegetes v. g. nach Wöllnitz hin, floret tota æſtate; Flore albo quandoque variat, quod ANTIRRHINVM arvenſe majus, flore albo H. R. Pariſ. dictum fuit:

LINARIA valentina Cluſ. Hiſp. 351. Linaria triphylla, minor, lutea C. B. P. 212. Linaria trifolia I. B. 3. 458. In hortis floret æſtate.

LINARIA officin. Linaria vulgaris, lutea, flore majo-

re

re C. B. Pin. p. 212. Oſyris major Tabern. Linaria I. Dodon. Pempt. Germ. Lein-Kraut, Flachs-Kraut, Harn-Kraut, ad ſepes, & in agrorum, vinearumque limitibus juxta ſcrobes & ſemitas frequens floret Jul. & Aug.

LINARIA triphylla. cœrulea *C. B.* P. 212. Linaria cœrulea apula. Column. In agris zwiſchen der neuen Schencke und Laaßdorff, floret æſtate. Ab hac vix, & ne vix quidem differt Linaria arvenſis cœrulea *C. B.* P. 213. nec non Linaria arvenſis violacea *C. B.* P. 213.

LINARIA pumila, vulgatior, arvenſis Tournefort. Inſtit. p. 169. Antirrhinum arvenſe minus C. *B.* P. 212. Antirrhinum minimum I. *B.* 3. 465. In agris paſſim, pariter atque muris & vineis floret tota æſtate.

CYMBALARIA floſculis purpuraſcentibus I. *B.* 3. 685. Cymbalaria Italica, folio hederaceo Lobel. icon. 615. Naſcitur paſſim in muris circa Jenam, quo *B.* Rolfincius ex Italia attulit Cymbel-Kraut.

ELATINE folio ſubrotundo C. *B.* P. 252. Elatine mas, folio ſubrotundo I. *B.* 3. 372. Veronica fœmina Fuchſii, ſive Elatina Dodon. 42. In agris nach Zwetzen und dem Rauhenthal hin, floret tota æſtate.

ELATINE folio acuminato, in baſi auriculato C. *B.* P. 253. Elatine fœmina, folio anguloſo I. *B.* 3. 372. In agris cum præcedente, ſed rarius multo nach Laaßdorff hin, iſt häuffig bey Gießen und Wittenberg in arvis, ubi rarior prior eſt ſpecies folio ſubrotundo.

VERONICA officinarum. Veronica mas ſupina & vulgatiſſima C. *B.* P. 246. Veronica vulgatior, folio rotundiore I. *B.* 3. 282. Ehrenpreiß. In ſylvis paſſim & quercetis floret Jun. & Jul.

VERONICA ſupina, teucrii folio Tournefort. Chamædryi ſpuriæ affinis rotundifolia, ſcutellata C. B. P. 249. Alyſſum Dioſc. montanum Colum. P. 1. 286. In nemoribus bey Scheits, und häuffig in denen Wäldern zwiſchen Freyenſen und Mühlſtein floret Majo & Jun.

VERONICA minor foliis, imis rotundioribus Moriſ. Chamædrys ſpuria, minor rotundifolia C. B. Teucrium ſupinum pratenſe & ſpurium, chamædryoides Lobel

icon. 401. In pratis paſſim floret Majo & Jun. magnitudine variat.

VERONICA ſupina, facie teucrii pratenſis Lobel 473. Chamædrys ſpuria major anguſtifolia C. B. P. 249. In pratis & ſylvis frequens Junio & Julio. Hæc planta foliorum latitudine mirum variat, de quo vid. Cluſ. Pannon.

VERONICA anguſtifolia, ſcutellata. Anagallis aquatica Chabræi, cujus elegantem figuram in App. exhibet. Anagallis aquatica, anguſtifolia, ſcutellata C. B. P. 252. & Pr. In ſylvis udis bey Overl und Gangelvorff: item bey Kleine floret Jul & Aug.

VERONICA foliis rutæ Rivini: Veronica verna, trifido vel quinquifido folio Tournefort. p. 145. Alſine triphyllos cœrulea C. B. In agris paſſim Aprili floret. Händ-lein-Kraut.

VERONICA foliis cymbalariæ Tournefort. Alſine hederulæ folio C. B. Alſine ſpuria prior, ſive morſus gallinæ Dodon. Veronica folio hederulæ Riv. cum præcedente paſſim.

VERONICA foliis chamædryos Riv. Alſine chamædrifolia, floſculis pediculis oblongis inſidentibus C. B. P. 250. Alſine ſerrato folio, glabro. I. B. 3. 360. In agris cum præcedentibus; Floris colore variat, qui modo totus cœruleus, aliquando tres laciniæ albicant, quarta vero eſt cœrulea, aliquando vero totus flos eſt niveus.

VERONICA foliis chamædryos altera, nondum deſcripta. Differt a præcedente non ſolum floris colore, qui eſt totus cœruleus, ſed foliorum minus diſſectorum elegantibus crenis. Provenit in agris nach Cluſewitz und Prieſe-nitz hin. Floret Aprili & Majo.

VERONICA floſculis cauliculis adhærentibus Moriſ. Hiſt. Oxon. P. 2. 322. Alſine veronicæ foliis, floſculis cauliculis adhærentibus C. B. Paſſim ad ſepes in apricis & aſperis floret Aprili & Majo.

VERONICA ſpicata, latifolia C. B. Veronica major, latifolia, foliis ſplendentibus & non ſplendentibus I. B. 3. 283. Veronica I. erectior, latifolia Cluſ. Hiſt. 346. Im Fürſten-Garten floret Iun. & Iul. Cluſius in Pannon. hujus

jus & alteram ſpeciem obſervavit, foliis minime ſplendentibus, neque adeo atris, ac in præcedente; quæ ſpecies copioſa eſt in pratis prope Gieſſam, Lipſiam & Wittebergam; v. g. bey Wittenberg auf denen Bleſerſchen Wieſen; bey Leipzig auf denen Wieſen nach Gonnewitz; bey Gießen auf denen Wieſen nach dem philoſophiſchen Wäldgen zu, & floret Iun.

VERONICA ſpicata anguſtifolia; in denen Heiden zwiſchen Kämberg und Düben, auch auf dem Apollens-Berge bey Wittenberg floret æſtate.

VERONICA americana, erecta, fruteſcens, & ramoſa folio verbenæ. Veronica americana erecta Parad. Bat. 241. In horto medico & S. Principis floret Iul. Flores habet albos

VERONICA pratenſis, ſerpillifolia C. B. P. 247. Veronica fœmina quibusdam, aliis Betonica Pauli ſerpillifolia I. B. 3. 285. Veronica pratenſis Dodon. Paſſim in pratis & pomariis bey Löbſtädt floret Majo.

BECCABVNGA officinarum. Veronica aquatica major, folio ſubrotundo C. B. P. 252. Paſſim in ſcrobibus & ad rivulos floret tota æſtate. Bach-Bungen. Flore carneo variat bey Wöllnitz und bey der Leiter nach der Purſchen-Schantze zu.

BECCABVNGA minor, folio ſubrotundo. Veronica aquatica minor, folio ſubrotundo C. B. bey der vorigen paſſim.

BECCABVNGA folio oblongo, major. Veronica aquatica major, folio oblongo Moriſon. Anagallis aquatica major, folio oblongo C. B. In iisdem cum præcedent. locis; v. g. im Stadt-Graben hinter dem Fecht-Boden.

BECCABVNGA folio oblongo, minor. Veronica aquatica minor, folio oblongo Tournefort. Anagallis aquatica minor, folio oblongo C. B. ibidem, & in uliginoſis bey der Burgauiſchen Breyhan-Schencke. Beccabunga dicitur a voce germanica Bach-Bohnen, quæ idem notat ac fabam paluſtrem, quia hujus plantæ folia, fabæ æmulantur folia.

DIGITALIS purpurea I. B. 2. 812. Digitalis purpurea, folio aſpero C. B. P. 243. Creſcit copioſe auf dem Enſels-Berge bey Waltershauſen, und bey Gießen auf

dem Dießberge. Hic vero in horto medico floret Junio. Flore albo variat. Germ. Fingerhut, Fingerhut-Kraut, a ſimilitudine floris cum digitali.

DIGITALIS lutea, magno flore *C. B.* Digitalis lutea, flore majore, folio latiore. Digitalis lutea Tabern. icon. 567. auf dem Fuchs-Berge. item im Walde über Jena, Prießnitz, und auf dem Cunitzer-Berge, floret Jun.

GRATIOLA officinarum & I. B. 3. 434. Digitalis minima, Gratiola dicta Moriſ. Hiſtor. Oxon. p. 2. 479. Gratiola centauroides C. B. P. 279. In horto medico floret Junio & Jul. Spontaneam deprehendi frequentiſſimam ad Albis ripam zwiſchen Pirna und Meißen, cum allio illo, cujus Alpinus meminit in der Meißniſchen Chronica & ex eo C. B. in Pin. Staneo Cavallo dicitur Italis, & a Germanis Gottes-Gnade.

GELSEMINVM Rivini. Bignonia americana, fraxini folio, flore amplo, phœniceo Tournefort. Gelſeminum hederaceum, indicum Cornuti 102. In hortis Curioſorum floret Autumno.

GELSEMINVM indicum tetraphyllum; cum præcedente. Moriſonus ad Apocyna refert, ſed male.

HTOSCTAMVS vulgaris vel niger C. B. P. 169. Hyoſcyamus vulgaris I. B. 3. 627. Hyoſcyamus niger Dodon. Bilſen-Kraut. Paſſim ad ſcrobes & juxta vias publicas floret Junio & Julio. Ex hujus plantæ foliis aliqui ſuccum quendam putrilaginoſum eliciunt, quem improprie oleum vocant, & contra varios dolores valde extollunt. vid. Camerar. Epit. Matthiol. p. 373. De noxa hyoſcyami miranda hiſtoria legitur in Eman. Kœnig. regno vegetabili.

HTOSCTAMVS albus, minor. C. B. P. 169. Hyoſcyamus albus vulgaris Cluſ. Hiſtor. LXXXIV. In horto medico floret Jun. & Jul.

(3.) TRIPARTITA.

ALOE officinarum. *Aloe* vulgaris. *C. B.* P. 286. *Aloe* I. *B.* 3. 696. Aloe. In hortis floret vario tempore in hybernaculis plantarum.

ALOE

ALOE africana, breviſſimo craſſioque folio, flore ſubviridi H. *A.* 2. 11. Im Fürſten-Garten. Floret ſub finem æſtatis & autumno.

ALOE africana margaritifera minor H. *A.* 2. 11. cum præcedente.

ALOE Zeilanica pumila, foliis variegatis Parad. Bot. Prodr. & H. A. 2. 41. *A*loe pumila ſerpentaria zeilanica Breyn in Prodr. cum præcedente. De aliis *A*loe ſpeciebus conſulatur Commelinus, & alii flore exoticæ ſcriptores.

RAPVNCVLVS corniculatus Rivini. Rapunculus ſpicatus *C. B.* Pin. p. 92.

RAPVNCVLVS olopecuroides longa ſpica Cluſ. hiſt. Rapunculus corniculatus Riv. qui in ſylvis circa Jenam provenit, flores habet albos vel cinericeos; qui vero in ſylvis circa Gieſſam naſcitur, flores habet coloris violacei ſaturi & elegantis; floret uterque Majo.

RAPVNCVLVS corniculatus, ſpica breviori Rivini. Rapunculus folio oblongo, ſpica orbiculari *C. B.* Pin. 92. rapuntium corniculatum montanum Columnæ. In ſylvis v. g. auf dem Forſt prope lapicidinas, auf dem ſo genannten Daxend; wird auch auf der Wellmeſe zwiſchen den Fürſten-Brunnen und Ziegenhayn gefunden; floret Majo & Junio. Flos eſt eleganter cœruleus, vel potius violaceus.

CARDINALIS Rivini. Trachelium Tournefort. vulgo flos Cardinalis. In hortis curioſorum floret tota æſtate.

GLADIOLVS germanicus, floribus uno verſu diſpoſitis. *C. B.* Victorialis rotunda officinarum. In hortis paſſim floret tota æſtate.

CANNACORVS Tournefort. Canna indica Rivini. In hortis.

CANNA indica flore luteo, punctato, cum præcedente floret *A*uguſto & ſeptembri.

(4) QVADRIPARTITA.

VITEX Rivini. *A*gnus caſtus officinarum. In hor-

ro medico und im Fürſten-Garten floret *Aug.* Keuſch-Lamm, Mönchs-Pfeffer.

(5) SEXPARTITA.

ARISTOLOCHIA rotunda, flore ex purpureo nigro *C. B. Ariſtolochia rotunda I. B.* 3. 559. Oſterlucey. Im Fürſten-Garten floret Majo.

ARISTOLOCHIA multiflora Riv. *Ariſtolochia clematitis, recta C. B. Ariſtolochia Saracenica Dod. Pempt.* 326. In hortis paſſim & vineis, floret æſtate.

ARISTOLOCHIA cretica Riv. *C. B. Ariſtolochia piſtolochia altera I. B.* 3. 563. In horto medico floret Majo & Junio.

IV. Seminibus tectis bacca.

(1) MONOPYRENA.

CAMARA Riv. Pſeudo-viburnum americanum ejusdem. Camaratinga Piſonis. In hortis paſſim floret Junio & Julio; Floris colore miruni variat, quin & aliquando ſpinas gerit in caulibus.

(2) POLYPYRENA.

PERICLTMENVM vnlgare germanicum. Caprifolium germanicum Dodon. & Tournefort. Periclymenum non perfoliatum *C. B.* P. 302. In horto medico, & Sereniſſ. Principis. Wächſt häuffig wild im Heſſen-Lande bey Gießen im Wäldern, v. g. in der Linder-Marck. Floret Majo & Jun. Zaun-Gilge.

PERICLTMENVM perfoliatum, ſerotinum ſpecioſius H. R. Par. Caprifolium germanicum, flore rubello Broſſardi; In horto medico floret Julio & *Auguſto*. Hæ duæ ſpecies aliquando foliis ſinuoſis inſtar foliorum quercus ludunt, non ſecus ac ſequens, unde caprifolium non perfoliatum, & perfoliatum foliis ſinuoſis apud Tournefort. Inſtit. p. 608.

PERICLTMENVM perfoliatum *C. B.* P. 302. Caprifolium

folium Italicum Dodon. Germ. je länger, je lieber. Roſe von Jericho, Speck-Lilien. In viridariis & umbraculis hortorum paſſim floret Majo.

PERICLTMENVM virginianum Rivini. Periclymenum perfoliatum, virginianum, ſemper virens & florens H. L. Bat. In horto medico floret tota æſtate.

XTLOSTEVM Rivini. Chamæceraſus Dumetorum, fructu gemino rubro C. B. P. 451. Periclymenum rectum, fructu rubro I. B. In ſepibus paſſim floret Majo.

XTLOSTEVM fructu nigro. Periclymenum rectum, fructu nigro Cluſ. hiſt. Pannon. p. 87. Periclymenum rectum ſecundum Cluſ. hiſp. p. 92. in ſepibus & dumetis, bey Eridahle am Thüringer-Walde, floret Majo & Jun.

XTLOSTEVM alpinum foliis alni Riv. Chamæceraſus alpina, fructu nigro gemino C. B. 45. wächſt an allen Hecken bey Arnſtadt.

XTLOSTEVM folio ceraſi Riv. Chamæceraſus montana, fructu ſingulari, cœruleo C. B. P. 451. & Tournefort. pag. 609. In horto medico & Sereniſſ. Principis floret Majo.

ARVM vulgare, non maculatum C. B. P. 159. Arum Tabernæm. Aron, Zehr-Wurtz, deutſcher Ingber. Im Rauhenthale und in der Zißke, it. bey Coſpida und Jena-Prießnitz floret Majo.

ARVM polyphyllum Riv. Dracuntium & Dracunculus Veterum; In hortis Curioſorum floret Majo & Jun.

ARVM maculatum, maculis nigris C. B. Cum præcedente.

ARVM maximum non maculatum. In horto medico, auch im Rauhenthale. Cum præcedente floret.

ARISARVM Rivini Dracunculus paluſtris, ſive radice arundinacea Plinii C. B. P. 193. Dracunculus aquaticus Matthioli. In ſtagnantibus putridis aquis prope Wittebergam frequens, v. g. in der Speck und im kleinen und wie auch im groſſen Luch beym Luthers-Brunnen, item in der Laußnitz, floret Jun. & Jul. NB Differt ab aro floris petalo nec convoluto nec ſurrecto, ſed plano & expanſo, colorisque lactei. Hujus præterea ſpecies datur in

Æthiopia

Æthiopia, cujus figura ſed minus artificioſa, vid. apud Comelinum hort. Amſtelodam. præfictum.

BELLADONNA majoribus foliis, & floribus Tournefort. Solanum μελανοκέρασον C. B. Solanum manicum multis, vel Belladonna I. B. Wald-Nachtſchatten, Irr-Beeren, Toll-Beeren. Creſcit in ſylvis cæduis v. g. dem Fürſten-Brunnen gegen über, und im Tautenburgiſchen Forſt, auch häuffig auf dem Cunitzer Berge, floret Majo & Jun. Hujus baccæ aliquoties variis in locis (uti id in Patria mea contigiſſe memini) pro baccis myrtilli craſſo errore venditæ fuere non ſine ſtrage vel ſaltim perturbatione mentis eorum qui comederant; vid. Fabri Strychnomania. Matthiolus teſtatur, vinum hujus radice medicatum Paraſitorum gulas conſtringere, ut illi, quantumvis famelici edere nequeant, nec cibi tantillum deguſtare, niſi aceti cochlear abſorbuerint: vid. Raj. hiſt. plant. & Hochſtatteri obſervationes de conſolidæ radice fauces conſtringente. vid. etiam Camerar. Epit. Matthioli p. 377. Pariter ac radix contra pecori morbos extollitur.

CLASSIS X.

DE PLANTIS FLORE REGVLARI TRIPETALO GAVDENTIBVS.

HArum unicum ſaltem in noſtris regionibus occurrit genus, nimirum polygala, cujus ſpecies ſunt.

POLTGALA major C. B. P. 215. Polygala vulgaris, major I. B. 3. 387. Creutz-Blümgen. Floris colore variat hinc Polygala major cœrulea, alba & purpurea Tabernæm. icon. 829. & 880. In ſylvis paſſim & ad ſepes vinearum; florent Majo & Jun.

POLT-

POLTGALA vulgaris C. B. Polygalon multis I. B. Cum præcedente; Et hæc coloris flore, non ſecus ac prior, variat, hinc & hujus tres figuræ apud Tabernæmont.

NB Ad hanc plantam, cujus fructus eſt bicapſularis & diſpermus, pariter ſpectat ANONTMVS ſ. ἀνώνυμος cognitæ flore, ſive prior Caroli Cluſii in hiſt. plant. per Pannon. naſcentium pag. 47. ſiquidem admodum genuina polygalæ ſit ſpecies, & non novum ſeu peculiare genus, ſub Tit. Polygaloides, uti vult Johrenius in ſuo Vade mecum Botanico. Vid. & Tournef. Corollar. ad Inſtit. rei herb. Iraque etiam recte huc retulit D. D. Rivinus. Vallit & vallitur autem Hermannus Berhave in ſuo Indice plantarum horti Lugduno-Batavi, dum huc refert Commelinam Plumerii h. e. Ephemerum Hermanni, (quod pariter in hortis aliquando reperitur) cum Commelinæ flos ſit irregularis tripetalus, capſula vero non bi- ſed tripartita. Provenit in montibus circa thermas Carolinas.

CLASSIS XI.

DE PLANTIS FLORE REGVLARI TETRAPETALO GAVDENTIBVS.

I. Seminibus tectis.

(1) CAPSVLA SIMPLICI.

FVMARIA Dioſc. & officinarum. Fumaria flore purpureo C. B. P. 143. Fumaria vulgaris I. *B.* 3. 101. Erd-Rauch, Tauben-Kropff, Acker-Raute, wilde Raute. In agris & vineis paſſim floret tota æſtate & autumno; flore albo quandoque variat, ut & palleſcente.

ONO-

ONOBRYCHIS foliis viciæ, fructu echinato major C. B. P. 350. Polygalon Geſneri I. *B.* 2. 335. Germ. Hahnen-Kamm, Hahnen-Kämmgen, Hahnen-Kopff. In aſperis & apricis paſſim v.g. auf den Fuchs-Berg floret tota æſtate; Floris colore quandoque variat.

ONOBRYCHIS orientalis, major, foliis villoſis. Hujus uſus ante aliquod tempus publicis, quas vocant, novellis divulgatus eſt, ſub nomine trifolii turcici; ſeritur nunc a compluribus in agris, uti apud Græcos & Romanos Medica. Hæc planta, a nemine deſcripta, differt a præcedente non ſolum foliorum latitudine & hirſutie, ſed & florum colore dilutiore magis carneo, quaſi palleſcente, vid. Les gazettes Anni 1717.

TRIFOLIVM pratenſe, purpureum *C. B.* P. 327. Trifolium pratenſe, flore monopetalo Tournefort. Trifolium purpureum, vulgare I. *B.* 2. 374. Klee, Klever, Wieſen-Klee. In pratis floret tota æſtate. Quamvis hujus flos monopetalus videatur, revera tamen irregularis & tetrapetalus eſt, non ſecus ac aliorum leguminum papilionacei flores, uti inſpicienti patebit; Flore albo variat, nec non foliis in uno petiolo quaternis, cujus repertores a ſuperſtitioſa plebe pro fortunatis prædicantur. Germ. vierblättriger Klee. Trifolium ſupinum pariter foliis quaternis & fuſcis occurrit, & Lobelio dicitur quadrifolium phæum ſ. fuſcum, quia folia ipſius (non flos, qui albus) ſunt fuſca.

TRIFOLIVM pratenſe, album *C. B.* Trifolium pratenſe album a Fuchſio depictum, ſive mas I. *B.* 2. 379. Cum præcedente.

TRIFOLIVM montanum, ſpica longiſſima, rubente C. B. P. 328. Trifolium purpureum majus, folio & ſpica longiore I. *B.* 2. 375. Lagopus major, alter Dodon. Pempt. 578. In ſylvis paſſim floret æſtate.

TRIFOLIVM anguſtifolium, flore albo Riv. Trifolium majus I. ſive albo flore Cluſ. Pannon. p. 760. Trifolium montanum, album *C. B.* P. 328. In ſylvis paſſim floret Iunio & Iulio; Trifolium majus, albo flore, incanum Cluſii I. *B.* 2. in ſylvis cum præced.

TRIFO-

TRIFOLIVM montanum, purpureum, majus C. B. P. 328. Trifolium majus Cluſii II. non album, ſed rubrum I. B. 2. 375. Cum præcedente. Huic fere ſimile ſervitur in agris ad jumentorum pabulum.

TRIFOLIVM fragiferum Friſicum Cluſ. Cur. poſt. C. B. P. 329. In pratis paſim juxta ſemitas floret autumno.

TRIFOLIVM pratenſe, flore albo, minus & fœmina, glabrum I. B. 2. 380. Trifol. ſupinum Riv. bey Gießen in pratis & paſcuis floret tota æſtate. Aliquando in pratis elatius occurrit & floribus purpuraſcentibus.

TRIFOLIVM aſphaltites ſ. bituminoſum. In hortis Curioſorum floret Jul.

TRIFOLIVM glomerulis oblongis I. B. & Chabr. in paſcuis & pratis aridioribus zwiſchen Halle und Leipzig, copioſisſimum eſt; wie auch bey Gießen auf dem Stoppel-Berge. Floret Jun. De hac planta vid. Raji catalogus Plantar. circa Cantabrigiam naſcentium.

LAGOPVS Dodon. Pempt. 577. Lagopus trifolius quorundam I. B. 2. 377. Trifolium arvenſe, humile, ſpicatum ſive Lagopus C. B. P. 328. In agris nach Kleine zu floret æſtate; Flore albo variat. Germ. Katzen-Klee, Haſen-Fuß, Haſen-Pfödgen.

LAGOPVS capitulis rubris. Cum præcedente bey Leipzig vor dem Thore, wo man nach Halle gehet.

LVPVLINVM Rivini. Trifolium pratenſe, luteum, capitulo lupuli vel agrarium C. B. P. 328. Trifolium pratenſe, luteum flore pulchriore ſive lupulino I. B. In pratis ſiccis v. g. wo man nach Cunitz gehet, an dem Sumpffe in arenoſis, floret Julio. Germ. Hopffen-Klee.

LVPVLINVM minimum. Trifolium luteum, lupulinum, minimum Moriſ. H. O. P. 2. 142. Cum præcedente.

LVPVLINVM montanum, capitulis ſpadiceis; Trifolium montanum, lupulinum C. B. P. 140. Pin. 328. In montoſis & apricis bey der Mühle zu Schlefreiſen, und bey der frölichen Wiederkunfft, floret Jun. & Jul. ſchwartzbrauner Hopffen-Klee.

MILI-

MELILOTVS officinarum Germaniæ C. B. P. 331. Trifolium odoratum, ſive melilotus vulgaris, flore luteo I. B. 2. 370. Melilotus germanica Lobel. icon. 43. Melilos ten, Stein-Klee. In pratis, agris vineisque floret æſtate.

MELILOTVS officinarum Germaniæ, flore albo C.B.P. 331. Cum præcedente.

MELILOTVS flore cœruleo Riv. Melilotus major, odorata, violacea Moriſ. H. O. p. 2. 161. Lotus hortenſis, odora C. B. P. 331. Lotus ſativa, odorata, annua, flore cœruleo I. B. 2. 368. In hortis frequens floret æſtate. Schabzüger-Kraut, Siebengezeit, Sieben-Geruch, ſieben Stunden-Kraut. Schabzüger-Kraut dicitur, quia caſeum Helveticum, Schabzüger dictum ingreditur; vid. Scheuchzer. itin. alpin. Sieben-Geruch vero, quia ſepties de die odorem permutare creditur.

MELILOTVS minima Riv. Melilotus capſulis reni ſimilibus, in capitulum congeſtis Tournefort. Trifolium pratenſe, luteum, flore minore, ſemine multo I. B. 2. 380. In agris & pratis aridioribus floret tota æſtate.

ANTHYLLIS Riv. Vulneraria Tournefort. Vulneraria ruſtica I. B. 2. 362. Loto affinis, Vulneraria pratenſis C. B. P. 332. Enneadynamis Polonorum vulgo. Cymæ ipſius flori proximæ, inſtar ſummitatum hyperici digitos confricantium. In pratis ſiccioribus wo man nach Cuniz gehet & alibi floret Majo & Junio. Flore albo quandoque variat, quod Lagopodium flore albo Tabernæmont. icon. 524.

PSEVDO-GLYCYRRHIZA Riv. Glycyrrhiza capite echinato C. B. P. 352. Glycyrrhiza vera Dioſcoridis Dod. Pempt. 341. In hortis floret Jun. & Jul.

PSEVDO-ACACIA vulgaris Riv. & Tornef. inſtit. pag. 649. Arbor ſiliquoſa, virginienſis Park. theatr. 1550. Wunder-Baum quibusdam dicitur, quod nomen alii Ricino imponunt. In hortis & in areis & compitis variis Germaniæ in locis conſpicitur, floretque Majo; flores habet ſuaveolentes.

LABVRNVM Riv. Anagyris altera Matthioli. Eghelo Italis dicitur; in hortis floret cum præced. paulo tamen citius.

CORAL-

CORALLODENDRON Tourneſ. Coral arbor vulgo. In hortis Curioſorum, ſed raro floret.

CYTISVS latifolius. vid. Cluſ. hiſt. plant. rar. in monſoſis dumetis bey Salfeld floret Jun.

LENS vulgaris, ſemine ſubrufo C. B. P. 351. Lens I. B. 2. 317. Lens minor. Dodon. Pempt. 526. In agris paſſim floret tota æſtate. Linſen. Semine albo & rufo variat.

LENS major C. B. P. 346. In agris cum præcedente. Germ. Pfennig-Linſen.

OROBVS ſylvaticus, purpureus, vernus C. B. P. 351. Galega nemorenſis, verna I. B. 2. 343. Orobus pannonicus I. Cluſ. Hiſt. CCXXX. In nemoribus v. g. im Raus henthale, auf dem Forſt, und auf der Walters-Wieſe, floret Aprili & Majo. Flore roſeo & niveo aliquando variat. Germ. dicitur Faſanen-Kraut, quia forſan hæ aves orobi ſemine delectentur.

OROBVS ſylvaticus, viciæ foliis C. B. P. 352. Aſtragalus major Fuchſio I. B. 2. 334. Orobus pannonicus II. Cluſ. c. l. Cum præcedente floret Jun. vulgo glycyrrhizam ſylveſtrem vocant.

OROBVS ſylvaticus, foliis oblongis, glabris Tournefort. Orobus radice tuberoſa Rivino. Aſtragaloides, ſive Aſtragalus ſylvaticus Chabræi p. 151. In ſylvis auf dem Tautenburgiſchen Forſt, floret Junio & Jul. & hujus radix eſt dulcis; vid. Raj. hiſt. plant.

PISVM majus, quadratum C. B. P. 342. Piſum quadratum Plinii Lobel. icon. 66. In agris & hortis paſſim floret tota æſtate. Zucker-Erbſen.

PISVM umbellatum C. B. P. 342. Piſum comoſum Riv. Piſum erectius, ſquamoſum I. B. 2. 299. In hortis paſſim floret cum præcedente. Büſchel-Erbſen.

PISVM arvenſe C. B. P. 343. Piſa vulgaria, parva, alba ſive arvenſia I. B. 2. 297. In agris paſſim floret æſtate. Erbſen. Flore purpureo & albo variat, non ſecus ac piſum majus. Fructus ſive ſiliqua immatura a multis avide comeditur, & Schoten vocatur.

LATHYRVS ſativus, flore fructuque albo C. B. P. 343. Lathyrus anguloſo ſemine I. B. 2. 306. In

agris cum præcedente floret æstate. Germ. Kichern.

LATHTRVS sylvestris, major C. B. P. 344. Lathyri majoris species, flore rubente & albido, minori, dumetorum, sive germanicum I. B. 2. 302. Lathyrus sylvestris Dodon. Pempt. 523. In dumetis & sylvis floret æstate.

LATHTRVS latifolius C. B. P. 344. Lathyrus major, latifolia, flore majore, purpureo speciosior I. B. 2. 303. Lathyrus latiori folio Lobel. icon. 68. Cicerula sylvestris Tabern. cum præcedente.

LATHTRVS anguſtifolius, semine maculoso C. B. P. 344. Cicercula ægyptiaca Clusii CCXXXVI. In hortis floret æstate.

LATHTRVS siculus Rivini; In hortis. Vulgo Lathyrum moschatum vocant. vid. Commelin. hort. Amstelod. Quandoque flore albo variat.

LATHTRVS arvensis, repens, tuberosus C. B. P. 344. Lathyrus arvensis Riv. Chamæbalanus leguminosa I. B. 2. 514. Terræ glandes Dodon. Pempt. 550. In agris passim floret æstate. Erd-Feigen, Erd-Nüsse. Aquam ex floribus destillatam aquæ rosarum odori fere accedere testatur Camerar. Epit. Matthiol. p. 421. unde vulgo dicitur flore & odore roseo.

LATHTRVS palustris, flore orobi nemorensis, verni, nondum descriptus. In pratis uliginosis, & arundine obsitis, v. g. bey Laucha, auf denen Obendorffischen Wiesen, floret Junio. Descriptio hujus plantæ est sequens: Ex radice repente & totos cespites occupante prodeunt caules crebri, more lathyrorum anguloſi & intervallis vestiti foliis pinnatis ex duobus tribusque pinnis constantibus, costæ pariter alatæ & in capreolum tortilem abeunti adnatis, ex quorum foliorum alis, prodeunt petioli sustinentes tres quaterve flores purpureos, dum marcescunt cœruleos, orobi sylvatici verni floribus perquam similes, quos defluentes, sequuntur siliquæ tortuosæ bivalves seminibus quinque vel sex fœtæ rotundis ex atro maculatis & veluti punctatis.

LATHTRVS siliqua hirsuta Riv. & C. B. Pin. J. B. in agris bey Schiffenberg nahe bey Giessen floret æstate.

LATHT-



Lathyrus palustris flore orobi nemorensis, verni, nondum descriptus.


Google

LATHTRVS pratenſis Riv. Lathyrus ſylveſtris, luteus, foliis viciæ C. B. Lathyrus luteus ſylveſtris dumetorum I. B. In pratis paſſim floret Majo & Jun.

LATHTRVS Tingitanus, ſiliquis orobi, flore amplo, ruberrimo. Moriſ. H. O. P. 11. 55. In hortis floret æſtate.

LATHTRVS foliis pinnatis Riv. Clymenum hiſpanicum, flore vario, ſiliqua articulata Tournefort. Inſtitut. p. 396. cum præced.

APHACA Lobel. icon. 70. Vicia lutea, foliis convolvuli minoris C. B. P. 344. In agris bey Kleine floret æſtate.

NISSOLIA Tournef. inſtit. rei herb. p. 566. Lathyrus foliis gramineis, floribus coccineis Raj. Syllog. 160. & Tournefortii p. 396. in Inſtitut. bis enim hanc plantam propoſuit Clariſſ. autor.

NISSOLIA Tournefort. Lathyrus ſylveſtris minor C. B. Catanance leguminoſa quorundam I. B. 2. 309. In agris cum præcedente, und bey Schiffenberg, ohnweit Gießen

VICIA ſativa, vulgaris, ſemine nigro C. B. P. 344. Vicia vulgaris, ſativa I. B. 2. 310 In agris paſſim, floret æſtate; ſemine variat. Wicken.

VICIA ſativa, alba, C. B. P. 344. Vicia albo ſemine I. B. Ervum candidum, vel Faba veterum Tragi 626. In agris cum piſis arvenſibus floret æſtate.

VICIA dumetorum, maxima C. B. P. 145. Vicia ſepium perennis I. B. 2. 313. Cracca major Tabernæm. icon. 506. ad ſepes paſſim, in pomariis & in ſylvis ad frutices frequens floret Majo & Jun. Germ. Vogel-Wicken.

VICIA anguſtifolia Riv. Vicia ſemine parvo, nigro, frugum Chabr. in Sciagraph. ſtirpium. In pratis ſiccioribus, v. g. wo man nach Cunitz gehet, floret Majo.

VICIA minima Riv. Vicia minima, præcox Pariſienſium H. R. Par. Vicia præcox, verna, minima, Solonienſis, ſemine hexaëdro Moriſ. H. R. Bleſ. in apricis, tenui gramine veſtitis v. g. bey Leipzig auf dem Kickerlings-Berge, auf dem Meckeriſchen Anger, und andern dergleichen Orten, frequens floret Martio & Aprili.

VICIA ſylveſtris lutea, ſiliqua hirſuta C. B. Pin. 345.

Vicia luteo flore, ſylveſtris J. B. 2. 313. inter ſegetes bey Schiffenberg, ohnweit Gießen, floret Majo & Junio cum Niſſolia, quæ pariter in agris circa Schiffebergam frequens eſt.

CRACCA Rivini. Vicia multiflora C. B. P. 345. Aracus Tabern. icon. 506. In ſylvis & dumetis, nec non pratis aridioribus floret æſtate.

CRACCA ſylvatica Riv. Vicia ſylvatica maxima, piſo ſylveſtri ſimilis I. B. 2. 315. Piſum ſylveſtre minus Tabern. icon. 499. In ſylvis paſſim v. g. im Rauhenthale, und bey Coſpida im Walde.

CRACCA flore ochroleuco Riv. Piſum ſylveſtre, perenne C. B. P. 343. Piſum ſylveſtre Cluſ. Pann. Cum præcedente.

CRACCA minor Rivini. Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis, hirſutis C. B. 345. Vicia parva ſive cracca minor, cum multis ſiliquis hirſutis I. B. 2. 315. Craccæ alterum genus Dodon. Pempt. 542. Inter ſegetes floret æſtate.

CRACCA minor, ſiliqua gemella; Vicia minima cum ſiliquis glabris Tournefort. Viciæ, ſive craccæ minimæ ſpecies, cum ſiliquis glabris I. B. 2. 315. Cum præcedente, ſed rarius bey Schlefreiſen und Hummelshayn.

CRACCA minor ſiliqua ſolitaria glabra, cum præcedente a qua pariter foliis differt.

CRACCA ſylvatica, rotundifolia, floribus ex albo variis. An vicia perennis, multiflora, ſpicata, major, floribus albis, lineis (& punctis) cœruleis (aut purpureis) notatis Moriſoni & Knauthii in Cat. Plant. circa Halam proventium p. 47. In ſylvis variis v. g. im Rauhenthal, und im Cloſewitziſchen Holtze floret Jun.

FABA flore candido, lituris nigris conſpicuo C. B. P. 338. In agris & hortis floret æſtate. Bohne, Saus Bohne.

FABA rotunda, oblonga, ſeu cylindracea minor, ſeu equina alba Moriſ. H. O. P. 2. 85. Faba minor, fructu nigro C. B. P. 338. In agris cum præcedente.

LVPI-

LVPINVS ſativus, flore albo C. B. P. 347. Lupinus vulgaris, ſemine & flore albo. Sativus I. B. 2. 228. In hortis fl. Aug. Feig-Bohnen, oder Lupinen.

LVPINVS ſylveſtris, purpureo flore, vario, majore. Bot. Monſp. App. Lupinus ſylveſtris, purpureo flore, ſemine rotundo, vario I. B. 2. 290. Lupinus ſylveſtris, flore cæruleo C. B. P. 348. In hortis floret æſtate.

LVPINVS anguſtifolius, cæruleus, elatior Raji. Hiſt. 908. In hortis.

LVPINVS ſylveſtris, flore luteo C. B. P. 348. Lupinus luteo flore, ſemine compreſſo, vario I. B. 2. 290. In hortis floret æſtate tota. Hujus flores ſuave olent, & quibusdam türckiſche Veilgen dicuntur.

PHASEOLVS vulgaris Lobel. icon. 59. Smilax hortenſis, ſive Phaſeolus major C. B. P. 339. In hortis paſſim floret æſtate; Seminis magnitudine & colore inſigniter variat, nec non flore purpureo & albo. Bohnen.

PHASEOLVS ægyptiacus, nigro ſemine C. B. P. 341. Phaſeolus niger Lablab Proſp. Alpini Cluſ. CCXXVII. In horto Sereniſſ. Principis floret æſtate.

PHASEOLVS puniceo flore Cornut. 184. Phaſeolus indicus flore coccineo, ſive puniceo Moriſ. H. O. P. 2. 69. In hortis ubi türckiſche Bohnen oder plaiſir-Bohnen vocant; floret tota æſtate.

FOENVM græcum, ſativum C. B. P. 348. Fœnu græcum I. B. 2. 363. In ſatis v. g. im groſſen Paradieße nach Wöllnitz zu; floret æſtate. Germ. fœnum græcum pariter dicitur oder Bocks-Horn.

FALCATA Riv. Medica ſylveſtris, floribus croceis I. B. 2. 383. Trifolium ſylveſtre luteum, ſiliqua cornuta vel medica fruteſcens C. B. P. 330. Lens major, repens Tabernæm. Ad ſepes paſſim floret æſtate. Germ. Siechels Klee.

FALCATA incana Riv. Cytiſus Maranthæ vulgo. Cytiſus Camerar. Epit. Matthiol. p, 408. In horto medico floret Jun.

FALCATA ſativa flore cæruleo. Medica Veterum, fœnum Burgundicum vulgo. Foin de Bourgogne Gallis. In

hortis Curioſorum floret Jun. & Jul. alibi in agris copioſe ſeritur inſtar trifolii majoris & onobrychidis turcicæ, quæ nuper inclaruit.

COCHLEATA echinata, minima Riv. Medica echinata, minima I. B. 2. 386. Trifolium echinatum, arvenſe, fructu minore C. B. P. 30. In aſperis, apricis, gramine tenui veſtitis v. g. an Rändern zwiſchen den Wein-Bergen wo man nach Ziegenhayn gehet, noch häuffiger in apricis wo man über den Steiger nach Coſpida gehet, wie auch am Stadt-Graben, floret Majo & Jun.

COCHLEATA echinata, aculeis ſurſum & deorſum tendentibus. Medica magno fructu, aculeis ſurſum & deorſum tendentibus Tournef. Trifolium cochleatum, echinatum, ſive Medica ſpinis ſurſum deorſumque rigentibus Parkinſ. Theatr. III 6. In hortis floret Julio, cum variis aliis cochleatæ ſpeciebus. Germ. allerhand Schnecken-Klee.

COCHLEATA echinata, fructu doliato Riv. ſ. Medica cochleata δίκαρπος, capſula rotunda ſpinoſa, foliis eleganter diſſectis H. L. in hort. cum præcedente.

GLYCYRRHIZA officinarum Glycyrrhiza ſiliquoſa vel germanica C. B. P. 352. Glycyrrhiza radice repente, vulgaris, germanica I. B. 2. 328. In horto medico floret æſtate. Süß-Holtz, copioſiſſima colitur in agris Franconiæ circa Bambergam.

GALEGA vulgaris, floribus cæruleis & albis C. B. P. Galega I. B. 2. 342. In horto medico floret æſtate. Germ. Geiß-Raute.

ANONIS ſpinoſa, flore purpureo & albo C. B. P. 389. Anonis, ſive reſta bovis vulgaris, purpurea I. B. 2. 395. Stachel-Kraut, Heuhechel, Huhechel, Ochſen-Borche, Stall-Kraut, quia urinam equorum arantium comeſta forſan pellit. In campeſtribus & paſcuis paſſim floret æſtate.

ANONIS ſpinis carens, purpurea C. B. P. 389. Anonis non ſpinoſa, purpureo flore I. B. Cum præcedente in locis montoſis.

NA-

NATRIX. Anonis ſpinis carens, lutea; in hortis Curioſorum floret æſtate.

NATRIX minor, odore theriacæ, cum præced.

COLVTEA veſicaria C. B. P. 396. I. B. 1. 380. In hortis floret æſtate. Linſen-Baum, Blaſen-Baum, wächſt wild bey Lauche.

CAPNOIDES Riv. fumaria ſpuria africana, veſicaria Volkamero in flora Norimberg. p. 176. In horto medico floret æſtate & autumno. Ab hoc multum differt Capnoides Tournefortii, quod alias fumaria ſempervirens Cornuti ſive indica dicitur, & in hortis Curioſorum pariter aliquando occurrit, floretque Iun.

GENISTA juncea I. B. 1. 395. Spartium aboreſcens, ſeminibus lenti ſimilibus C. B. P. 3. In hortis floret Majo & Iunio.

GENISTA tinctoria germanica C. B. P. 395. Tinctorius flos I. B. 1. 391. Genſter, Geniſt, Witſchen. In ſylvis v. g. auf dem Forſt floret æſtate.

GENISTA ſpartium minus, germanicum. Geniſta ſpinoſa minor Germanica C. B. P. 395. Geniſtella ſpinoſa Riv. Geniſta aculeata folio I. B. 3. 99. In ſylvis v. g. auf der Wellmeſe, floret æſtate.

SECVRIDACA lutea, major C. B. P. 348. Securidaca flore luteo, ſiliqua lata oblonga I. B. 2. 345. In hortis floret æſtate.

FERRVM EQVINVM comoſum Riv. Ferrum equinum Germanicum, ſiliquis in ſummitate C. B. P. 349. Ferrum equinum, capitatum Column. Ornithopodio affinis vel potius ſoleæ vel ferro equinæ herbæ. I. B. 2. 348. In apricis & aſperis v. g. auf dem Hauß-Berge, floret Majo.

HEDYSARVM clypeatum, flore ſuaviter rubente. Eyſt. Onobrychis ſemine clypeato, aſpero, major C. B. P. 350. Aſtragalus romanus ſive hedyſarum clypeatum, ſiliqua aſpera I. B. 2. 333. In hortis floret æſtate.

CAMPOIDES hiſpida Riv. Scorpioides bupleuri folio, corniculis aſperis magis in ſe contortis, & convolutis Moriſ. Hiſt. Oxon. p. 2. 127. Scorpioides ſiliqua campoide hiſpida. I. B. 2. 898. In horto medico flore æſtate. Rauten-Klee.

CAMPOIDES ſiliqua cochleata & ſtriata H. R. Pariſ. Cum præcedente.

LOTVS corniculata, glabra, minor I. *B.* 2. 356. Lotus, ſive melilotus pentaphyllos minor, glabra *C. B.* P. 332. In campeſtribus paſſim floret æſtate. Foliis hirſutis variat, vel potius differt, cum folia non ſolum ſint anguſtiora, ſed & piloſiora, bey Jſerſtädt und Vierzehnheiligen; floret cum præcedente.

LOTVS pentaphyllos, flore majore, luteo, ſplendente *C. B.* P. Loti corniculati, major ſpecies I. *B.* auf feuchten Wieſen bey Querl, und Hanbüchen, auch bey Hummels-hayn.

LOTVS ſiliquoſus, rubello flore Cluſ. Hiſt. 244. Lotus ruber ſiliqua anguloſa *C. B.* Lotus tetragonolobus Germ. Spargel-Bohnen. In hortis floret æſtate.

LOTVS tetragonolobus Riv. Trifolium ſiliquoſum Tabernæm. icon. 518. auf der Wieſen bey Rabs, und wo man nach Jena-Prießnitz gehet, floret Majo & Jun.

LOTVS fruticoſus, anguſtifolius, floribus ex luteo aurorubentibus, ex Inſula S. Jacobi. vid. Commelin. Hort. Amſtelod. in hortis Curioſorum floret æſtate.

CORONILLA montana Riv. Colutea ſiliquoſa, minor *C. B.* P. 397. In montibus, paſſim floret æſtate; vulgus foliis ſennæ ſubſtituit.

CORONILLA flore vario Riv. Coronilla herbacea, flore vario Tournefort. Securidaca dumetorum major, flore vario, ſiliquis articulatis *C. B.* P. 349. Melilotus quinta Tragi I. *B.* 2. 349. In dumetis & ad ſepes frequens floret æſtate. Huic plantæ multum ſimilis eſt exotica illa Coronillæ ſpecies, ex qua paratur Indigo, famoſus ille ſuccus inſpiſſatus; vid. Rocheſortii deſcriptio inſularum anthyllidum & Sam. Dahlii pharmacologia, it. Rocheſortius, Guilielmus Piſo & Marggrafius de Liebſtædt.

CORONILLA major Riv. Emerus Cæſalpini 117. Colutea ſcorpioides, ſive colutea major C. *B.* In horto medico floret æſtate.

SPLIT radice rotunda, cava Rivini Pſeudo-fumaria ejusdem. Fumaria bulboſa, radice cava, major, flore rubro & albo

albo *C. B.* p. 143. In nemoribus v. g. auf dem Cunitzer Berge, auch in denen Gärten hinter den ſchwartzen Bären, item in den Hayn bey Dornburg. Germ. Frauen-Schüchlein, Hohl-Wurtz, Farn-Saamen. Vulgus opinatur hujus ſemen non amplius comparare poſt Calendas Majas, quæ Walpern dicuntur; floret Martio & Aprili.

SPLIT radice rotunda, non cava. Fumaria bulboſa, radice rotunda, non cava, major *C. B.* P. 144. Officinis ariſtolochia rotunda fabacea dicitur An Hecken bey Haynbüchen, an dem hohen Ufer der Saal, wie auch in denen Gebüſchen zwiſchen Naumburg und Schönborn, cum præcedente & cum moſchatellina floret Martio & Aprili.

SPLIT flore luteo. Fumaria lutea *C. B.* P. 143. In hortis floret tota æſtate, & autumno in brumam usque. De hujus plantæ virtutibus conſulatur Joh. Raji hiſtoria plant. univerſalis.

IMPATIENS Rivini. Noli me tangere vulgi & I. B. 2. 908. Impatiens herba Dodon. Pempt. 659. Springs-Kraut. Ad rivulos & in ſylvis umbroſis nach Laaßdorff und Schlefreiſen zu floret Junio & Julio. Huic plantæ vis deleteria ineſt, hinc Hieronymus Tragus Eſulis annumeravit.

BALSAMINA Dodon. Pempt. 671. Balſamina fœmina, perſici folia, vel ſalicis folio I. *B.* 2. 909. Balſamina fœmina *C. B.* P. 308. In hortis floret æſtate; floris colore variat, purpureo, carneo & albo.

(2) CAPSVLA BIPARTITA.

ASTRAGALVS luteus, perennis, procumbens, ſive ſylveſtris Moriſ. H. O. P. 2. 107. Glycyrrhiza ſylveſtris, floribus luteo-palleſcentibus *C. B.* P. 352. Fœnum græcum ſylveſtre, ſive glycyrrhiza ſylveſtris quibusdam I. *B.* 2. 330. In ſylvis & dumetis, v. g. im Rauhenthale; floret æſtate. Germ. Gliedeweich, wild Süß-Holtz, quia folia glycyrrhizæ radicem ſapore æmulantur.

GLAVX Rivini. Aſtragalus luteus perennis, filiqua gemella, rotunda, veſicam referente Moriſ. H. O. P. 2. 107.

Cicer ſylveſtre, foliis oblongis, hiſpidis, majus C.B.P. 347. Hedyſarum alterum Dodon. Ad ſepes & in agrorum limitibus, pratisque paſſim floret æſtate.

APIOS americana Cornuti & Rivini. Aſtragali ſpecies juxta Moriſ. in hort. med. floret Septembri.

THLASPIDIVM alpinum, foliis globulariæ. Thlaſpi alpinum, bellidis cœruleæ folio *C. B.* P. 106. Thlaſpi folio globulariæ I. *B.* 2. 926. Thlaſpi montanum burſæ paſtoris fructu, primum Column. Burſa paſtoris montana, folio globulariæ. Tournef. Inſtit. 216. Auf dem Fuchs- und Cunitzer-Berge, auch auf dem Forſte, aliisque montibus floret Aprili & Majo.

THLASPIDIVM arvenſe, minimum, folio glabro, ſpiſſo Naſturtium petræum, folio burſæ paſtoris *C. B.* P. 104. Burſa paſtoris minor; foliis inciſis ejusdem 106. Burſa paſtoris parva, folio glabro, ſpiſſo I. *B.* 2. 937. Naſturtium petræum Tabern. icon. 451. In agris arenoſis bey der neuen Schencke und Laaßdorff, auch häuffig auf allen ſandigten Aeckern bey Wittenberg trans albim floret Aprili.

THLASPIDIVM foliis iberidis. Naſturtium creticum quibusdam, flore rubente & albo I. *B.* 2. 924. Thlaſpi umbellatum creticum, iberidis folio *C. B.* P. 106. In hortis floret æſtate.

(3) CAPSVLA TRIPARTITA.

ESVLA Rivini & officinarum. Tithymalus cypariſſias *C. B.* P. 291. Tithymalus cupreſſinus Lobel. icon. 356. Germ. Wolffs-Milch, Teuffels-Milch, Eſels-Milch. In campis & ad ſepes paſſim floret Aprili & Majo. Variat coma rubra in montoſis, nec non caule faſciato, atque ſæpe folia punctis croceis notata habet, quæ

ESVLA punctis croceis notata *C.B.* Eſula degener Rivini Eſula ſcabioſa Geſneri. Notari meretur Riv. alias Botanicorum Germanicorum Princeps, qui Geranium Robertianum & Eſulam ſoliſequam præcedentibus Botanicis ignotas plantas, ſaltim ſub hoc nomine male excogitavit. Præterea non ſolum eſula vulgaris, ſed et Eſula maritimæ affinis prope

pe Querfurtum, Eckersbergam & Apoldam frequens, eodem ludo ſuas abſolvit ſcenas, adeoque nugatur Riv. qui hujus plantæ ludentis, ex eadem radice characterem voluit eſſe ſpecificum degenerem.

ESVLA ſoliſequa. Tithymalus helioſcopius *C.B.P.*291. Dodon. Pempt. 371. Tithymalus helioſcopius vel ſoliſequus I. *B.* Wolffs-Milch. In cultis, & agris paſſim floret toto fere anno. Et in hac puncta crocea copioſiſſime quandoque comprehenduntur.

ESVLA rotundifolia, non crenata. Tithymalus rotundis foliis, non crenatis H. L. Bat. Peplus, ſive Eſula rotunda *C. B.* P. 292. Cum præcedente, v. g. bey Ammerbach atque pariter in hortis ſuburbanis paſſim inter olera; auch im Fürſten-Garten.

ESVLA tenuifolia, ſive exigua Tragi 298. Tithymalus minimus, angustifolius, annuus I. *B.* 3. 664. Tithymalus, ſive Eſula exigua *C. B.* P. 291. In cultis & agris paſſim floret tota æſtate & autumno.

ESVLA major Riv. Tithymalus latifolius cataputia dictus H. L. Bat. Lathyris major *C. B.* P. 293. Lathyris, ſive Cataputia minor I. *B.* 3. app. 880. In hortis floret æſtate. Germ. Spring-Körner, Treib-Körner; hujus enim capſulæ per maturitatem, præcipue ſub ſole meridiano cum impetu diſſiliunt, & ſemina ejaculant.

ESVLA latifolia arvenſis. Tithymalus latifolius, arvenſis, germanicus *C B.* P. 291. Tithymalus platyphyllos Fuchſii I. *B.* 3. 670. Fuchſ. Edit. in fol. 813. In agris bey Cluſewitz, und in Burgau beym Kirch-Hofe.

ESVLA dulcis Tragi 298. Pityuſa, ſive Eſula minor, altera, floribus rubris Lobel. Tithymalus non acris montanus *C. B.* P. 292. Eſula ſoliſequa Riv. In horto Sereniſſ. Principis; ſponte vero circa Lipſiam in nemoribus v. g. im Holtze bey Golitz und Gonnowitz, floret Majo.

ESVLA paluſtris Rivini. Tithymalus paluſtris, fruticoſus *C. B.* Pin. 292. Tithymalus magnus, multicaulis, ſive Eſula major I. *B.* 3. 671. Auf denen Obendorffiſchen Wieſen bey Lauche inter arundines floret Jun. iſt auch bey Wittenberg auf denen Pläſerſchen Wieſen.

ESVLA

ESVLA folio amygdali, anguſto. Tithymalus amygdaloides, anguſtifolius Tabern. icon. 591. Tithymalo maritimo affinis, linariæ folio C. B.P. 291. Alypum Matthioli, tithymalis affine I. B. 3. 676. In campeſtribus & agrorum limitibus bey Sultze und Eckardsbergen, floret Majo; & hæc degener evadit.

ESVLA caule craſſo Riv. Tithymalus dendroides vulgo. In hortis Curioſorum floret Jul.

CORINDVM Tournefort. Piſum veſicarium fructu nigro, alba macula notato C. B. Pin. 343. Halicacabum peregrinum multis ſive Corindum J. B. 2. 173. In hortis Curioſorum floret Julio & Auguſto, an Dorycnium Dioſcoridis?

(4) CAPSVLA QVADRIPARTITA.

MELIANTHVS africanus H. L. Bat. Pimpinella ſpicata, maxima, africana Batthol. in Act. Haffn. Tom. 2. 258. In hortis floret æſtate.

MELIANTHVS minor, fœtidus; an melianthus americanus minor Tournefort. Floret in hortis cum præcedente. Flos melianthi eſt tetrapetalus, non hexapetalus, ſiquidem ſuperiora folia ſint perianthii, uti cuivis attendenti facile patebit, & præcipue ſi præjudiciorum fuerit expers.

CLASSIS XII.

DE PLANTIS FLORE IRREGVLARI PENTAPETALO GAVDENTIBVS.

I. Seminibus nudis gemellis.

TORDYLIVM maximum Tournefort. Caucalis maxima ſphondylii aculeato ſemine C. B. P. 152. Caucalis

lis major Cluſ. Hiſt. 209. Caucalis major Cluſ. I. B. 3. part. 2. 85. In horto medico, floret æſtate. Wächſt wild an denen Hecken zwiſchen Prade und Kämberg, auch bey Torgau.

CERVARIA Rivini. Oreoſelinum apii folio majus Tournefortii. Daucus montanus apii folio major C.B.P. 150. Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra I. B. 3. part. 165. Gentiana nigra off. Germ. ſchwartzer Entzian, Hirſch-Wurtz. Matthiolo Bär-Wurtz audit, quod vero magis ad meum ſpectat. In montibus noſtris paſſim v. g. auf der Wellmeſe. Floret æſtate.

OREOSELINVM offic. & Riv. auf dem Kickerlings-Berge bey Leipzig, auch bey Wittenberg nach Teichel und der Papier-Mühle hin floret Jul.

PASTINACA ſativa, latifolia C.B.P. 155. Paſtinaca ſativa, latifolia, luteo flore I. B. 2. part. 2. 150. Elaphoboſcum ſativum Tabernæm. icon. 76. Paſternack, Hammels-Möhren, Paſternat-Möhren. In agris & hortis paſſim floret æſtate.

PASTINACA ſylveſtris latifolia C. B. P. 155. Paſtinaca germanica ſylveſtris quibusdam Elaphoboſcum I. B. 3. part. 2. 149. Paſtinaca ſylveſtris quibusdam officinis Baucia dictus, teſte Volkamero. In pratis paſſim floret cum præcedente.

PASTINACA paluſtris, altiſſima, foliis ſeſeleos pratenſis. Daucus Alſaticus C. B. Prodr. p. 77. in uliginoſo ſalſi lacus littore, cum apio paluſtri bey Rulsdorff cum apio paluſtri an der ſaltzigen See, floret Jun. & Jul.

SPHONDILIVM vulgare, hirſutum C. B. P. 157. Sphondilium quibusdam ſive Branca urſina germanica I. B. 3. part. 2. 160. Sphondilium Dodon. Pempt. 307. In pratis paſſim floret æſtate. Bären-Klau, Porſt, Bär-Wurtz. Floribus purpureis & albis variat; nec non foliis anguſtioribus, & veluti criſpis; quod Dn. Rivinus eleganti figura expreſſit.

HYDROCOTTLE Tournefort. Cotyledo, aquatica Dodon. Cotyledon aquatica acris ſeptentrionalium Lobelii Ranunculus aquaticus cotyledonis folio C. B. P. 180.

In

In paludoſis pratis & in humidis muſcoſis prope Wittebergam frequens v. im kleinen Luch, auch bey Halle, nahe beym Faſanen-Hauſe in paludoſis, wird auch zuweilen bey der Hauſpitze gefunden. Floret Majo Jun. & Jul.

ERTNGIVM vulgare C. B. P. 386. I. B. 3. 85. Eryngium campeſtre Dod. Pempt. 730. Manns-Treu, Lauch-Diſtel. Raden-Diſtel, Lauſſ-Diſtel. In campeſtribus paſſim juxta vias publicas floret æſtate.

ERTNGIVM latifolium, planum. C. B. P. 386. Eryngium planum, latifolium capitulo rotundo, parvo I. B. 3. 88. Eryngium pannonicum latifolium Cluſii. In hortis floret cum præcedente.

PEVCEDANVM germanicum C. B. P. 149. Peucedanum minus, germanicum I. B. 3. part. 2. 36. Germ. Schwefel-Wurtz, Haar-Strang, Sau-Fenchel. In pratis & montoſis dumetis v. g. im Coſpidaiſchen Holtze, floret æſtate.

IMPERATORIA officinarum & I. B. 3. part. 2. 137. Imperatoria major C. B. P. 156. Oſtrutium ſive aſtrutium, item aſtrentium vulgo dicitur. Meiſter-Wurtz. In hortis variis floret æſtate.

ANETHVM hortenſe C. B. P. 147. Anethum I. B. 3. part. 2. 6. Dod. Pempt 298. Dill, Till. In hortis paſſim & agris inter olere floret æſtate. Hujus herba condiuntur cucumeres juniores.

THTSSELIVM anguſtifolium Riv. olſenitium officin. Olſenichium Cordi Thyſſelinum Plinii Lobel. Apium ſylveſtre lacteo ſucco turgens C. B. P. 153. In paludoſis ſylvis & alnetis v. g. Bey Halle, nicht weit vom Faſanen-Hauſe; bey Leipzig, nach Schwenckfeld zu; bey Wittenberg in der Speck, auch im Voigtlande bey Oelßnich und Weida, it. bey Altenburg hin; floret Jul.

ANGELICA ſativa C. B. P. 155. I. B. 3. part. 2. 140. Imperatoria ſativa Tournefortii. In hortis floret æſtate. Angelica, Bruſt-Wurtz ꝛc.

ANGELICA ſylveſtris major. C. B. P. 155. Angelica ſylveſtris magna vulgatior I. B. 3. part. 2. 144. Angelica ſylveſtris Dodon. Pempt. 318. In pratis udis

v g.

v. g. im groſſen Paradieße nach Wöllnitz zu floret æſtate.

ANGELICA lucida Canadenſis Cornuti 197. In hortis Curioſorum, floret æſtate.

ANGELICA tenuifolia Rivini. An imperatoria Pyrenaica tenuifolia Tournefortii? Carvi folia I. B. In pratis & ſylvis v. g. im Cluſewitziſchen Höltzgen, und im Rauhenthale. Floret æſtate.

ANGELICA ad alas florens. Alpinum montanum folio ampliore C. B. Pin. 153. vel Gutta Dodonæi auf dem Enſels-Berge, cum præcedente.

LASERPITIVM foliis latioribus lobatis Moriſ. umbel. 29. Libanotis latifolia altera, ſive vulgatior C. B. P. 157. Libanotis Theophraſti quorundam ſive Seſeli æthiopicum Matthiolo, cervaria alba I. B. 311. part. B. 164. Gentiana alba officinarum, uti cervaria officinis Thuringicis Gentiana nigra dicitur. In montibus & ſylvis paſſim v. g. auf der Welms und auf dem Forſte. Floret æſtate. Weiſſer Entzian, weiſſer Entzig.

LASERPITIVM minus Rivini. Laſerpitium daucoides, prutenicum, viſcoſo ſemine Breynii. cent. I. 1675. cum præcedente.

SCANDIX ſemine roſtrato, vulgaris C. B. P. 152. Pecten veneris I. B. 3. part. 2. 71. Nadel-Körbel, Hechel-Kamm. In agris paſſim inter ſegetes floret æſtate.

ECHINOPHORA flore magno Rivini: Caucalis arvenſis, echinata magno flore. C. B. P. 152. Lappula canaria flore pulchro magno I. B. 3. part. 2. 70. Echinophora πυκνοκάρπος an Dioſcorid. Gingidium Column. part. I. 91. Caucalis Dod. Pempt. 700. In agris bey Säufeld, bey Schiffenberg, auch bey Franckfurth am Mäyn, item bey Altenbergen am Mühlbache floret Jun.

ECHINOPHORA ſemine magno Rivini. Caucalis arvenſis echinata latifolia. C. B. P. 152. Lappula canaria latifolia ſive caucalis I. B. 3. part. 2. 80. Echinophora quarta major πλατυφύλλος purpurea Column. part. I. 97. In agris paſſim floret æſtate. Flore albo & rubro variat.

ECHI-

ECHINOPHORA ſemine parvo Rivini. Lappula canaria, flore minore ſive tenuifolia I. B. 3. part. 1. 80. Echinophora tertia λεπτοφύλλος purpurea. Column. part. 1. 97. In agris paſſim cum præcedente floret tota æſtate.

CAVCALIS vulgaris. Caucalis ſemine aſpero floſculis rubentibus C. B. P. 153. Prodr. 80. Anthriſcus quorundam ſemine aſpero, hiſpido. I. B. 3. part. 2. Ad ſepes paſſim floret æſtate. Flore albicante quandoque variat.

CAVCALIS chærephylli folio Rivini. Chærophyllon ſylveſtre ſeminibus brevibus hirſutis Tourn. inſtit. p. 314. Myrrhis ſylveſtris ſeminibus aſperis C. B. P. 160. Myrrhis ſylveſtris æquicolorum Column. part. 1. 112. Ad ſepes, & in ruderatis circa pagos v. g. in Burgau, Zöllnitz, Cunitz am Häuſern, und vor dem Naumburgiſchen Schefſel floret Majo; quandoque & Septembri refloret.

STAPHTLINVS Rivini & græcorum, Daucus ſativus radice lutea aurantii coloris, & alba Tournefort. inſtitut. p. 307. Paſtinaca tenuifolia ſativa. C. B. P. 159. Paſtinaca ſativa ſive carota lutea I. B. 3. part. 2. 64. In hortis & agris floret æſtate. Germ. Möhren, Mohr-Rüben, gelbe und weiße Rüben.

STAPHTLINVS ſylveſtris. Daucus vulgaris Cluſ. Hiſt. 148. Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris Dioſcoridis vel Daucus officinarum C. B. P. 151. Paſtinaca ſylveſtris ſive Staphylinus græcorum. I. B. 3. part. 2. 62. In campeſtribus & ad ſepes paſſim floret tota æſtate. Germ. Vogel-Neſt, wilder Möhren-Saamen. In hujus umbellæ meditullio conſpicitur atro-rubens quoddam corpuſculum, quod multi contra Epilepſiam ſpecifice commendant. vid. Dioſcorides & Tragus. Ruſticæ mulierculæ hujus umbellæ, caſeum circumfundunt, quem valde laudant tanquam minus ſanitati contrarium.

FOENICVLVM vulgare germanicum C. B. P. 147. Fœniculum officinarum. Fönchel, Fenchel. In agris & hortis floret Jul. & Aug.

FOENICVLVM dulce, majore & albo ſemine I. B. 3. part. 2. 4. Fœniculum dulce C. B. P. 147. In hortis Curioſorum floret cum præcedente.

MEVM

MEVM foliis anethi C. B. P. 148. Meum vulgare, ſive radix urſina I. B. 3. part 2. 11. In hortis, ut & in pratis prope ſylvam Thuringicam, floret æſtate. Germ. Bär-Wurtz.

OENANTHE aquatica C. B. P. 262. Filipendula aquatica Tabern. icon. 142. Oenanthe ſive filipendula aquatica I. B. 3. p. 2. 91. In ſcrobibus & foſſis v. g. im groſſen Paradieß floret æſtate. vid. Camerarii Matthioli Epitome p. 300. ubi de hac planta hæc habet: Die letzte (œnanthe quarta Matthioli) wächſt in Meißen und anderswo an ſumpffigten Orten, erſtlich gantz und gar mit ſchlechten kriechenden Wurtzeln, wenn man ſie aber in ein trucken Erdreich pflantzet, verändert ſie ſich durchaus, und bekömmet runde Würtzlein, wie Rüblein, kreucht alſo weit um ſich, und wenn man ein klein Zweiglein daran mit Erde beſchüttet, wurtzelt es auch alsbald ein.

SANICVLA officin. C. B. P. 319. Sanicula mas Fuchſii, ſive diapenſia I. B. 3. 639. Sanicula Dodon. Pempt. 140. Sanickel, Tranickel. In ſylvis & nemoribus v. g. im Rauhenthale floret Majo & Jun.

FALCARIA Rivini. Sichel-Kraut. Germ. Ammi perenne Moriſ. umbel. Ammi quorundam Dalechampii Lugd. 696. Eryngium arvenſe foliis ſertæ ſimilibus C. B. P. 386. Crithmum quartum Matthioli umbell. I. B. 3. part. 2. 195. In agris paſſim floret æſtate.

PODAGRARIA Rivini & Lobel. Angelica ſylveſtris minor, ſive erratica C. B. P. 155. Angelica ſylveſtris repens. I. B. 3. part. 2. 145. Ægopodium, herba Gerhardi Tabern. icon. 83. Ad ſepes paſſim. Floret Majo. Germ. Geiſch, Geiß-Fuß, oder Wetſcherlewetſch. Ex hujus herba tempore vetno pauperculi parant ſibi olus.

LEVISTICVM officinarum. Leviſticum vulgare Dodon. Pempt. 311. Angelica montana perennis paludapii folio Tourneſ. inſt. 313. Liguſticum vulgare, an Libanotis fertilis Theophraſt. C. B. P. 157. Liguſticum vulgare foliis apii. I. B. 3. p. 2. 227. Lieb-Stöckel. In hortis floret æſtate.

SESELI pratenſe Rivini. Seſeli pratenſe Silaus forte Plinio

Plinio C. B. P. 162. Silaum quibusdam flore luteo lo I. B. 3. part. 2. 170. Angelica pratenſis apii folio Tournef. Inſtit. p. 313. In pratis v. g. im groſſen Paradieß floret æſtate; folio quandoque latiore variat. Bär-Wurtz quibusdam dicitur, aliis wilder Kümel, Roß-Kümel, Bär-Wurtz.

HIPPOMARATHRVM Rivini p. 20. Daucus montanus, multifido, brevioque folio C. B. Pin. p. 150. Saxifraga Pannonica Cluſii in Pann. & hiſt. Naſcitur in montoſis prope Querfurtum &c. montoſa vero illa ſunt die Schmohniſche Berge, wächſt auch neben dem Wege zwiſchen Schmohne und Querfurth.

LIBANOTIS Riv. & Heucheri. Apium montanum ſ. petræum, album J. B. Daucus anguloſi caulis Cordi. Hujus pariter meminit C. *B.* in Prodr. p. 77. ſub tit. Dauci montani apii folio luteo, dum dicit: huic ſimilem, ſed per omnia majorem &c. In montibus & ſylvis frequens circa Jenam v. g. auf dem Forſt und Wellmeſe, floret Jul. & Aug.

ASTRANTIA major Moriſ. umbell. 7. Helleborus ſaniculæ folio, major *C. B.* P. 186. Sanicula fœmina quibusdam, aliis Helleborus niger I. *B.* 3. 136. In montibus & ſylvis bey Steinburg floret Jun.

BVPLEVRVM folio rigido *C. B.* P. 278. Auricula leporis altera ſive rigidior I. B. 3. part. 2. 200. Bupleurum alterum latifolium Dod. Pempt. 633. Ad ſepes, & in vineis floret Junio & Julio. Haſen-Oehrlein, Wund-Kraut Tragi.

BVPLEVRVM folio ſubrotundo ſive vulgatiſſimum C. *B.* P. 278. Auricula leporis umbella lutea I. *B.* 3. part. 2. 200. Bupleurum anguſtifolium Tabern. icon. 172. Cum præcedente.

BVPLEVRVM arboreſcens ſalicis folio. Seſeli æthiopicum verum Camerar. Epit. Matthiol. p. 257. In hortis Curioſorum floret Jun. & Jul.

BVPLEVRVM montanum latifolium Tournef. Inſtitut. pag. 310. Perfoliata montana Camerarii Hort. icon. 38. In montibus & ſylvis paſſim v. g. auf der Wellmeſe und im Cluſewitziſchen Holtze. Floribus luteis & fuſcis variat.

BVPLEV-

BVPLEVRVM minimum Fab. Columnæ. Bupleuron anguſtiſſimo folio C. B. P. 278. Auricula leporis minima I. B. ad vias publicas in locis tenui gramine obſitis v. g. bey Wittenberg zwiſchen dem Elſter- und Elb-Thore, auf der Eſplanade, auch zwiſchen Marckröltz und Braunsdorff; wird auch an der ſaltzigen See gefunden, item in pratorum & paſcuorum limitibus hinter Naumburg bey Rödchen und Wormsdorff, floret Jul. & Aug.

PERFOLIATA officinarum. Perfoliata vulgatiſſima ſive arvenſis. C. B. P. 277. Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum. Tournefort. inſtit. p. 310. Perfoliata ſimpliciter & annua vulgaris I. B. 3. part. 2. 198. Germ. Durchwachs. Inter ſegetes paſſim floret æſtate. Aliquando umbella criſpa variat, quæ depicta vid. apud Camerar. in Epit. Matthiol. Pro hujus plantæ ſeminibus aliquando ſemina lychnidis vaccariæ vocatæ divenduntur.

CARVM Rivini & Dod. Pempt. 299. Carus I. B. 3. part. 2. 69. Cuminum pratenſe, carvi officinarum C. B. P. 158. In pratis paſſim v. g. im kleinen Paradieß floret Junio. Wieſen- oder Feld-Kümmel, Carwen, flore purpureo variat.

PHELLANDRTVM Dodon. Pempt. 591. Cicutaria paluſtris tenuifolia C. B. P. 161. Phellandryum vel Cicutaria aquatica quorundam I. B. 3. part. 2. 183. In ſcrobibus paſſim & in ſtagnis v. g. in dem Cunitziſchen Teiche. Floret æſtate. Caule craſſo variat.

PHELLANDRTVM caule craſſo, cum præcedente, a quo ſola caulium craſſitie fungoſa diſtinguitur.

ODORATA Rivini. Myrrhis major vel cicutaria odorata C. B. P. 160. Myrrhis magno ſemine longo fulcato. I. B. 3. part. 2. 77. Myrrhis Dod. Pempt. 701. In hortis floret æſtate.

MYRRHIS annua, ſemine ſtriato lævi Moriſ. umbell. 44. Chærophyllum ſylveſtre C. B. P. 152. Ad ſepes paſſim floret Majo.

MYRRHIS perennis, alba, minor foliis hirſutis, ſemine aureo Moriſ. umbell. 66. In pratis wenn man nach Cunitz gehet. Floret Majo & Jun.

MYRRHIS fœtens Rivini. Myrrhis tuberoſa nodoſa, Moriſ. umbell. 67. Cicutaria bulboſa C.B.P. 161. Myrrhis odorata bulboſa I. B. 3. p. 183. Ad ſepes v. g. bey Wenigen-Jena, im Fürſten-Garten, und auch ad ſalices auf denen Wieſen hinter der Schneide-Mühlen im groſſen Paradieß; iſt überall ad ſepes bey Wittenberg zwiſchen Prag und Kämberg, auch bey Gießen und bey Lauchа. D. D. Wedelius B. pro holoconitide Græcorum habet hanc plantam, videatur ejus Propempt. de Holoconitide Græcorum, ſub eodem & cicutariæ Pannonicæ nomine. Auſtriaci & Pannones hujus radices, antequam cauleſcat, rotundas & ſapidos comedunt. Cluſius quoque hanc plantam exhibet & inter prima veris acetaria a Viennenſibus numerari refert, utentibus nempe herba atque radice adhuc tenellis. Floret Majo & Junio.

MYRRHIS paluſtris latifolia alba & rubra Tournefort. inſt. p. 318. Cicutaria paluſtris latifolia alba & rubra C. B. P. 161. Cicutaria latifolia hirſuta I. B. 3. part. 2. 182. Ad rivulos bey den Schleſſreiſiſchen Schneide-Mühlen, und bey Thal-Bürgel. Floret Majo & Jun.

MYRRHIS latifolia Rivini. In horto medico floret Junio.

CEREFOLIVM officinarum ſive chærophyllon Tournefortii. Chærophyllon ſativum C. B. P. 152. Chærophyllon I. B. 3. part. 2. 75. In hortis, & ad ſepes floret Majo. Körbel, Körbel-Kraut. Germ.

CEREFOLIVM ſylveſtre Rivini. Chærophyllum ſylveſtre perenne cicutæ folio Tournefortii. Myrrhis ſylveſtris ſeminibus lævibus C. B. P. 160. Myrrhis Fuchſ. hiſtor. 525. In pratis & pomariis frequens floret Majo & Junio. Germ. Kälber-Kropff, Kälber-Kern, Körbel-Kern.

SISARVM germanorum C. B. P. 155. Siſarum multis I. B. 3. part. 2. 153. Siſarum Dodon. Pempt. 681. Grützel, Görlein, oder Zucker-Wurtzel. In hortis floret æſtate.

CTNAPIVM Rivini & Tabernæmontani. Cicuta minor Petroſelino ſimilis C. B. P. 160. Cicutaria apii folio

lio I. B. part. 2. 179. Cicutaria ſata Lobel. icon. 280. In cultis & agris frequens: Floret Majo & Junio. Germ. Gneiß, Gleiß, Hunds-Peterſilien. Magnitudine multum variat, nam in dumetis aliquando triplo major occurrit eâ, quæ inter olera gignitur.

CICVTA major C. B. P. 160. Cicuta Dod. Pempt. 461. I. B. 3. part. 2. 175. Cum præcedente v. g. in denen Kohl-Gärten vor dem Johannes-Thore. Floret æſtate. Schierling, Wüterich.

CICVTARIA Riv. Cicuta aquatica Wepfferi. Sium erucæ folio C. B. P. 154. Sium oluſatri facie Lobel. in ſtagnantibus aquis cum præcedente, v. g. bey Wittenberg im Stadt-Graben, und im groſſen Luch beym Luthers-Brunnen; bey Leipzig im Stadt-Graben; bey Gießen hinter Walpern floret Jul. & Aug.

ANISVM officinarum. Aniſum herbariis ſemine majori C. B. P. 159. Aniſum veteribus I. B. 3. part. 2. 92. Aniſum vulgare Cluſ. Hiſt. 202. In agris bey Zwetzen und Erfurt floret æſtate. Tournefortius aniſum apiis admiſcuit. Aniß, Aniß-Saat.

APIVM paluſtre & apium officinarum C. B. P. 54. Apium vulgare ingratius I. B. 3. part. 2. 100. Eleoſelinum Dod. Pempt. 695. In ſcrobibus quandoque occurrit. An der ſaltzigen See bey Rulßdorff, floret Auguſto. Vix differt ab apio dulci, quod Germani cum Italis Celeri vocant; niſi quod forſan cultura gratius illud reddiderit; majus vero apium, radice craſſa, inſtar paſtinacæ, ab hoc omnino diverſum eſſe videtur. Celeri, Selleri, Waſſer-Peterlein.

APIVM hortenſe ſive Petroſelinum vulgo C. B. P. 153. Apium hortenſe multis, quod vulgo petroſelinum palato gratum planum I. B. 3. part. 2. 97. In hortis paſſim floret Majo & Jun. Peterlein, Peterſilgen.

APIVM criſpum. Krauße Peterſilien. In hortis cum præcedente, ſed rarius.

CORIANDRVM majus C. B. P. 158. Coriandrum Lobel. icon. 705. I. B. 3. part. 2. 89. In cultis & inter olera frequens floret æſtate. Coriander, Schwindel-Körner. Hujus plantæ olia fœtida ſunt, ſemina vero ſuaveolentia.

SIVM ſive apium paluſtre foliis oblongis C. B. P. 154. Sium umbelliferum I. B. 3. 172. In ſerobibus & foſſis. Floret Jun. Eppich, Merck, Waſſer-Merck.

SIVM latifolium C. B. Pin. 154. In paludoſis bey Halle und Wittenberg frequens; auch an der Unſtruth bey Lauchſtädt floret Jul.

SIVM aquaticum minimum ſupinum & J. Raj. hiſt. plant. univerſal. & P. Hermann. in rivulis & fontibus campeſtribus bey Steinmärck hinter Schiffenberg floret cum vulgari.

PIMPINELLA ſaxifraga major umbella candida C. B. P. 159. Tragoſelinum majus umbella candida Tournefort. inſtit. p. 309. Saxifraga hircina major I. B. 3. part. 2. 109. Ad ſepes & in ſylvis v. g. im Rauhenthale, floret Majo & Junio.

PIMPINELLA ſaxifraga major altera C. B. P. 159. Saxifragia hircina, minor, foliis ſanguiſorbæ I. B. 3. pag. 2. Tragoſelinum minus pimpinella minor Tabern. icon. 88. Cum præcedente.

PIMPINELLA ſaxifraga minor C. B. P. 160. Tragoſelinum minus Tournefort. Saxifragia hircina minima pimpinella criſpa Tragi I. B. 3. part. 2. 113. In apricis & aſperis tenui gramine veſtitis frequens floret æſtate.

PIMPINELLA tenuifolia Riv. Pimpinella ſaxifraga tenuifolia C. B. Pin. 160. auf der Wellmeſe und Forſt floret Auguſto.

II. *Seminibus nudis ternis.*

CARDAMINDVM majus. Cardamindum ampliori & majori folio Tournefortii inſtitut. p. 430. Viola Indica ſcandens, naſturtii ſapore, maxima odorata H. L. Bat. In hortis floret æſtate. Germ. Indianiſche Kreſſe, gelbe Ritter-Spohren, Capucinerle.

CARDAMINDVM minus & vulgare Tournefort. Naſturtium indicum majus C. B. P. 306. Naſturtium indicum folio peltato ſcandens I. B. 175. Cum præcedente.

III. Se-

III. Semine nudis Quinis.

GERANIVM Robertianum officinarum. Geranium robertianum I. viride & rubens C. B. P. 319. Geranium robertianum murale I. B. 3. 480. In muris, & opacis locis v. g. Im Stadt-Graben & ad ſepes in umbroſis floret Majo & Junio. Ruprechts-Kraut, St. Roberts-Kraut, Storch-Schnabel. Duplex eſt, viride & totum rubrum, præcipue ad muros & in ruderibus.

GERANIVM lucidum ſaxatile foliis geranii robertiani Raj. Synopſ. 218. Geranium lucidum ſaxatile. C. B. P. 318. Geranium lucidum I. *B.* 3. 481. Geranium rotundifolium ſaxatile, montanum Col. part. I. 137. in umbroſis & difficilibus petris v. g. bey Halle unter dem Giebigenſteiniſchen Schloß-Felſen, inter frutices ad petræ radices, in des Amtmanns Garten. Figura vid. in Thalii ſylva Harcynia a D. Camerario edita, nec non in ejusdem Epit. Matthioli pag. 298. Sub nomine Geranii ſaxatilis. Hic Knauthius notari meretur, qui plantas circa Halam Saxonum obvias, plane neglexit, cujus teſtis ſit hæc planta, nec non alyſſum foliis veronicæ, & glaux flore cœruleo.

GERANIVM cicutæ folio moſchatum C. B. P. 319. Geranium ſupinum Dod. Pempt. 63. In horto medico floret æſtate.

GERANIVM cicutæ folio minus & ſupinum C. B. P. 319. Geranium folio ad myrrhidem accedente, minus I. B. 3. 479. Geranium minus, geranium arvenſe Tabern. icon. 57. Frequens occurrit in arvis; & ad ſepes in apricis floretque Aprili & Majo. Flore albo quandoque variat in aggeribus, wo man von Erfurthiſchen Thore nach der Mühlen zu gehet.

GERANIVM batrachoides paluſtre flore ſanguineo Hoffm. in Flor. Altorf. deliciis ſylv. VII. Hæmatodes alterum foliis batrachoides Geranii Cluſ. Floret Jul. & frequens in alnetis Ammerbachii & officinæ lateritiæ.

GERANIVM latifolium longiſſima acu *C. B.* P. 319. Geranium ſpecioſum annuum longiſſimis roſtris, creticum I. *B.* 3. 479. Geranium creticum annuum hæmatodes.

Lobel. icon. 662. In horto medico floret Majo & Junio, & hinc in autumnum usque.

GERANIVM africanum arborescens ibisci folio rotundo, Cartinæ odore H. L. Bat. In hortis floret æstate.

GERANIVM africanum alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis H. L. Bat. Cum præcedente. Hujus rostræ deorsum spectant.

GERANIVM africanum, foliis inferioribus asari, superioribus staphydos agriæ, maculatis, splendentibus, acetosæ sapore Comm. Præl. 52. In hortis floret æstate.

GERANIVM africanum, arborescens, folio malvæ, plano, lucido, glabro, flore kermesino Dom. van Leur apud Bœrhave in indice plantarum hort. med. Lugd. Batav. p. 109. In hortis floret æstate.

GERANIVM triste, sive indicum noctu olens Parkinson theatr. 709. Geranium triste Cornuti 110. In hortis floret æstate.

GERANIVM africanum, maximum rotundis crassis foliis, floribus coccineis. Cum præcedentibus.

IV. Seminibus tectis capsula.

(1.) SIMPLICI.

VIOLA officinarum. Viola martia, purpurea, flore simplici odoro C. B. P. 199. Viola martia, purpurea, I. B. 2. 542. Viola nigra sive purpurea Dodon. Pempt. 156. Ad sepes in umbrosis, & in pomariis sub arboribus floret Martio. Mertz-Viole, blaue Mertz-Violen.

VIOLA martia, inodora sylvestris foliis majoribus & rotundioribus C. B. P. 199. Viola cœrulea, martia inodora, sylvatica, in Cacumine semen ferens I. B. 3. 543. Viola sylvestris inodora Dod. Pempt. 156. In pratis & sylvis floret præcedente paulo serius Hunds-Violen.

VIOLA martia, inodora, sylvestris foliis mucronatis, oblongis & strictioribus C. B. P. 199. In sylvis floret Martio & Aprili.

VIOLA

VIOLA ſylvatica inodora flore purpureo, cum præcedente im Rauhenthale.

VIOLA ſylvatica, latifolia, flore amplo dilute cæruleo, odorata. Im Rauhenthale, floret Martio & Aprili.

VIOLA martia alba C. B. P. 199. Tabern. icon. 101. Viola martia flore albo odorato & non odorato I. B. 3. cum vulgari nigra martia viola ad ſepes floret.

VIOLA rotundifolia, floribus pallide cæruleis, odoratis. Im Rauhenthale floret Martio.

VIOLA inodora, floribus variegatis, ſive ex albo & cæruleo mixtis. Ad ſepes, wo man nach dem Sachſen-Hölzgen und dem Rauhenthale hinauf gehet.

VIOLA paluſtris, folio trachelii glabris bey Hanſpitzen in paludoſis & muſcoſis cum rorella iſt auch häuffig bey Wittenberg cum hydrocotyle. vid. Moriſon & Merret in pinace rer. natural. Britannic.

VIOLA paluſtris, anguſtis Perſicæ foliis mucronatis, & ſerratis, nondum deſcripta. Iſt häuffig auf ſumpffigten Wieſen bey Leipzig, nicht weit von der Funcken-Burg, floret Aprili.

VIOLA martia multiplici flore purpureo. C. B. P. 199. Viola martia purpurea, flore multiplicato majore. I. B. 2. 542. Viola flore multiplici Dod. Pempt. 156. In hortis & hybernaculis plantarum floret cum vulgari, ſimplici.

VIOLA alpina, apetalos, foliis rigidis, rotundis, amplis. In montibus paſſim. Staminibus & embryonibus frequentiſſime onuſtam reperi menſe Aprili & Majo: Petala vero hactenus obſervavimus nulla, quæ tamen huic violæ genuinæ ſpeciei non facile denegaverimus.

VIOLA tricolor, hortenſis repens an φλὲξ καὶ φλόγιον Theophraſti C. B. P. 1995. Jacea tricolor, ſive Trinitatis flos I. B. 3. 548. Viola tricolor Dod. Pempt. 158. In hortis paſſim floret rota æſtate. Iſt auch wild auf denen ſandigten Aeckern zwiſchen der neuen Schencke und Zöllnitz, auch bey Wittenberg. Germ. Dreyfaltigkeits-Blume, Freiſam-Kraut. Florum colore multum variat.

VIOLA bicolor, arvenſis, flore candido & luteo C. B. P. 200. Viola bicolor frugum & hortorum vitium Trago I. B. 548. Viola ſylveſtris Lobel. icon. 611. In agris, & cultis hortorum paſſim floret toto fere anno.

RESEDA vulgaris C. B. P. 100. Reſeda lutea. I. B. 3. 467. Reſeda Plinii Neotericorum, Belgis eruca peregrina, italica vel cantabrica Lobel. icon. 222. In vineis & muris paſſim floret tota æſtate.

RESEDA foliis Calcitrapæ, flore albo Moriſon. H. R. Bleſ. In horto medico floret cum præcedente.

LVTEOLA herba, ſalicis folio C. B. P. 100. Lutea Plinii quibusdam. I. B. 3. 465. Lutum herba Dodon. Pempt. 80. In campeſtribus ad ſcrobes paſſim floret tota æſtate. Germ. Streich-Kraut.

LVTEOLA foliis criſpis, cum præcedente. Non adeo conſtans eſt numerus petalorum in floribus reſedæ & luteolæ, uti inſpicienti patebit.

(2.) TRIPARTITA.

NAPELLVS flore luteo Rivini. Aconitum lycoctonum, luteum C. B. P. 183. Aconitum folio platani, flore luteo palleſcente I. B. 3. 652. Aconitum lycoctonum, luteum majus Dod. Pempt. 439. In ſylvis v. g. in denen Holtz-Schlägen gegen dem Rauhenthale über floret Majo & Jun. Germ. Wolffs-Wurtz.

NAPELLVS flore cœruleo Rivini. Aconitum cœruleum ſeu napellus I. C. B. P. 183. Aconitum magnum purpureo flore vulgo Napellus I. B. 3. 655. Napellus Dod. Pempt. 44. In hortis floret æſtate. Narren-Kappen, Munchs-Kappen, Eiſen-Hütlein. Napellus fl. cœruleo florem habet quoad ſtructuram petalorum, & corniculorum illorum geminorum aliquatenus diverſum, a napello fl. luteo vid. Knauthius.

DELPHINIVM ſegetum, flore cœruleo Tournefort. inſtit. 426. Conſolida regalis, arvenſis flore cœruleo. C. B. P. 142. Conſolida regalis, flore minore I. B. 3. 210. In agris inter ſegetes paſſim floret æſtate. Germ. Ritter-Sporen.

DEL-

DELPHINIVM elatius purpuro violarum diſtinctum, ut & flore pleno, variegatum du Bry. In hortis floret æſtate.

DELPHINIVM vulgare, flore multiplici Tournefortii. In hortis floret æſtate.

DELPHINIVM hortenſe flore majore & multiplici cæruleo, incarnato & purpureo Tournef. In hortis cum præcedentibus. Delphinium eſſe florem illum, de quo Virgilius: Dic quibus in terris naſcantur flores inſcripti nomina Regum &c. multi opinantur; nec non ejusdem vaccinia nigra; quamvis aliqui vaccinia pro hyacintho habeant, præſtat tamen hanc plantam & pro vaccinio, & pro hyacintho Poetarum habere; vid. Matthiolus a *C. B.* editus, & Cl. Salmaſii exercitationes Plinianæ in Solinum.

HIPPOCASTANVM Tournefortii & Rivini. Caſtanea folio multifido. *C. B.* 1, 128. Caſtanea equina, folio multifido I. *B.* 1. 128. Caſtanea equina Dod Pempt. 814. Roß-Caſtanien. In hortis floret Majo & Junio.

CLASSIS XIII.

DE PLANTIS FLORE IRREGVLARI PENTAPETALO GAVDENTIBVS ET CAPSVLA QVINQVEPARTITA.

FRAXINELLA & Dictamnus albus officin. Dictamnus albus vulgo, ſive fraxinella *C. B.* P. 222. In montoſis ſylvis atque cæduis, v. g. auf dem Cunitzer-Berge und Tautenburgiſchen Forſte. Floret Majo & Junio. Germ. weiſſer Diptam oder Dictam, gemeiner Diptam, Aſcher-Wurtz.

FRAXI-

FRAXINELLA flore albo, cum præcedente, ſed rarius.

PTROLA rotundifolia major *C. B.* P. pag. 191. Pyrola vulgatior, Cluſ. hiſt. Pyrola officinarum. Germanis Wintergrün, Wald-Mangold, Holtz-Mangold ꝛc. In ſylvis vaſtioribus variis in locis, v. g. auf der Wellmeſe, hinten nach Prießnitz, und auch nach Rüttersdorff zu, floret Jun.

PTROLA major & elatior, foliis oblongis, piſtillo florum incurvo; cum præcedente; iſt ſehr häuffig auf dem Stoppel-Berge bey Gießen; floret Jun.

PTROLA rotundifolia minor. Hujus meminit Car. Cluſ. in hiſt. ſtirpium per Panuon. pag. 504. 505. in denen Tannen- und Fichten-Wäldern bey Altenbergen, cum hypopitide & pſeud-orchide, radice repente, floret Jun.

PTROLA minima vel 4ta Cluſii pann. & hiſt. Pyrola minima horti Eyſtett. Pyrola rotundifolia minor *C. B.* Pin. 191. in ſylvis nach der Leuchten-Burg zu, auch in pinetis bey Wittenberg und Coßwig; floret Jun.

PTROLA folio mucronato Rivini. Pyrola folio, mucronato, ſerrato C. B. P. 191. Pyrola 2. & tenerior Cluſii Pann. & Hiſtor. Frequens occurrit in ſylvis v. g. bey Rüttersdorff, Kleine und Schleſreiſen, auch auf dem Fuchs-Berge; floret cum præcedentibus.

PTROLA fruteſcens arbuti folio C. B. P. 191. Pyrola fruteſcens ſive 3. Cluſ. Pannon. & Hiſtor. cum præcedentibus, præcipue in pinetis bey Schieblau und Bockert, auch bey Laaßdorff, it. bey Altenbergen in denen Wäldern; floret cum præcedente.

PTROLA flore viridi C. Schefferi & Knauthii, in enumeratione plantarum circa Halam Sax. floret cum præcedente in ſylvis bey Altenbergen, und nach Halle.

CLAS-

CLASSIS XIV.

DE PLANTIS FLORE IRREGVLARI HEXAPETALO GAVDENTIBVS.

CALCEOLVS. Calceolus marianus Dodon. Pempt. 180. Helleborine flore rotundo, ſive calceolus *C. B.* P. Damaſonii ſpecies quibusdam, ſive Calceolus *C. B.* P. 187. Damaſonii ſpecies quibusdam ſive Calceolus B. Mariæ I. *B.* 3. 518. In nemoribus & ſylvis v. gr. auf dem Forſt und im Rauhenthale. Floret Majo & Junio. Marien-Schuch, oder Marien-Schüchlein.

DAMASONIVM flore albo Rivini. Helleborine flore albo, vel Damaſonium montanum latifolium *C. B.* P. 187. Damaſonium alpinum, ſive Elleborine floribus albis I. *B.* 3. 516. Helleborine albo flore Tabern. icon. 724. In ſylvis & montibus v. gr. auf der Wellmeſe floret Majo & Junio.

DAMASONIVM flore rubro Rivini. Helleborine montana, anguſtifolia, purpuraſcens *C. B.* P. 187. Damaſonium purpureum, dilutum, ſive Elleborine IV. Cluſii I. *B.* 3. 16. Helleborine recentiorum IV. Cluſ. hiſt. Pann. 275. In ſylvis floret Jun.

HELLEBORINE Rivini. Helleborine latifolia montana *C. B.* P. 186. Elleborine Dod. I. *B.* 3. 516. Helleborine Dod. Pempt. 384. In montibus & dumetis v. g. im Rauhenthale und bey Prießnitz floret Majo & Jun.

HELLEBORINE anguſtifolia paluſtris ſive pratenſis *C. B.* P. 187. Damaſonium, flore herbaceo, intus nonnihil candicante I. *B.* 3. 517. Elleborine recentiorum III. Cluſ. hiſtor. 273. Helleborine paluſtris noſtras Raj. hiſt. plant. In pratis uliginoſis cum carice juncisque montanis

nis v. g. gegen dem Fürſten-Brunnen über, und zwiſch dem Cunitzer Berge und Jentzig, auch in der Zißke; flor ret Majo & Jun.

HELLEBORINE altera atro-rubente flore *C. B.* P. 18 alisma botryoides ſeu racemoſum Thalii. In montoſis pricis ſylvis v. g. in dem Walde bey Coſpida floret Majo Jun. magnitudine variat.

HELLEBORINE ſylvatica radice repente. Pſeudoo chis *C. B.* P. Orchis minor radice repente Camerar. I nemoribus bey Schiblau und Buckert, und häuffiger i den hohen Fichten Wäldern hinter Altenbergen, cum hy popytide & omnibus Pyrolæ ſpeciebus floret Jun.

HELLEBORINE ſylvatica radice repente foliis teſſella tim variegatis, cujus figura videatur apud Menzelium; cum præcedente, bey Schiblau und Altenbergen.

OPHRYS ſive Ophris. Ophris bifolia *C. B.* P. 87. Bi folium majus, ſive ophris major quibusdam. I. *B.* 3. 533. Pſeudoorchis, bifolium Dodon. Pempt. 242. Zwey-Blat, Ratten-Schwantz. In montibus & ſylvis paſſim floret Majo & Junio. v. g. im Rauhenthale. Ternis foliis quandoque ludit.

OPHRYS minor alpina. vid. Joh. Bauhinus in Hiſtor. plant. univerſal. in montibus altiſſimis, v. g. auf dem Enſels-Berge und auf dem Brocker floret Jul.

NIDVS avis Lugd. 1073. Orchis abortiva fuſca C. *B.* P. 86. Orobanche affinis, nidus avis. I. *B.* 2. 782. In nemoribus opacis v. g. auf dem Tautenburgiſchen Forſte, und der Wellmeſe floret Majo & Jun. vulgo die nackende Orchis dicitur. Magnitudine variat.

ORCHIS maſcula Rivini. Orchis latifolia hiante cucullo, major C. *B.* 80. Orchis galea & alis fere cinereis I. *B.* 2. 755, Satyrium tryphyllon Tabern. icon. 675. In montoſis v. g. auf dem Forſte bey Wöllnitz, und auf der Tannicht-Wieſe bey Prießnitz, floret Majo & Junio. Knaben-Kraut, Guckucks-Blume. German.

ORCHIS militaris major Rivini. Orchis magna, latis foliis, galea fuſca vel nigricante Chabr. 248. im Rauhenthale,

Orchis miliſar
minima Rivin

II.

Orobanche Spuria
ſive Corallorhiza.

thale, und im Walde bey Jena-Prießnitz floret Majo & Junio.

ORCHIS militaris minor & minima Rivini. Orchis militaris pratenſis, humilior Tournefortii. Orchis parvis floribus multis punctis notatis, an Cluſio orchis pannonica quarta? I. B. 768. In pratis montoſis ſylvarum, v. g. auf der Pfingſt-Wieſe bey Jena-Prießnitz, und hinter der Riet-Wieſe bey Jena-Prießnitz oben im Walde.

ORCHIS ſpica conglobata Rivin. Orchis militaris montana ſpica rubente, conglomerata Tournefortii. Cynoſorchis militaris montana, ſpica rubente, conglomerata C. B. P. 81. Prodr. 28. ut & orchidis genus parvum, flore prorſus purpureo, odoris ſuaviſſimi Chabr. 249. Hæ duæ orchides non differunt ſpecie, uti figuram D. Rivini & Joh. Bauh. conferenti & ad gemellas illas apophyſes rictum occupantes attendenti patebit. vid. & Rajus in hiſt. plantarum. In montoſis ſylvis v. g. auf dem Forſte, und über Jena-Prießnitz floret Majo & Jun.

ORCHIS odore hirci, breviore latioreque folio. C. B. P. 82. ut & Orchis odore hirci, longiore anguſtioreque folio C. B. P. 82. Orchis barbata fœtida I. B. 2. 756. Teſticulus hircinus Tabern. icon. 672. In pratis & ſylvis montoſis v. g. über Jena-Prießnitz, auch wo man nach der Diebes-Krippen gehet. Floret Majo & Jun.

ORCHIS odore hirci minor C. B. P. 82. Tragorchis minor flore fuliginoſo I. B. 2. 764. Tragorchis minor & verior, ſive corioſmites vel coriophora, flore inſtar cimicum Lobelii icon. 177. In pratis aridioribus frequens v. g. wo man nach Cunitz gehet, floret Majo & Jun.

ORCHIS fœtida, ſylvatica, præcox flore albo barba luteola; an orchis ornithophora, candida Chabr. pag. 249? Im Rauhenthale, auch auf der Wellmeſe, floret Aprili.

ORCHIS morio mas, foliis maculatis C. B. P. 81. Orchis major, tota purpurea, maculoſo folio I. B. 2. 973. Teſticulus Morionis mas Dod. Pempt. 236. Orchis delphinia, maculoſis foliis, flore purpuro-violaceo. Lobel. apud Chabr. p. 248. In ſylvis v. g. im Rauhenthale, und auf dem Cunitzer Berge floret Majo & Junio; Flore albo quando-

quandoque variat, quæ orchis flore niveo & versicolore quorundam.

ORCHIS morio foliis sessilibus maculatis C. B. P. 82. Pro hujus synonymo Tournefort. allegat orchidem delphiniam maculosis foliis I. B. sed frustra, cum hæc delphinia orchis maculas habeat magnas, per totam folii superficiem dispersas; hæc vero nostra, foliis sessilibus, maculas exiguas gerat, nonnisi ad radicem, ubi folia ex terra oriuntur, conspicuas instar fuscorum violaceorumve punctorum, quod D. Rivinus olim figura nitida expressit, sub nomine palmatæ majoris; radicem enim plantæ, ab alio sine radice allatæ, nondum viderat; floret cum præcedente.

ORCHIS spiralis, alba, odorata. I. B. 2. 769. Triorchis alba odorata, minor C. B. P. 84. Testiculus odoratus sive orchis spiralis Lobell. icon. 186. auf der Walters-Wiesen, auch auf denen Wiesen bey Thal-Bürgel. Floret Augusto & Sept. Hassis rusticis dicitur Herumdrath, weil sich die Blumen am Stengel herum drehen, wie eine Wendel-Treppe.

TRIORCHIS minor lutea, Caroli Gemmæ apud Lobelium. Auf denen Wiesen bey Steinbach, hinter dem Giesser Walde floret Aprili & Majo.

ORCHIS odorata moschata, sive Monorchis C. B. P. Orchis pusilla, pallida, odorata vel 6. Clus. pannon. pag. 239. aut 7. In histor. Orchis parva autumnalis lutea Chabr. p. 252. Auf der Walters-Wiesen bey Laaßdorff floret Jul. & Augusto. An bifolium bulbosum quorundam? vid. I. B. & Menzel.

ORCHIS myodes, galea & alis herbidis Chabr. p. 257. Orchis muscæ corpus referens, minor, galea & alis herbiyis & orchis serapias tertia Dodon. & myodes I. Lobell. I. B. 2. 767. Orchis myodes prima, floribus muscam exprimens Lobel. icon. 181. In montosis asperis v. g. nach Cospida, und dem Rauhenthal zu floret Majo & Jun.

ORCHIS foliis sessilibus non maculatis C. B. P. 82. Orchis minor, purpurea & aliorum colorum, cum alis virentibus I. B. 2. 761. Orchis colore vario vel 5. Clusii pag. In asperis apricisque nach der neuen Schencke und Rothe

zu

zu floret Majo. Floris colore variat qui aliquando roſeus, aliquando niveus & verſicolor, communiter purpureus vel atrorubens eſt; galeà tamen & alæ ſemper & ubique virent.

ORCHIS fucum referens, colore rubiginoſo C. B. P. 83. Orchis, ſive teſticulus, ſphægodes, hirſuto flore I. B. 2. 767. teſticulus vulpinus ſecundus ſphægodes Lobel. icon. 179. In aſperis v. g. auf dem Cunitzer-Berge, auch in verſtöhrten Wein-Bergen nach Tautenburg zu. Floret Majo & Junio.

SATYRIVM Rivini. Orchis bifolia, latiſſima C. B. P. 22. Orchis ampliſſima, foliis binis ſplendentibus I. B. 2. 771. Orchis I. ampliſſimis foliis Cluſ hiſt. 267, latifolia maxima ſive I. Pan. 237. In ſylvis paſſim v. g. im Rauhenthale, und bey Coſpida, floret Majo & Junio. Ab hac minime differt niſi magnitudine, (quæ loci natalis diverſitati debetur:) Orchis bifolia altera C. B. P. 82. ut & orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. C. B. P. 83. teſticulus leucanthemus Camerarii in Matthiol. p. 303. Nec diſtat Orchis trifolia major nec eadem minor C. B. P. In apricis enim & aſperis talis occurrit v. g. in collibus zwiſchen Lobada und der neuen Schencke floretque cum ſylvatica. Orchis differt a ſatyrio radicibus minus rotundis, ſed potius napiformibus, quæ tamen nota eſſentialem ex flore & fructu petendum characterem vix conſtituit; ſed ſaltim ad genera ſubalterna diſtinguenda conducit.

PALMATA anguſtifolia maculata Rivini. Palmata fœmina flore rubro vel dilute purpureo, folio maculato Chabr. p. 254. Auf dem Forſt cum rapunculo corniculato, ſpica breviore bey denen ſteinigten Gruben auf den ſo genannten Tatzend, item auf der Wellmeſe nach den Lufft-Schiffe hin, floret Junio. NB Hæc planta inſigniter variat, non ſolum foliorum maculis, quæ aliquando ſunt nullæ, ſed & floris colore, qui aliquando eſt purpuraſcens, punctis majoribus minoribuſque diſtinctus, aliquando plane niveus.

PALMATA anguſtifolia non maculoſa Rivini. Orchis palmata pratenſis anguſtifolia minor, flore odoratiſſimo

C. B. Prodr. p. 30. ut & orchis palmata montana maxima. C. B. Prodr. p. 31. In ſylvis, pratis & vineis v. g. auf dem Fuchs-Berge und Wellmeſe floret Majo & Junio. Flore rubro carneo & albo variat. Ab hac forſan non differt palmata rubella cum longis calcaribus Chabræi p. 256.

ORCHIS palmata ſambuci odore, floribus ex albidis & purpureis C. B. P. 86. Orchis pannonica octava Cluſ. Hiſt. 269. Orchis 7. ſive Serapias Cluſ. Pin. pag. 239. Hanc Rivinus quondam ſatyrium flore luteolo appellavit, at non habet radicem napiformem, ſed palmatam, quamvis paucioribus digitis diſſectam. Auf dem Forſt floret Aprili & Majo. Flore albo & purpureo variat, uti recte obſervavit Cluſius.

ORCHIS palmata pratenſis maxima C. B. P. 85. Cynoſorchis macrocaulos ſive conopſea, ſeu galericulata Caroli Gemmæ Lobel. icon. 192. Palmata, ſeu cynosorchis macrocaulos galericulata Caroli Gemmæ I. B. 2. 177. In pratis udis floret æſtate. Zwiſchen Wöllnitz und dem Fürſten-Brunnen, auch nach Altenbergen hin.

ORCHIS palmata, paluſtris, latifolia C. B. P. 86. Palmata, ſive ſerapias paluſtris flore albo ſubpurpuraſcente J. B. 3. 775. Floris colore variat; Hinc palmata ſerapias paluſtris ſeptophylla violacea maculata & non maculata I. B. 3. 776. In pratis uliginoſis v. g. im groſſen und kleinen Paradieße floret Jun.

ORCHIS palmata flore vividi inſtar floris ophryos in petulo inferiori & propendente biſecto. Orchis palmata flore viridi C. B. in Prodr. pag. 30. Palmata ejusdem icon. apud I. B. in Hiſt. Plant. hanc plantam pulchre exprimit. In ericetis & paſcuis beym Dorff Meckern, floret Jul.

OROBANCHE ſpuria ſeu corallorrhiza. Orobanche radice coralloide C. B. P. p. 88. Dentaria aphyllos tertia Cluſ. panon. pag. 449. Dentaria coralloide radice Cluſ. Hiſt. & Pan. pag. 450. In nemoribus denſis & opacis v. g. gegen dem Fürſten-Brunnen über floret Majo & Jun. Et hujus plantæ flos eſt irregularis hexapetalus, non ſecus ac totius claſſis, unde hactenus male modo ad Orobanchen, modo ad Dentariam relata fuit.

Hactenus

Hactenus abſolvimus plantas flore perfecto, tam regulari, quam irregulari, gaudentes. Sequuntur nunc in ordine PLANTÆ FLORE IMPERFECTO GAVDENTES, hoc petalis deſtituto, inter quas merito Cereales & his congenera gramina agmen ducunt. Sit itaque primo

CLASSIS XV.

DE PLANTIS FLORE IMPERFECTO STAMINEO GAVDENTIBVS.

TRITICVM hybernum ariſtis carens C. B. P. 21. Triticum vulgare glumas triturando deponens I. B. 2. 407. In agris paſſim floret æſtate. Weitzen, & a tempore ſationis dicitur Winter- oder Sommer-Weitzen.

TRITICVM ſpica multiplici C. B. P. 21. Triticum cum multiplici ſpica, glumas facile deponens I. B. 2. 407. Triticum multiplici ſpica Lobel. icon. 26. In agris cum præcedente v. g. wenn man nach dem Fürſten-Brunnen von Wöllnitz hinauf gehet. Plures ſpecies interdum etiam hic occurrunt, quæ german. dicuntur Wechſel-Weitzen, Kroll-Weitzen, Dünckel-Weitzen.

TRITICVM typhinum, ſimplici folliculo C. B. P. 29. Triticum cinereum, maximis ariſtis donatum, triturando glumas deponens I. B. 2. 408. In agris cum præcedentibus flore æſtate.

TRITICVM æſtivum. C. B. P. 21. In agris ſatum floret cum præced. ſed paulo ſerius. Sommer-Weitzen.

TRITICVM rufum hexaſtichon C. B. P. 21. Bey Arnſtadt nach dem Thüringer-Walde zu copioſe ſeritur ad ferarum irruptiones moleſtas evitandas; ſiquidem propter ariſtarum ſuarum aſperitatem & acumena pungentia ipſis infenſum ſit.

SECALE hybernum majus C. B. P. 23. Secale I. B. 2. 416. Rogga ſive ſecale Dodon. Pempt. 499. In agris paſſim floret æſtate. Korn, Rocken.

HORDEVM polyſtichum hybernum C. B. P. 22. Hordeum polyſtichum I. B. 2. 429. In agris paſſim floret æſtate. Gerſten.

AVENA vulgaris ſive alba C. B. P. 23. Avena alba I. B. 2. 432. Avena Dod. Pempt. 511. In agris paſſim floret æſtate. Haber.

AVENA ſemine nigro cum præcedente.

AVENA elatior, panicula propendente; cum præcedente, v. g. bey Schmohna und am Thüringer-Walde, ubi türckiſchen Haber.

MILIVM ſemine luteo C. B. P. 26. Milium I. B. 2. 446. In agris paſſim floret æſtate. Hirſe, rother Hirſe, oder Hirſchen.

MILIVM ſemine albo C. B. P. 26. Raj. hiſt. 125. In agris cum præcedente.

MILIVM ſemine nigro C. B. P. 26. Millium ſemine nigro ſpadiceove I. B. 2. 446. Milium nigrum Tabern. icon. 278. In agris cum præcedentibus circa pagos. Schwartzer Hirſen, Spraal-Hirſen.

PANICVM germanicum ſive panicula minor flava. C. B. P. 27. In agris, ſed rarius. Fench, Fönich, Fuchs-Schwantz.

PANICVM vulgare, ſpica multiplici, aſperiuſcula Tournefort. inſtit. 515. Gramen paniceum ſpica diviſa C. B. P. 8. Graminis genus quibusdam, Gallis dens canis 2. ſive paniceum ſylveſtre, panicula diviſa I. B. 2. 443. Panicum ſylveſtre Tabern. icon. 279. In ſcrobibus juxta vias v. gr. nach Lobada und Löbſtädt zu, iſt auch auf der Inſul unter denen oleribus; floret æſtate.

PANICVM vulgare, ſpica multiplici, longis ariſtis circumvallata Tournefort. inſtit. p. 515. Gramen paniceum, ſpicâ ariſtis longis armatâ C. B. P. 8. Gramen paniceum II. Tabern. icon. 228. In ſcrobibus cum præcedente. v. gr. wo man über die Wieſen an denen Gräben nach Löbſtädt gehet.

PANI-

PANICVM vulgare, ſpica ſimplici & aſpera Tournef. inſtit. Gramen paniceum, ſpica ſimplici C. B. P. 8. Panicum ſylveſtre dictum, & dens canis I. B. 2. 443. Gramen geniculatum Tabern. icon. 200. In agris cultis und im Zwinger beym Löber-Thore floret æſtate. Wildmanns Graß, wilder Fenich.

PANICVM vulgare, ſpica ſimplici, & molliori Tournef. inſtit. 515. Gramen paniceum ſpica ſimplici & lævi Raj. Hiſt. 1261. In agris cum præcedente. Wilder Hirſe, ut & præcedens.

PANICVM maritimum, ſpica longiore. Villoſa Tournef. inſtit. p. 515. Gramen alopecuros minus, ſpica longiore C. B. P. 4. Cauda vulpis Monſpelienſium, alopecuros Theophraſti Lobel. icon. 45. In horto medico floret æſtate. vulgo Fuchs-Schwantz Graß.

GRAMEN loliaceum radice repente, ſive gramen officinarum Tournefort. inſtit. 516. Gramen caninum, arvenſe, ſive gramen Dioſcorid. C. B. P. 1. Gramen repens officinarum forte triticeæ ſpicæ aliquatenus ſimile I. B. 2. p. 457. Gramen Dod. Pempt. 558. In agris nimis frequens, ubi agricolæ quotannis aratro eruunt, adeo ut ipſius ſpica rariſſime conſpiciatur. Spica ariſtata quandoque variat.

GRAMEN loliaceum, ſpica longiore, ariſtas habens C. B. P. 9. Lolium gramineum, ſpicatum, caput tentans I. B. 2. 437. Inter ſegetes paſſim nimis frequens floret æſtate. Germ. Lülch, Treſpen.

GRAMEN loliaceum, ſpica longiore, ſine ariſtis C. B. P. 9. Cum præcedente.

GRAMEN loliaceum, anguſtiore folio & ſpica C. B. P. 9. Phœnix lolio ſimilis I. B. 2. 436. Phœnix ſive lolium murinum Dodon. Pempt. 540. Ad pratorum ſemitas, & agrorum margines, & ſecus vias publicas floret æſtate; quandoque ariſtatum occurrit, quod Tournef. annotavit; quin & ſpicis brevioribus, latioribus & compreſſis variat, quod Moriſon. in Hiſt. oxonienſi part. 1. 320. annotavit; nec non aliquando ſpicas ramoſas, & quaſi multiplices gerens occurrit, quod Parkinſon. in Theatro p. 1145. obſervavit;

vavit; in pratis juxta ſemitas magis tritas paſim occurrit. v. gr. im kleinen Paradieße.

GRAMEN loliaceum, corniculatum, ſpicis glabris Tournefort. In aſperis & apricis bey Ober-Wöllnitz, neben dem hohen Fahr-Wege frequens floret æſtate.

GRAMEN latifolium ſpica triticea compacta C. B. Prodr. p. 17. Gramen avenaceum dumetorum ſpicatum Raj. hiſtor. 1262. Gramen loliaceum, corniculatum, ſpicis villoſis Tournef. inſtit. p. 506. An Hecken v. g. im Fürſten-Garten & alibi floret æſtate.

GRAMEN loliaceum nemorenſe latifolium hirſutum, im Rauhenthale, und auf dem Forſte nach Müncherode hin. Floret Majo circa feſtum Joh. vid. Raj. hiſt. plant.

GRAMEN loliaceum minimum foliolis junceis paniculam unam partem ſpectante Tournefort. inſtit. p. 517. Gramen ſparteum juncifolium C. B. P. 5. Spartum parvum Lobelio I. B. 2. 513. Spartum noſtras, parvum Lobel. icon. 90. Spartum noſtras, parvum, gramen ſparteum, juncifolium Lobelii; Chabr. p. 192. In formicarum acervis & ericetis nach Rode zu floret æſtate.

GRAMEN loliaceum altiſſimum, ſpica brizæ perlonga, ariſtis brevibus donata Tournefort. inſtit. p. 517. Gramen ſpica brizæ majus C. B. P. 9. prodr. 19. In aſperis & apricis ſoli meridiano expoſitis, v. g. auf dem rauhen ungebauten Fuchs-Berge, und ſonſt anderswo floret æſtate; magnitudine variat, hinc

GRAMEN ſpica brizæ minus C. B. Prodr. 19. cum præcedente.

GRAMEN loliaceum minus, ſupinum, ſpica multiplici C. B. Prodr. 19. In aridis, apricis gramineis locis provenit v. g. in den Triften zwiſchen Querfurth und Wendelſtein; auch bey Camsdorff, und an denen Wegen nach dem Forſte zu hinter dem Galgen ad ſemitas, floret æſtate.

GRAMEN Secalinum, pratenſe & elatius Hiſt. oxon. In pratis des groſſen Paradießes paſim biß nach Lobeda und Wöllnitz hin floret æſtate.

GRAMEN ſpicatum vulgare, ſecalinum Tournefort. inſtit. p. 517. Gramen hordeaceum, minus & vulgare C. B. P.

B. P. 9. Hordeum murinum I. *B.* 2. 431. Hordeum ſpontaneum ſpurium, Holcus Plinii Anguillaræ Lobel. icon. 30. Ad muros, ſepes, & in ruderatis frequens, floret æſtate.

GRAMEN ſecalinum majus ſylvaticum D. Bobart. im Rauhenthale floret Jun.

GRAMEN ſpicatum, ariſtis pennatis Tournefort. inſt. p. 518. Gramen Sparteum, pennatum C. *B.* P. 5. Gramen pennatum, aliis ſpartum I. *B.* 2. 512. Gramen plumeum Mont. Phytogr. Fig. 173. In aſperis & apricis v. gr. auf dem Hauß- und Cunitzer-Berge floret Junio. Cluſius in hiſtoria CCXXI. ſpartum auſtriacum, pennatum vocavit. Germ. Marien-Flachs.

GRAMEN ſerotinum ſpica lax a caneſcente, Joh. Raji cum præcedente, floret æſtate.

GRAMEN ſpicatum, ſparteum, ſpica ſericea, ex utriculo prodeunte Tournefort. inſtit. p. 518. Gramen ſparteum ſecundum panicula brevi folliculo incluſa C. *B.* P. 5. In aſperis & apricis paſſim floret æſtate, v. g. wo man nach Wollnitz und den Fürſten-Brunnen gehet.

GRAMEN anthoxanthon, ſpicarum I. *B.* 2. 466. Gramen pratenſe, ſpica flaveſcente C. *B.* P. 3. Gramen anthoxanthon Dalechampii Lugdun. 426. In pratis v. g. im kleinen Paradieße floret Aprili & Majo; ſpicæ magnitudine & craſſitie variat. Semina habet fuſca lanugine obducta, & ariſtis brevibus recurvis donata, non ſecus ac ægylops arvenſis, ad quem pariter referri poſſet.

GRAMEN ſpicatum, glumis variis Tournefort. inſtit. 519. Gramen glumis variis C. *B.* P. 10. Prodr. 21. Gramen verſicolor I. B. 2. 466. In aſperis & apricis floret Martio & Aprili; Spicas habet nitidas quaſi cœruleas, & amplis ex cæſpitibus, quos occupat plurimas gignit ſpicas im Rauhenthale.

GRAMEN ſpicatum ſemine miliaceo albo Tournefort. inſtit. 518. Phalaris major ſemine albo C. B. P. 28. Phalaris I. B. 2. 442. Phalaris Dod. Pempt. 510. In agris ſatum paſſim floret æſtate. Germani Canarien-Saat vocant; quia paſſeres canarienſes hujus ſemine alunt.

vavit; in pratis juxta ſemitas magis tritas paſſim occurrit. v. gr. im kleinen Paradieße.

GRAMEN loliaceum, corniculatum, ſpicis glabris Tournefort. In aſperis & apricis bey Ober-Wöllnitz, neben dem hohen Fahr-Wege frequens floret æſtate.

GRAMEN latifolium ſpica triticea compacta C. B. Prodr. p. 17. Gramen avenaceum dumetorum ſpicatum Raj. hiſtor. 1262. Gramen loliaceum, corniculatum, ſpicis villoſis Tournef. inſtit. p. 506. An Hecken v. g. im Fürſtens Garten & alibi floret æſtate.

GRAMEN loliaceum nemorenſe latifolium hirſutum, im Rauhenthale, und auf dem Forſte nach Müncherode hin. Floret Majo circa feſtum Joh. vid. Raj. hiſt. plant.

GRAMEN loliaceum minimum foliolis junceis paniculam unam partem ſpectante Tournefort. inſtit. p. 517. Gramen ſparteum juncifolium C. B. P. 5. Spartum parvum Lobelio I. B. 2. 513. Spartum noſtras, parvum Lobel. icon. 90. Spartum noſtras, parvum, gramen ſparteum, juncifolium Lobelii; Chabr. p. 192. In formicarum acervis & ericetis nach Rode zu floret æſtate.

GRAMEN loliaceum altiſſimum, ſpica brizæ perlonga, ariſtis brevibus donata. Tournefort. inſtit. p. 517. Gramen ſpica brizæ majus C. B. P. 9. prodr. 19. In aſperis & apricis ſoli meridiano expoſitis, v. g. auf dem rauhen ungebauten Fuchs-Berge, und ſonſt anderswo floret æſtate; magnitudine variat, hinc

GRAMEN ſpica brizæ minus C. B. Prodr. 19. cum præcedente.

GRAMEN loliaceum minus, ſupinum, ſpica multiplici C. B. Prodr. 19. In aridis, apricis gramineis locis provenit v. g. in den Triften zwiſchen Querfurth und Wendelſtein; auch bey Eamsdorff, und an denen Wegen nach dem Forſte zu hinter dem Galgen ad ſemitas, floret æſtate.

GRAMEN Secalinum, pratenſe & elatius Hiſt. oxon. In pratis des groſſen Paradießes paſſim biß nach Lobeda und Wöllnitz hin floret æſtate.

GRAMEN ſpicatum vulgare, ſecalinum Tournefort. inſtit. p. 517. Gramen hordeaceum, minus & vulgare C. B. P.

B. P. 9. Hordeum murinum I. *B.* 2. 431. Hordeum ſponcaneum ſpurium, Holcus Plinii Anguillaræ Lobel. icon. 30. Ad muros, ſepes, & in ruderatis frequens, floret æſtate.

GRAMEN ſecalinum majus ſylvaticum D. Bobart. im Rauhenthale floret Jun.

GRAMEN ſpicatum, ariſtis pennatis Tournefort. inſt. p. 518. Gramen Sparteum, pennatum C. *B.* P. 5. Gramen pennatum, aliis ſpartum I. *B.* 2. 512. Gramen plumeum Mont. Phytogr. Fig. 173. In aſperis & apricis v. g. auf dem Hauß- und Cunitzer-Berge floret Junio. Cluſius in hiſtoria CCXXI. ſpartum auſtriacum, pennatum vocavit. Germ. Marien-Flachs.

GRAMEN ſerotinum ſpica lax a caneſcente, Joh. Raji cum præcedente, floret æſtate.

GRAMEN ſpicatum, ſparteum, ſpica ſericea, ex utriculo prodeunte Tournefort. inſtit. p. 518. Gramen ſparteum ſecundum panicula brevi folliculo incluſa C. *B.* P. 5. In aſperis & apricis paſſim floret æſtate, v. g. two man nach Wollnitz und den Fürſten-Brunnen gehet.

GRAMEN anthoxanthon, ſpicatum I. *B.* 2. 466. Gramen pratenſe, ſpica flaveſcente C. *B.* P. 3. Gramen anthoxanthon Dalechampii Lugdun. 426. In pratis v. g. im kleinen Paradieße floret Aprili & Majo; ſpicæ magnitudine & craſſitie variat. Semina habet fuſca lanugine obducta, & ariſtis brevibus recurvis donata, non ſecus ac ægylops arvenſis, ad quem pariter referri poſſet.

GRAMEN ſpicatum, glumis variis Tournefort. inſtit. 519. Gramen glumis varius C. *B.* P. 10. Prodr. 21. Gramen verſicolor I. B. 2. 466. In aſperis & apricis floret Martio & Aprili; Spicas habet nitidas quaſi cœruleas, & amplis ex cæſpitibus, quos occupat plurimas gignit ſpicas im Rauhenthale.

GRAMEN ſpicatum ſemine miliaceo albo Tournefort. inſtit. 518. Phalaris major ſemine albo C. B. P. 28. Phalaris I. B. 2. 442. Phalaris Dod. Pempt. 510. In agris ſatum paſſim floret æſtate. Germani Canarien-Saat vocant; quia paſſeres canarienſes hujus ſemine alunt.

GRAMEN spicatum glumis cristatis Tournefort. instit. p. 519. Gramen cristatum Lobel. advers. part. 2. 467. Gramen cristatum anglicum Park. Theatr. 1160. Gramen cristatum C. B. Chabrai. In pratis passim floret Junio & Julio.

GRAMEN spicatum, spica cylindracea longissima Tournef. inst. 519. Gramen typhoides, maximum, spica longissima C. B. P. 4. Prodr. 10. Gramen cum cauda muris majoris longa, majus I. B. 2. 472. In sylvis v. g. auf der Weinse floret aestate. Hoc, ut & omnia typhoidea gramina, glumas habet bicornes, quas C. B. in Prodr. juxta hanc speciem eleganter expressit.

GRAMEN spicatum, spica cylindracea, tenuissima, longiore Tournef. instit. p. 520. Gramen Typhoides spica angustiore, longiore C. B. P. 4. Gramen cum cauda muris purpurascente I. B. 2. 473. Gramen alopecuroides, minus, alterum Lobel. icon. 9. In asperis & apricis circa sylvas v. g. um den Forst floret aestate.

GRAMEN spicatum, spica cylindracea, tenuiori, longa Tournef. instit. p. 520. Gramen typhoides, asperum, primum C. B. P. 4. Gramen cum cauda muris, minus I. B. 2. 471. In pratis v. g. in dem grossen Paradiesse floret aestate.

GRAMEN spicatum, spica cylindracea, brevi, radice nodosa Tournefort. instit. p. 520. Gramen nodosum, spica parva, sive nodosum tertium C. B. P. Prodr. 3. In asperis sylvarum & apricis v. g. auf dem Forst ꝛc. floret Junio & Julio.

GRAMEN dactylon, angustifolium, spicis villosis C. B. P. 3. Gramen digitatum, hirsutum I. B. 2. 445. Ischaemum secundum Tabern. icon. 122. In asperis & acclivibus v. gr. bey der Naasse-Mühl, auch wo man von Lobada nach der neuen Schencke gehet, floret Jul. & Aug.

GRAMEN dactylon, radice repente, sive officinarum Tournefort. instit. p. 520. Gramen repens cum panicula graminis manna I. B. 2. 459. Gramen dactylon folio arundinaceo, majus, aculeatum forte Plinio C. B. P. 7. Gramen

men legitimum Cluſii hiſt. CCXVII. In ſuburbiorum hortis, inter olera hinc inde floret Auguſto.

GRAMEN dactylon Indicum, ſpicis longioribus Tournef. In horto D. D. Slevogtii inter alias plantas exoticas rariores quondam adfuit, an autem denique propter novi horti cultoris malam obſervationem, an potius ignorantiam, pro gramine vulgari erutum, & tanquam inutile quid projectum, neſcio; occurrit tamen in hortis Curioſorum Lipſienſium.

GRAMEN ſpicatum aquaticum, ſpica cylindracea, brevi Tournef. inſtit. p. 520. Gramen aquaticum, geniculatum, ſpicatum C. B. P. 3. Gramen cum parva cauda muris, radice non nodoſa, repens I. B. 2. 472. In locis, ubi per hyemem aquæ ſtagnarunt juxta vias publicas cum plantaginella &c. floret Julio. Tabern. in iconibus gramen fluviatile, album, vocat.

GRAMEN ſpicatum, ſpica cylindracea, molli & denſa Tournef. inſtit. p. 520. Gramen typhoides, molle C. B. P. 4. Gramen alopecuroidi accedens & phalaridi, ſpica longiuſcula, folio lanuginoſo I. B. 2 474. Gramen alopecuroides Lobel. icon. 8. In pratis v. g. im kleinen Paradieße floret Majo; Staminibus violaceis & luteis variat, non ſecus ac plurimæ aliæ graminum ſpecies.

GRAMEN paniculatum, autumnale, panicula ampliore, ex viridi nigricante Tournefort. inſtit. p. 521. Gramen arundinaceum enode majus, montanum C. B. P. 7. Gramen arundinaceum, enode I. B. 2. 481. Gramen arundinaceum Tabern. icon. 231. In ſylvis vaſtis zwiſchen Sachſen und Böhmen, auch bey Königſtein und Pirna. floret Auguſto.

GRAMEN paniculatum, autumnale, panicula anguſtiore, ex viridi nigricante Tournef. inſtit. 521. Gramen pratenſe, ſerotinum, panicula longa, purpuraſcente Raj. Synopſ. 260. Gramen ſpica lavendulæ Merret. in pinace. In pratis udis floret poſt foeniſecium. v. g. wo man nach Ziegenhayn gehet. Hoc pro prioris varietate habet Tournefort. ſed perperam. it. nach der Walters-Wieſen zu.

GRAMEN paniculatum, aquaticum, fluitans Tournef. inſtit. p. 521. Gramen aquaticum, fluitans, multiplici ſpica, Ἄγρωστις ποταμίος C. B. P. 3. Gramen aquaticum, cum longiſſima panicula I. B. 2. 490. Gramen fluviatile Tabern. icon. 216. Gramen anatum Tragi; In ſtagnis & foſſis floret æſtate.

GRAMEN paniculatum latifolium, radice repente, craſſiori Tournefort. inſtit. Gramen caninum, longius radicatum, majus C. B. P. 1. Gramen canarium longius radicatum, latiore panicula Adverſar. part. 2. 467. I. B. 2. 457. An den hohen Ufer der Saale v. g. wo man nach Cunitz gehet, auch auf denen Aeckern paſſim nimis frequens, cum altero gramine canino ſpica triticea promiſcue Quecken dicitur, & quovis modo ex agris eruitur & comburitur. Hujus radix officinas ingreditur. vid. Tabernæmontanus. Germanicum autem hoc vocabulum Quecken idem notat ac kriechen; unde to queck Anglorum adhuc reſtat. Batavi dicunt croepan, unde Crupina nomen accepit; floret æſtate.

GRAMEN paniculatum, minus, radice repente, paniculâ duriore Tournefort. inſt. Gramen murorum, duriuſculum, ſpica erecta rigida Moriſon, hiſt. oxon. part. 3. Sect. 8. tab. 2. fig. 9. Gramen loliaceum murorum, duriuſculum, ſpica erecta, rigida, ejusdem ibid. 182. Gramen panicula multiplici C. B. P. 3. Prodr. 6. In muris paſſim floret æſtate, & ſtaminum colore ex albido & violaceo variat.

GRAMEN paniculatum ſpicis craſſioribus, & brevioribus Tournefort. inſtit. p. 521. Gramen ſpicatum, folio aſpero C. B. P. 3. Prodr. 9. Gramen aſperum I. B. 2. 467. Gramen ſpicatum Dalechampii Lugd. 427. In pratis paſſim floret æſtate, auch bey der neuen Schencke in pratis uligine madentibus.

GRAMEN paniculatum aquaticum, miliaceum Tournef. inſtit. Gramen miliaceum, aquaticum Raj. Synopſ. 295. In foſſis v. g. im Stadt-Graben bey dem Saal-Thore floret æſtate.

GRAMEN pratenſe, paniculatum, majus, latiore folio,

Theophraſti C. B. P. 2. Gramen pratenſe I. Dodon. pempt. 560. In pratis paſſim floret æſtate.

GRAMEN pratenſe paniculatum, medium C. B. P. 2. Gramen pratenſe, minus I. B. 2. 542. Gramen pratenſe II. Dod. Pempt. 560. Gramen minus Tabern. icon. 201. In pratis cum præcedente. Hoc non ſecus ac ſequens paniculis albis & xerampelinis variat.

GRAMEN pratenſe, paniculatum, minus, rubrum C. B. P. Gramen paniculatum minus, & rubrum Tabern. icon. 207. Ad ſemitas pratorum & ad vias publicas paſſim floret toto fere anno.

GRAMEN pratenſe, paniculatum, minus, album C. B. P. 3. Gramen paniculatum minus, album, Tabern. icon. 206. cum præcedente.

GRAMEN xerampelinum, miliacea, prætenui, ramoſaque panicula, ſive xerampelino congener, arvenſe, æſtivum, gramen minutiſſimo ſemine Lobel. illuſtrat. 14. In Ägris nach Ketſchau floret æſtate.

GRAMEN pratenſe, paniculatum, molle, C. B. P. 2. Prodr. 5. Gramen lanatum Dalechampii Lugd. 425. I. B. 2. 466. In pratis frequens floret æſtate.

GRAMEN paniculatum, minimum, molle Bor. Monſp. App. Gramen paniculatum, locuſtis parvis, purpureo-argenteis, annuum Raji Synopſ. 258. Hiſt. 1286. In apricis ſterilibus, tenui gramine veſtitis, wiſchen der Leuchtenburg und Städtgen Rothe floret Aprili & Majo. Idem hujus fig. vid. apud Scheuchzerum in itin. alp. 2di obſerv. botanicis Tab. 18. fig. 2.

MAJVS & perenne Dni Dod. apud Raj. in ſynopſ. Britann. in ſylvis prope Rothe und Schleifreiſen floret æſtate.

GRAMEN caninum, paniculatum, molle Raj. hiſt. 1285. In agris arenoſis. v. g. gegen Rothe über floret æſtate.

GRAMEN paniculis elegantiſſimis, ſive ἐράγροστις, majus C. B. P. Gramen amoris dictum I. B. 2. 470. Gramen paniculatum, ſativum, heragroſtis Tabern. icon. 204. in

agris & vineis v. g. um den Fuchs-Berg, auch noch ſchöner um Schmohna floret æſtate.

GRAMEN minus vulgare, panicula rigida Tournefort. inſtit. 522. Gramen minus, duriuſculum Tabern. icon. 208. In aſperis apricis, gramine tenui veſtitis, paſſim floret æſtate. Idem & altiſſimum, amplosque ceſpites occupantes inveni auf der Wellmeſe.

GRAMEN pratenſe panicula duriori, laxa, unam præcipue partem ſpectante Raj. Synopſ. 257. In pratis und auf der Wellmeſe floret æſtate.

GRAMEN panicula miliacea, locuſtis minimis Tournefort. inſtit. p. 522. Auf denen Ameiſen-Haufen auf dem Forſt, floret æſtate.

GRAMEN ſylvaticum, panicula miliacea, ſparſa C. B. P. 8. Gramen miliaceum Lobelii I. B. 2. 462. Miliaceum gramen Lobel. icon. 3. in ſylvis v. g. im Rauhenthale und auf dem Forſt bey Volckesrode, floret Majo & Jun.

GRAMEN aquaticum, paniculatum, latifolium C. B. P. 3. Gramen majus, aquaticum Lobel. I. B. 2. 481. Gramen arundinaceum, geniculatum Tabern. icon. 211. In ſcrobibus & ſtagnis v. g. wo man nach Cunitz gehet; auch im kleinen Paradieße floret æſtate.

GRAMEN paluſtre paniculatum altiſſimum C. B. Pin. pag. 3. Gramen aquaticum arundinaceum paniculatum in ſumpffigten Gräben des groſſen Paradießes & alibi cum præcedente.

GRAMEN paniculatum, proliferum Tournefort. inſtit. 523. Gramen arvenſe, panicula criſpa C. B. P. 3. Prodr. 6. Gramen cum panicula molli, rubente. I. B. 2. 464. In muris cœmiteriorum & pagorum, zwiſchen Halle und Leipzig: flores, vel potius proles ſuas, ſive radiculas paniculatim diſpoſitas profert Junio; recte enim obſervavit Tournefort. hanc graminis ſpeciem loco florum proferre ſoboles inſtar alii vel biſtortæ alpinæ minimæ.

GRAMEN paniculatum, aquaticum, phalaridis ſemine Tournefort. inſtit. p. 523. Gramen arundinaceum, aceroſa gluma, noſtras Parkinſ. Theatr. 1273. Moriſon. Hiſt. Oxon. part. 3. 208. an gramen arundinaceum, ſpicatum

C. B.

C. B. P. 6? In ſtagnis & ſerobibus. v. g. wo man nach Cunitz gehet floret æſtate. Hujus varietas eſt

GRAMEN paniculatum, aquaticum, phalaridis ſemine, folio variegato Tournefort. inſtit. p. 523. Gramen paniculatum, folio variegato C. B. P. 3. Gramen ſtriis pictum I. B. 2. 476. Gramen ſulcatum vel ſtriatum, album Lobel. icon. 4. In hortis, ubi Spaniſch-Graß vocant, & coronis inſerunt.

GRAMEN paniculatum arundinaceum ſpica multiplici Tournef. inſtit. 523. Gramen arundinaceum, ſpica multiplici, καλαμάγρωσις Dioſcoridis C. B. P. 6. Gramen Calamagroſtis Lobelii I. B. 2. 480. Calamagroſtis Lobelii I. B. 2. 480. Calamagroſtis Lobel. icon. 6. an gramen aquaticum, geniculatum Tabern. icon. 215? Ad ſtagna, ſed rarius, v. g. bey Lobſtädt, und bey dem Fürſten-Brunnen floret æſtate.

GRAMEN paniculatum, arundinaceum, panicula denſa, ſpadicea Tournefort. inſtit. p. 523. gramen arundinaceum, panicula molli, ſpadicea, majus C. B. P. 7. gramen plumoſum Lobelii, ſpica candida & ſerici modo lucens I. B. 2. 476 Gramen tomentoſum. Calamagroſtis quorundam, & vulgi gramen plumoſum Lobel. icon. 6. in dumetis v. g. auf der Wellmeſe floret æſtate. Iſt auch auf denen ungebauten Feldern über der alten Sinne.

GRAMEN paniculatum, locuſtis maximis, phœniceis, tremulis Tournefort. inſtit. pag. 523. gramen amabile, tremulum, maximum, panicula ſpadicea V. Luſitani: gramen tremulum, paniculâ fuſcâ ſive fumigato colore Cluſ. 98. In hortis curioſorum floret æſtate.

GRAMEN paniculatum, minus, locuſtis parvis, tremulis Tournefort. inſtit. p. 524. gramen tremulum minus, panicula parva C. B P. 2. Prodr. 4. gramen tremulum minus I. B. 2. 470. In ſylva bey Prießnitz floret æſtate.

GRAMEN tremulum minus, locuſtis deltoidibus, albicantibus, in dem Walde über Jena-Prießnitz floret Jun.

GRAMEN capillatum I. B. 2. 462. gramen ſegetum altiſſimum, panicula arundinacea ſparſa latiore Lobel. icon.

Acker-

Ackerſtrauß-Graß Tabernæm. in pratis frequens floret æſtate.

GRAMEN ſegetum, panicula arundinacea C. B. P. 3. gramen agrorum Lobelii I. B. 2. 461. Agrorum venti ſpica & gramen agrorum latiore, arundinacea, comoſa panicula Lobel. icon. 3. In agris non tam, quam pratis v. gr. nach Wenigen-Jena zu, panicula ſpadicea & alba variat.

GRAMEN avenaceum, panicula ſparſa, locuſtis majoribus, & ariſtatis Tournefort. p. 526. Feſtuca avenacea, ſterilis, elatior C. B. P. 9. Ægylops Matthioli forte I. B. 2. 439. Bromos herba Dod. pempt. Ad ſepes v. gr. im kleinen Paradießе & in vineis paſſim floret Junio; magnitudine variat.

GRAMEN avenaceum, locuſtis villoſis, craſſioribus Tournefort. inſtit. p. 526. Gramen ſpica hirſuta, ad gramen du gros accedens I. B. 2. 438. In pratis paſſim, v. gr. im beyden Paradießen, floret Maj. & Jun.

GRAMEN avenaceum arvenſe, glumis non villoſis, & veluti compreſſis. Germ. Dort, Gerſtentwalch, Gerſtenwalch, inter ſegetes præcipue bey Cunitz floret Majo & Junio, revera differt a præcedente, Germanis dicitur Täberich, & ejus ſemini major noxa adſcribitur, quam ſemini lolii.

GRAMEN montanum avenaceum, locuſtis rubris C. B. Pin. 10. & Prodromo pag. 20. Gramen locuſtis rubris I. B. auf der Wellmeſe.

GRAMEN avenaceum, arvenſe, glumarum ſtaminibus aureis, panicula ſparſa. Feſtuca graminea, arvenſis, minor C. B. P. 10. In agris lapidoſis, wo man aus dem Rauhenthale nach Cloſewitz gehet, floret Jun. & Jul.

GRAMEN avenaceum, ſylvaticum, paniculatum, latifolium, glumis villoſis, & ariſtatis, panicula ampla. In ſylvis opacis, v. gr. im Rauhenthale floret Jun.

GRAMEN avenaceum montanum, lanuginoſum C. B. Pin. pag. 10. Gramen montanum, avenæ ſemine Cluſ. Pan. pag. 718. 719. In vineis & muris frequens, floret Majo & Jun.

GRAMEN avenaceum utriculis lanuginoſis flaveſcentibus Tournef. Feſtuca utriculis lanugine flaveſcentibus C. B.

C. B. Ægylops quibusdam aristis recurvis sive avena pilosa I. B. inter segetes præcipue hordei & avenæ nimis frequens pestis, floret Junio & Julio. De hac planta intelligendus est Virgilius dum canit: Infelix lolium & steriles nascuntur avenæ.

GRAMEN pratense paniculatum altissimum, locustis parvis splendentibus non aristatis Tournef. Festuca graminea effusa juba, C. B.

GRAMEN nodosum, avenacea panicula C. B. Prodr. p. 3. Provenit copiosissime in pratis v. g. im Paradieß und auf der Insul, auch wo man nach Cunitz und Löbstädt gehet, floret Majo & Junio. Sæpius in ustilaginem instar errealium degenerat.

GRAMEN avenaceum pratense glumis xerampelinis crasioribus & splendentibus præcocius. Hujus meminisse videtur J. Kajo in appendice ad hist. plant. universalem, & in Methodo plant. emend & aucta, in pratis frequens cum præcedente, quo tamen est præcotius & humilius.

ARVNDO vulgaris, sive Phragmites Dioscorid. C. B. P. 17. Arundo vulgaris, palustris I. B. 2. 485. Arundo palustris, canna sepiaria Tabern. icon. 254. In fosis & ad ripam Salæ frequens floret æstate. Rohr, Schilff-Rohr, Riet.

ARVNDO indica, variegata, sive Laconica Theophrasti Corn. 54. In hortis floret cum præcedente.

CYPERVS rotundus, inodorus, germanicus C. B. P. 14. Cyperus aquaticus septentrionalis Lobel. icon. 77. In scrobibus bey der Schneide-Mühlen, auch auf denen Obersdorffischen Wiesen bey Laucha, und an der Unstruth, ubi panicula plane diversa a præcedente invenerim, admodum frequentem, sic quoque magnitudine variat; floret æstate.

CYPERVS minimus, panicula sparsa, nigricante Tournefort. instit. p. 527. gramen Cyperoides, minus, panicula sparsa nigricante C. B. P. 6. gramen parvum, pulchrum aliud panicula compressa, nigricante I. B. 2. 471. gramen Cyperoides, minimum, nigricante panicula advers. part. 2. 463. In scrobibus, illorumque limitibus hinter Jena Prieses

Prieſenitz und Zöllnitz auf denen Wieſen, wo man nach Laaßdorff gehet, floret Auguſto.

CYPERVS minimus panicula ſparſa, ſubflaveſcente Tournefort. inſtit. 527. gramen Cyperoides, minus, panicula ſparſa ſubflaveſcente C. B. P. 6. gramen pulchrum, parvum, panicula lata, compreſſa I. B. 2. 470. Calamagroſtis altera Tragi 679. cum præcedente.

SCIRPVS paluſtris altiſſimus Tournefort. inſtit. p. 528. juncus maximus, ſive ſcirpus major C. B. P. 12. juncus maximus, holoſchœnus I. B. 2. 522. In ſtagnis v. g. wo man nach Cunitz gehet, auch bey Löbſtädt in der alten Saale, floret æſtate. Germ. Binſen, Bimſen.

SCIRPVS equiſeti capitulis craſſioribus & habitioribus, pumilus & multicaulis, nondum deſcriptus, in uliginoſis paſcuis hinter Linckel poſt pinetum cum aricoide floret Junio & Julio.

SCIRPVS equiſeti capitulo majori Tournefort. juncus capitulis equiſeti, major C. B. P. 12. juncus capitulis longis, ſive clavatus I. B. 2. 523. juncus aquaticus, minor, capitulis equiſeti Lobel. icon. 86. In ſtagnorum ripis & ſcrobibus frequens v. g. an den Cunitziſchen Teichen, und auf den feuchten Wieſen nach Wöllnitz zu; auch im groſſen Paradieße floret æſtate.

SCIRPVS omnium minimus capitulo longiori Tournefort. inſtit. p. 528. juncellus minimus, capitulis equiſeti Boccon. rarior. plant. 42. cum figura hujus plantæ nitida. In ſtagnorum limitibus opacis v. g. um den Löbſtädtiſchen Teiche, oder an dem Saal-Arm herum floret æſtate.

SCIRPVS omnium minimus, capitulo breviori Tournefort. inſtit. p. 528. Juncellus inutilis, ſive Chamæſchœnos C. B. Prodr. 22. juncellus inutilis C. B. P. In locis, ubi per hyemem aquæ ſtagnarunt, & opacis v. g. nach Kleine und Rothe zu, in dem alten Fahr-Wege der Wälder; floret æſtate; Hujus capitula ſunt bi- vel tri-gemina; proxime vero præcedentis ex ſummitate cauliculi ſolitaria.

CYPEROIDES latifolium, ſpica rufa, ſive caule triangulo Tournefort. inſtit. gramen Cyperoides latifolium ſpica rufa, ſive caule triangulo C. B. P. 6. gramen Cyperoides

roides cum paniculis nigris I. B. 2. 494. gramen Cyperoides Lobel. icon. 11. In ſtagnorum ripis zwiſchen dem Johannis- und Löber-Thore floret Aprili. Cyper-Graß.

CYPEROIDES latifolium, ſpicis teretibus erectis Tournefort. inſtit. p. 529. gramen Cyperoides, latifolium, ſpicis teretibus, erectis Raj. Synopſ. 265. gramen Cyperoides, anguſtifolium, ſpicis longis, erectis C. B. P. 6. gramen paluſtre majus Lobel. icon. 11. in dem Stadt-Graben zwiſchen dem Johannis- und Löber-Thore, auch zwiſchen Wollnitz und dem Fürſten-Brunnen in pratis humidis floret Majo. Iſt am häufigſten in denen Sumpffen zwiſchen Lizerode und Iſerſtadt, cum ſparganio minimo.

CYPEROIDES nigro-luteum, vernum, majus Tournefort. graminis nigro-lutei verni varietas major I. B. 2. 494. In ſylvis & apricis cum ſequente floret Aprili.

CYPEROIDES nigro-luteum, vernum, minus Tournefort. inſtit. p. 529. graminis nigro-lutei verni varietas minor I. B. 2. 494. cum præcedente v. gr. auf dem Cunitzer-Berge floret Aprili.

CYPEROIDES polyſtachyon, flavicans, ſpicis brevibus prope ſummitatem caulis Tournef. gramen Cyperoides polyſtachion, flavicans, ſpicis brevibus, prope ſummitatem caulis Raj. hiſt. 1294. In ſylvis v. g. auf der Wellmeſe floret Majo.

CYPEROIDES ſpicis parvis, longe diſtantibus Tournefort. inſtit. p. 530. gramen Cyperoides, ſpicis parvis longiſſime diſtantibus Raj. hiſt. 1295. In pratis humidis v. g. im kleinen Paradieſe, und auf der Wieſe beym Fürſten-Brunnen floret Majo & Junio.

CYPEROIDES ſylvarum, tenuius ſpicatum Tournefortii. Gramen Cyperoides, ſylvarum tenuius ſpicatum Parkinſon theatr. 1171. In ſylvis v. g. im Rauhenthale floret Majo & Junio.

CYPEROIDES polyſtachyon lanuginoſum Tournefortii. Gramen Cyperoides, polyſtachyon, lanuginoſum Raj. Synopſ. 265. In vinearum & agrorum terminis floret Junio.

CYPEROIDES paluſtre aculeatum, capitulo breviore R. Tour-

Tournefort. Gramen paluſtre, aculeatum, germanicum, vel minus C. B. P. 7. Gramen paluſtre echinatum Lobel. icon. 15. I. B. 2. 497. In pratis uliginoſis v. g. im groſſen Paradieße floret Majo & Jun.

CYPEROIDES capitulis ranunculi; an Cyperoides non aculeatum capitulo breviore Tournef. im groſſen Paradieße an denen feuchten Orten.

CYPEROIDES ſpica pendula, breviore Tournef. inſtit. 529. Gramen Cyperoides, ſpica pendula breviore C. B. P. 6. Pſeudocyperus Dod. Pempt. 339. Graminis Cyperoidis genus, Pſeudocyperus Lobelio, ſpicis vel paniculis pendentibus ex longis pediculis I. B. 2. 496. Ad ſtagna zwiſchen dem Rauhenthale und der Zißke, auch in denen Moräſten im Walde hinter Schlefreiſen, wo man nach Gera reiſet, floret Majo & Jun.

CYPEROIDES ſpica pendula longiore & anguſtiore C. B. P. 529. Gramen Cyperoides, ſpica pendula longiore & anguſtiore. C. B. P. 6. Prodr. 13. In ſylvis udis hinter Schlefreißen, auch an denen Teichen bey Schleben, floret æſtate.

CYPEROIDES ſpicis variis nemorenſe: Gramen Caryophyllatum montanum, ſpica varia C. B. Prodr. p. 9. In ſylvis v. g. im Rauhenthale floret Aprili.

Hæ fere ſunt ſpecies Cyperoidis proprie dicti, ſi Tournefortii definitionem ſequi velis; Dicit enim, quod ad Cyperoides requiratur, ut ſtamina ab embryonibus remota, & in ſquamoſas ſpicas collecta ſuperiora caulium occupent; & embryones in aliis ſpicis deprehendendi inferiora occupent, quod neutiquam dici poteſt de ſequentibus plantis, quas Rajus ad Cyperoidea retulit; ſed nec ad ſcirpum referri poſſunt, cum caules habeant triquetros; quam notam Tournefortius in ſcirpis non admittit: propterea has plantas plane omiſit. Sed ne quidquam nobis deſit, præſtat ſeparato Caricis titulo comprehendere.

Caricis ſpecies ſunt:

CAREX major, ſpica compacta. Gramen Cyperoides paluſtre, majus, ſpica compacta C. B. P. Ad ſcrobes & foſſas frequens floret Majo & Jun.

CAREX

CAREX major, ſpica minus compacta. Gramen Cyperoides, ſpicis minoribus, minusque compact. C. B. Pin. cum præcedente.

CAREX minor, ſpica divulſa, ſeu interrupta; Gramen Cyperoides ſpicatum minus, ſpica divulſa ſive interrupta Raj. Synopſ. In umbroſis & pomariis hinc inde; an gramen ſylvaticum, ſive nemoroſum I. Tabern. icon. 226?

CAREX multicaulis, ſpicis longioribus, gryſeis & interruptis, veluti racemoſis: vel Carex paluſtris multicaulis & polyſtachyos, nondum deſcriptus. Hujus ſpica eſt laxa, & velut ex pluribus aliis compacta, ad ſtagna & piſcinas bey Schleben, auch auf den Tautenburgiſchen Forſte cum ſequente, und im Pfarr-Höltzgen, floret Majo & Junio.

CAREX anguſtifolius, ſpica rufa divulſa. Carex polyſtachios, ſpicis fuſcis, bey Schleben, auf der erſten Wieſe nach Endigung derer Teiche.

CAREX nemoroſus, ſpicis parvis, aſperis. Gramen nemoroſum ſpicis parvis, aſperis C. B. P. im Rauhenthale floret Majo.

CAREX ſylvaticus, ſpicis parvis ſeſſilibus in foliorum alis. Gramen Cyperoides, anguſtifolium, ſpicis parvis ſeſſilibus, in foliorum alis, Raj. hiſt. 1295. & methodo graminum, juncorum, & cyperorum ſpeciali. Provenit copioſe in udis ſylvarum & opacis nach Kleine und nach der frölichen Wiederkunfft, in denen Holtz-Schlägen, v. g. auf dem Rieſeneck und Hirſchſprung.

CAREX montanus ſpica compreſſa, diſticha; Gramen Cyperoides, ſpica compreſſa, diſticha D. Plukenet Synopſ. noſtr. wo man vom Forſte nach Ammerbach gehet, inter juncos floret æſtate.

CAREX polycephalos, ſive paniculatus griſeus. Gramen Cyperoides vulgatius, aquaticum Chabr. Sciagraph. pag. 189. in udis v. gr. im kleinen Paradieße floret Majo & Junio.

CAREX polyſtachyos. Gramen Cyperoides ex monte Balon, ſpica divulſa I. B. an gramen ſylvaticum ſive nemoroſum I. Tabernæm. icon. 226. quod Tournefortius im-

merito ad graminis ſpecies retulit? In ſylvis & nemoribus floret æſtate.

TYPHA paluſtris major C. B. P. 20. I. B. 2. 539. Typha Lobel. icon. 81. In ſtagnis v. gr. wo man nach Cunitz und Ammerbach gehet, floret Majo & Junio. Germ. Kolben, Narren-Kolben, Teich-Kolben, Gallis Maſſe de jonc, quia fere refert maſſam ſic dictam, cujus eſt in lodo Biliard dicto.

TYPHA paluſtris, clava gracili C. B. Pin. 20. Typha media Cluſ. Pannon. 716. Typha paluſtris, media I. B. 3. 540. ad piſcinas zu Schleben floret cum præcedente. Foliis typhæ utuntur Vietores ad doliorum circulos firmandos.

LINAGROSTIS ſpica multiplici. Gramen pratenſe tomentoſum, panicula ſparſa C. B. Pin. pag. 4. Gramen tomentoſum & Linagroſtis Tab. icon. In paludoſis pratis & uliginoſis floret Aprili & Majo, v. g. bey Ziegenham, und bey den Fürſten-Brunnen.

LINAGROSTIS ſylvatica, ſpica ſimplici. Juncus capitulo lanuginoſo ſive Schœnolaguros C. B. Pin. pag. 12. & Prodr. pag. 23. In paludoſis ſylvis circa ſtagna cum oxycocco hinter Schlefreiſen am Teiche floret Majo.

SPARGANIVM ramoſum C. B. P. 15. Sparganium quibusdam I. B. 2. 541. Platanaria, ſive Butomon Dod. Pempt. 601. In ſtagnis v. gr. im Stadt-Graben, wo man vom Saal-Thore nach dem Löber-Thore gehet, floret æſtate. Schwertel.

SPARGANIVM non ramoſum C. B. P. 15. Sparganium alterum I. B. 2. 541. Platanaria altera Dod. Pempt. 601. In ſtagnis nach Bubeck und Waldeck zu floret æſtate; auch am Austritt der Saale hinter der Burgauiſchen Bräuhan-Schencke.

SPARGANIVM minimum Joh. Raj. in app. hiſtor. quod differre videtur a ſparganio minimo Bauhinorum; In ſtagno, wo man nach Krippendorff gehet, auch bey Löbſtädt an der alten Saale, und in denen Sümpffen, ſo in dem Krippendorffiſchen Pfarr-Hölzgen ſind, frequens eſt.

MATS

MATS granis aureis; Frumentum indicum Mays dictum C. B. P. 25. Triticum indicum I. B. 2. 453. Frumentum Turcicum Dod. Pempt. 509. In hortis variis floret æstate. Türckiſch Korn. Mays hoc granorum colore mirum variat, hinc Mays granis albicantibus, violaceis, ſpadiceis, nigricantibus, rubris, albo-ſpadiceis, rubro-ſpadiceis, aureis & albis, &c. apud Tournefort. & tot apud Tabernæmontan. figuræ.

LACRTMÆ Jobi Cluſ. hiſt. CCXVI. Lacryma Job multis, ſive milium arundinaceum. I. B. 2. 449. Lithoſpermum arundinaceum forte Dioſcoridis & Plinii C. B. P. 298. In hortis Curioſorum floret æstate. Hiobs Thränen.

ACORVM legitimum, cum & ſine julo Caroli Cluſii in Hiſtor. Pannon. p. 258. 259. Acorus verus, ſive calamus aromaticus officinarum C. B. Pin. 34. Acorum legitimum Cluſ. Hiſp. Germ. Kalmus, corrupte a voce calamus, olim enim omnes Medici opinabantur, hanc plantam eſſe verum calamum aromaticum montis Libani Græcorum. In ſtagnis & piſcinis v. gr. bey der frölichen Wiederkunfft / und anderswo nach Weimar und dem Voigtlande hin, auch zu Capellendorff in Teichen, floret Majo. De vero calamo aromatico Veterum vid. Proſper. Alpinus ſub nomine Chaſab-Aldarina, & Samuel Dahle in pharmacologia, & ſupplemento ejusdem.

CLAS-

CLASSIS XVI.

DE PLANTIS FLORE IMPERFECTO CONGLOMERATO GAVDENTIBVS.

SPINACIA vulgaris, capsula seminis aculeata Tournefort. instit. p. 533. Spinacia mas I. B. 2. 963. Lapathum hortense, seu spinacia semine spinoso C. B. P. 114. Spinacia Lobel. icon. 257. In hortis frequens floret Majo; ab hac vix differt Spinacia vulgaris sterilis Tournefortii. Spicacia fœmina Lugd. I. B. 2. 963. Lapathum hortense sive Spinacia sterilis C. B. P. 115. ex eodem semine gignuntur, Germ. Spinat, Pinat, Pinet, Spinetsch.

SPINACIA vulgaris, capsula seminis non aculeata Tournefort. Spinachia semine non pungente, folio majore rotundiore I. B. 2. 964. Lapathum hortense, seu Spinacia semine non spinoso. C. B. P. 115. Spinacia nobilis Tragi, 324. cum præcedente.

MERCVRIALIS testiculata, sive mas Dioscorid. & Plinii C. B. P. 121. Mercurialis mas Dod. Pempt. 658. I. B. 2. 977. In agris & vineis passim floret tota æstate, & autumno; nec hujus individuum sterile a fructifera specie differre videtur, siquidem ex uno eodemque semine oriantur & pariter nonnisi unius generis figuræque fructus seminave proferant, Germ. Bingel-Kraut, Unkraut vulgus vocat in Wetteravia prope Gelnhusam.

MERCVRIALIS spicata, sive fœmina Dioscorid. & Plinii C. B. P. 121. Mercurialis fœmina Dod. Pempt. 658. I. B. 2. 977. Cum præcedente promiscue.

MERCVRIALIS montana perennis. Mercurialis montana testiculata & spicata C. B. P. 122. Cynocrambe, sive mercurialis repens mas & fœmina I. B. 2. 979. In sylvis v. g. auf dem Forst, und bey Jena Prießnitz floret Aprili

&

& Majo. Hanc plantam pro venenosa habet Samuel Dahle in pharmacologiæ supplemento, sub tit. Cynocrambes.

URTICA urens maxima *C. B.* P. 232. Urtica rubra Tabern. icon. 535. Ad sepes passim & rudera floret æstate. Brennende Nessel, grosse Nessel. Ex hujus urticæ caulibus confici lintea Nessel-Tuch dicta, tradunt aliqui, ex cannabi vero congenere urticæ plantâ lintea parari satis constat.

URTICA urens, minor *C. B.* P. 232. Urtica minor, annua. I. *B.* 3. 446. Urtica urens minima Dod. Pempt. Ad sepes, muros & fimeta frequens floret tota æstate. Nessel, Heiter-Nessel, Eyter-Nessel, Hetter-Nessel. Hanc minorem urticam aliqui Authores contra phthisin extollunt, penes quos sit fides.

URTICA urens, pilulas ferens I. Dioscoridis semine lini *C. B.* P. 232. Urtica romana, sive mas cum globulis I. *B.* 3. 445. In horto medico floret æstate. Römische Nesseln.

URTICA altera, pilulifera, parietariæ foliis A. R. Paris. 131. H. R. Par. Urtica romana, altera, minor, foliis minus serratis, lini semine Joncq. hort. Cum præcedente.

CANNABIS sativa *C. B.* P. 320. Cannabis mas I. *B.* 3. 447. Cum altera, a qua non differt specie, in agris v. gr. bey Wöllnitz, in quibus agris, Cannabi consitis, mense Augusto Orobanche ramosa occurrit, floret æstate. Hanff.

CANNABIS erratica *C. B.* P. 320. Cannabis fœmina I. *B.* 3. 447. cum præcedente promiscue; Hanc vero, postquam floruit, rustici evellunt. De sexu hujus & aliarum plantarum vid. Camerarii differt. Epistol. ad Mich. Bernh. Valentini.

LVPVLVS mas

LVPVLVS fœmina *C. B.* P. 298. I. *B.* 2. 151. Lupulus Dod. Pempt. 409. In sepibus & pomariis frequens floret æstate. Hopffen.

RICINVS vulgaris *C. B.* P. 432. I. *B.* 3. 642. Ricinus Dod. Pempt. 367. In hortis floret æstate; Officinæ hujus semen cataputiam majorem vocant. Wunder-Baum. Ricinum esse plantam illam, quæ Jonæ Prophetæ umbram præbuit, non sine ratione censent multi, præcipue cum vox

xixi, quæ etiam apud Dioſcoridem occurrit, id confirmare videatur, vid. Menzel. Pin. p. 962.

BVXVS arboreſcens C. B. P. 471. Buxus I. B. I. 496. Dod. Pempt. 782. In hortis paſſim floret Martio. Folius exluteo variegatis variat; ut & per limbum aureis. Germ. Bux Baum.

BVXVS foliis rotundioribus C. B. P. 471. Chamæpyxos Taberni. icon. 1050. In hortorum areolis frequens eſt; raro floret, quia quotannis tondentur ipſius ſummitates.

FAGVS Dod. Pempt. 832. Fagus Latinorum, oxya Græcorum I. B. I. 117. In ſylvis frequens floret Majo. Buchen, fructus vero Buch-Eckern dicuntur.

QVERCVS latifolia, mas, quæ brevi pediculo eſt. C. B. P. 419. In ſylvis floret Majo. Eichen, & fructus Eicheln oder Eckern, dicuntur.

QVERCVS latifolia exotica Car. Cluſ. Pann. pag. 12. in quercetis vaſtioribus, v. g. in Variſcia & Bohemiæ terminis floret cum præcedente. Optime annotavit Cluſ. hujus glandes ex longiori petiolo dependentes, maxima ex parte non ſolum obſitas, ſed quaſi incluſas eſſe viridi quadam excreſcentia, multis inæqualibus angulis prædita & ſcabra, quæ exſiccata, gallarum modo dura ac firma eſt, quarum eadem vicem non ſolum explere poteſt, ſed & re ipſa explet, uti me docuit autopſia Halæ Saxonum, ubi integra dolia his excreſcentiis galliformibus oppleta, venalia deprehendi in uſum tinctorum.

QVERCVS altera, tenerius diſſecta. Cerrus Car. Cluſ. Pan. dicta. Provenit copioſiſſime auf dem Forſte, und bey Coſpida cum vulgari.

NB. Hujus excreſcentiæ ſquamoſæ inter folia ſive potius foliorum alis provenientes, auf dem Forſte ſunt frequentes, quarum eadem meminit J. B. nec non Dn. Chabr. qui figuram pariter exhibuerunt.

NVX juglans, ſive regia vulgaris C. B. P. 417. Nux juglans I. B. I. 241. Dod. Pempt. 816. In vineis paſſim floret Majo & Junio. Welſche Nuß, Wall-Nuß.

CORTLVS

CORTLVS ſativa, fructu albo, minore, ſive vulgaris C. B. P. 417. Corylus ſativa I. B. I. 266. In hortis floret Febr. & Martio. Haſel-Nüſſe, Hecken-Nüſſe mit kleiner Frucht.

CORTLVS ſativa, fructu rotundo, maximo. C. B. P. 418. Avellana Lugdunenſis, major Camerar. hort. cum præcedente. Große Bambergiſche Haſel-Nüſſe.

CORTLVS ſativa, fructu oblongo, rubente. C. B. P. 418. Blut-Nüſſe; cum præcedentibus.

CORTLVS ſylveſtris ſive vulgaris Haſel-Staude, fructus vero gemeine wilde Haſel-Nüſſe. De virtute ſulphuris coryli julorum antepileptica vid. Wallſchmid. in ſuis operibus.

CARPINVS Dod. Pempt. 841. Oſtrya ulmo ſimilis, fructu in umbilicis foliaceis C. B. P. 427. In ſepibus & ſylvis paſſim floret Aprili & Majo. Hage-Büchen, Hayn-Büchen, Stein-Büchen.

ALNVS rotundifolia, glutinoſa, viridis, C. B. P. 428. Alnus vulgaris I. B. I. 151. Alnus Dod. Pempt. 839. In pratis paſſim v. gr. im groſſen und kleinen Paradieße, floret Aprili. Erlen oder Elſter-Baum. Alni ſemine delectantur aviculæ acanthides, quæ Germ. Zeißgen dicuntur, & in alneto majori (im groſſen Paradieße) tempore autumni copioſe capiuntur.

ALNVS alpina minor C. B. P. 428. auf dem Enſels-Berge bey Waltershauſen.

BETVLA Dod. Pempt. 839. I. B. I. 148. In ſylvis, v. g. nach Rüttersdorff und Schlefreiſen, auch bey Dörffgen Sulze und Dörffgen Rode zu floret Majo & Junio. Germ. Bircken. Hujus virgæ in arboribus adultioribus deorſum pendent, unde nonniſi ætate ab hac vulgari betula differt Betula virgis pendulis Joh. Lœſelii. Ex betulæ trunco vulnerato profluit liquor copioſus, qui ab Helmontio laudatur contra calculum. Terribilis eſt Betula, tam Magiſtratuum, quam Ludimagiſtrorum virgis; nomen vero accepiſſe videtur a voce obſoleta batuo, ich ſchlage, unde etiam baptiſeculæ nomen accepiſſe videtur cyanus,

quasi verberans falcem; inde & orta vox gallica battre, & anglica to bat, quæ utraque idem notat ac verberare.

VLMVS campestris & Theophrasti C. B. P. 426. Ulmus I. B. 1. 139. Dod. Pempt. 837. Ulmus vulgaris cum seminibus suis Parkinson. theatr. 1404. Ulmus vulgatissima, folio lato, scabro Ger. emacul. 1480. In sepibus & sylvis, im Rauhenthale sind grosse Bäume davon. Floret Martio & Aprili. Germ. Ulmen-Baum, Rüster-Baum, Rüst-Baum.

VLMVS folio latissimo, scabro Ger. emac. 1481. Ulmus latiore folio Parkinson. theatr. 1404. Cum præcedente in sepibus.

VLMVS carpini folio, seu cortice arboris albido. An tilia mas Matthioli? an dem Fuß-Pfade, so aus dem Rauhenthale nach Closewitz führet, durchs Thal durch cum fraxino, floret Martio.

VLMVS longioribus florum & seminum petiolis. Ad pagos prope Lipsiam, v. gr. bey Golitz und Gonnewitz, auch zwischen Nordhausen und Ilefeld, floret cum præcedentibus. Foliis ulmi adnati conspiciuntur folliculi, scrotum quoddam fere referentes, qui Græcis dicuntur θυλακία; vid. C. B. in Matthiol. Cap. de ulmo; liquore in his vesiculis contento aliqui utuntur ad humorem aqueum oculorum restituendum, de quo vid. Bartholini & Burrhi Epist. in Sculteti armamentario, nec non Henr. ab Heer. Hi folliculi primo continent liquorem, ceu dictum, qui postea mutatur in culices (es wird zu Erl-Flöhen) uti pariter fieri videmus in folliculis, lentisco, therebintho & populo nigro adnasci solitis.

SALIX vulgaris, alba, arborescens C. B. P. 473. Salix maxima, fragilis, alba, hirsuta, I. B. 1. 212. Salix Dioscoridis Lobel. icon. 136. In salicetis & circa pagos passim floret Martio & Aprili. Weide German.

SALIX vulgaris, nigricans, folio longo, non serrato C. B. P. 473. Salix rubea, minime fragilis, folio longo, angusto I. B. 1. 215. cum præcedente.

SALIX vulgaris, rubens C. B. P. 473. cum præcedentibus.

SALIX

SALIX ſativa, lutea, folio crenato *C. B.* P. 473. Salix lutea, tenuior, ſativa, viminea I. *B.* 1. 214. Salix anguſtifolia ſylveſtris Tabernæm. icon. 1037. cum præcedentibus.

SALIX folio amygdalino, utrinque virente, aurito *C. B.* P. 473. Salix ſpontanea fragilis, amygdalino folio, auriculata & non auriculata I. *B.* 1. 214. Salix ſylveſtris latifolia Tabern. icon. 1037. cum præcedentibus.

SALIX folio amygdalino, utrinque aurito, corticem abjiciens Raj. Synopſ. 292. cum præcedentibus.

SALIX folio longiſſimo, anguſtiſſimo utrinque albido C. B. P. 474. Elæagnus Dalechampii Lugd. 278. In ſalicetis paſſim floret cum præcedentibus.

SALIX humilis, anguſtifolia C. P. B. 474. Salix humilis, repens, anguſtifolia I. B. 1. 214. Lobel. icon. 137. In ſylvis udis bey Echleſtreiſen.

SALIX oblongo, incano, acuto folio C. B. P. 474. Salix foliis longiſſimis, criſpis, ſubtus albicantibus I. B. 1. 212. Salix oblongo, incano folio C. B Prodr. 159. cum præcedentibus.

SALIX fragilis C. B. P. 474. Prodr. 158. cum præcedentibus, ut & in ſylvis floret Martio & Aprili.

SALIX humilis, capitulo ſquamoſo C. B. P. 474. Salix tenuior folio minore, utrinque glabro, fragilis I. B. 1. 213. Salix helice Theophraſti Lugdun. 277. In ſaliceis paſſim floret cum præcedentibus.

SALIX montana, major foliis laurinis H. R. Pariſ. In montoſis, v. gr. auf dem Cunitzer-Berge, floret cum præcedentibus.

SALIX ſubrotundo argenteo folio C. B. P. 474. Prodr. 159. cum præcedentibus.

SALIX humilis, latifolia, erecta C. B. P. 474. Prodr. 159. In pratis uligine madentibus, & ericetis bey Rüttersdorff.

SALIX latifolia, repens C. B. P. 474. Salix puſilla, humilis; Salicula repens Camerar. Epit. 108. In uliginoſis pratis cum præcedentibus.

SALIX latifolia, rotunda C. B. P. 474. Salix latifolia, inferne hirſuta I. B. 1. 215. Salix caprea, rotundifo-

lia

lia Tabern. icon. 1038. In ſalicetis & dumetis frequens, floret Martio & Aprili. Iſt auch im Rauhenthale.

SALIX folio ex rotunditate acuminato C. B. P. 474. Salix caprea, latifolia Tabernæm. icon. 1038. cum præcedente.

SALIX platyphyllos, leucophlæos Lugd. 276. Salix aquatica Lobel. icon. 137. cum præcedentibus, auf der Cunitziſchen Inſul.

NB. In variis ſalicis ſpeciebus interdum conſpicitur folioſa quædam veluti viridis plena roſa, uti in plantagine roſea dicta, de qua vid. Eyſelius. Salix dicitur a ſaliendo, quia cito & quaſi ſaliendo creſcit & augmentum ſumit.

POPVLVS alba, majoribus foliis C. B. P. 429. Populus alba, λευκὴ I. B. 1. 160. Populus alba Dod. Pempt. 835. In ſalicetis & alnetis v. g. bey der Schul-Pforte zu Naumburg, auf denen Wieſen an der Unſtruth bey Laucha copioſe admodum adoleſcit in vaſtæ altitudinis arbores. Floret Martio. Pappel-Weide, weiſſer Pappel-Baum, weiſſe Pappel-Weide.

POPVLVS nigra C. B. P. 429. Dod. Pempt. 836. Populus nigra, ſive αἴγειρος I. B. 2. 155. In pratis & fluviorum ripis paſſim floret primo vere. Rhein-Weiden, ſchwartzer Pappel-Baum. Hujus oculi ſive gemmæ adoratæ & gelatinoſæ, primo verno tempore ad unguentum populeum parandum, (quæ german. Pappel-Salbe, oder Alberbruſt-Salbe audit) colliguntur, & vocantur Germ. Papel-Knoſpen, oder Aeuglein, Aber-Knöpffe, nec non Alber-Brüſt teſte Maurit. Hoffm. flor. alt. delic. hort. pag. 51. qui præterea teſtatur, quod folia eorumque petiola, ob adhæſum ſordium ſpermaticarum in bullas rubentes excreſcentia, quotannis culicibus cinericeis hoſpitium commodum præbeant, non ſecus ac ulmus, fraxinus, therebinthus, lentiſcus, quercus, fagus &c.

POPVLVS tremula C. B. P. 429. Populus Lybica, αἴγειρος Theophraſti I. B. 1. 163. Populus Lybica Dodon. Pempt. 836. Cum præcedente, nec non in ſylvis. Salix omnis pariter atque populus eſt mas & fœmina, non ſecus ac fraxinus. Germ. Aſpen, Eſpe, Zitter-Pappeln, hinc

prover-

proverbium: Zittern wie ein Aſpen-Laub, quia hujus arboris folia levi auræ flatu perpetim tremunt, unde Gallis tremble dicitur.

LENTISCVS & THEREBINTHVS, etiam huc ſpectant, quæ pariter aliquando in hortis curioſorum obvia ſunt, v. g. in dem Aremanniſchen Garten zu Gotha, quarum hæc reſinam therebinth. illa, maſtich. officinis ſuppeditat.

FRAXINVS excelſior C. B. P. 416. Fraxinus vulgatior I. B. I. 174. Fraxinus Dod. Pempt. 833. In pratis & ſylvis paſſim floret Martio & Aprili. German. Eſche, Eſch-Baum.

NB. Hujus folia in ſe convoluta, ſæpius fovent culicum numeroſas familias tam alatorum, quam non alatorum, qui Germanis Erd-Floh dicuntur, & braſſicæ valde infenſi ſunt; hi culices perforant folia & pediculos fraxini, unde exſudat liquor ille dulcis & ſubnauſeoſus, qui officinis manna dicitur, & inter laxantia numeratur, quam me eſſe Junio frequentem collegi in pratis nach Cunitz und Lobſtädt hin; Idem obſervarunt quidam de formicis; mihi vero, pariter quidem apparuere formiciæ, ſed quæ inſedebant auferendæ mannæ, & in ſuos acervos congerendæ, uti pariter notum eſt de reſina abietis & pini, hanc a formicis in ſuos acervos congeri, quæ a ruſticis collecta, ſub nomine Weyrauch vulgo venditur. Lignum vero Chirurgis ſuppeditat vulnerarium, vulgo Wund-Holtz dictum, cujus collectio ſuperſtitionem redolet, ſiquidem ipſa nocte, feſtum S. Johannis æſtate celebrari ſolitum, præcedente ſuperſtitioſa Chirurgorum cohors hoc lignum uno ictu cædendum velit; ſed hæc ulteriori inquiſitioni relinquimus, hoc vero mihi certiſſime conſtat, hoc eſſe verum lignum vulnerarium Chirurgorum, ſiquidem aliquando Chirurgorum hoc lignum ex fraxino tempore ante dicto reciderim, confer. Williſ. Pharmacia part. II. 215. & Flora Francica edit. germ. pag. 227. Hoc lignum aliqui in lue venerea, loco ligni ſancti commendant, e. g. Woyt in Gazophylacio Medico-Phyſico 372. Purmannus in ſeinen Lorbeer-Krantze, und Tract.

von

von der Salivation-Cur, Botallus in Tr. de morbis venereis &c.

ABIES taxi folio, fructu ſurſum ſpectante Tournefort. inſtit. 585. Abies conis ſurſum ſpectantibus, ſive mas. C. B. P. 505. Weiſſe Tanne.

ABIES fœmina, ſive ἐλάτη τηλεία I. B. 1. 231. Abies Cluſ. hiſt. 34. In montibus & ſylvis bey Jena-Prieſenitz u. nach Rothe zu, auch nach Schlefreißen hin floret Majo.

ABIES tenuiore folio, fructu deorſum inflexo Tournefort. Picea major, prima, ſive abies rubra C. B. P. 493. Picea Latinorum, ſive ἐλάτη ἄρρην, Abies mas Theophraſti I. B. 1. 238. Abies Dod. Pempt. 866. In ſylvis cum præcedente. Germ. rothe Tanne. NB. C. Cluſ. in hiſt. Pan. pag. 21. recenſet & piceam pumilam incrementis quibusdam fœtam, quæ non ſunt aliud, quam nidi inſectorum, non ſecus ac gallæ quercuum, uti ſæpius obſervavi non ſolum circa Giſſam, ſed & in ſylvis vaſtis hinter Schlefreißen und Städtgen Rotha nach den Voigtlande hin. Flores hujus arboris tantillum differunt a piceæ majoris C. B.

PINVS ſylveſtris vulgaris, Genevenſis I. B. 1. 253. Pinus ſylveſtris C. B. P. 491. In ſylvis & montibus paſſim floret Majo. Fichte, Fichten-Baum, Kihn-Baum, unde fuligo ex ejus ligni fumo collecta dicitur Kihn-Ruß. Hic arbor per ætatem abit in tædam, & præ nimia reſinæ copia quaſi ſuffocata, exareſcit, unde parati aſſerculi vulgo divenduntur, pro accendendis focorum ligni, ſub nomine Kihn, cujus loci alibi ſtramen ſecalis inſervit. NB. Pini de familia eſt, arbor ille montium Carpathicorum incola, quæ germanis Krumbholtz dicitur, ex qua paratur oleum vulgari oleo pini ſive, ut male dicitur, therebinthi longe efficacius eſt, & alia arbor ibidem, quæ Lien-Baum ex qua ſimiliter paratur oleum.

PINASTER vulgaris C. Cluſ. Pann. pag. 16. Vtrumque genus vulgaris pinaſtri a Cluſ. l. c. recenſitum provenit copioſum in pinetis nach Kleine und Schlefreißen zu.

CVPRESSVS metâ in faſtigium convoluta, quæ fœmina Plinii, Tournefortii. In hortis floret Martio Cupreſſe.

CVPRES-

CVPRESSVS ramos extra ſe ſpargens, quæ mas Plinii, Tournefort, cum præcedente.

THTA Theophraſti Ereſii & Tournefortii, nec non C. B. P. 488. Arbor vitæ, ſive paradiſiaca vulgo dicta, odorata, ad ſabinam accedens I. B. 1. 286. Arbor vitæ Cluſii hiſt. 36. In hortis floret Martio. Baum des Lebens, Lebens-Baum.

JVNIPERVS vulgaris, fruticoſa C. B. P. 488. Juniperus vulgaris, baccis parvis, purpureis I. B. 1. 293. In montibus v. gr. hinter dem Fuchs-Berge nach der Wellmeſe zu, und auf dem Forſte floret Martio. Wacholder-Staude, Krammet-Beeren-Staude, unde turdi, qui hujus baccis mire delectantur, vulgo dicuntur Krammets-Vögel. Eſtque juniperus duplicis generis, altera enim fert ſola ſtamina; altera vero embryones & baccas, quarum prior ſterilis audit, altera autem baccifera.

TAXVS I. B. 1. 241. Taxus Dod. Pempt. 859. In montibus v. gr. hinten auf dem Cunitzer-Berge floret Martio. Tax-Baum, Eiben-Baum.

MORVS, fructu nigro C. B. P. 459. Morus nigra I. B. 1. 118. In hortis floret Aprili.

MORVS, fructu albo C. B. P. 459. Morus alba I. B. 1. 119. cum præcedente floret Aprili & Majo. Maulbeer-Baum.

MOROCARPOS minor. Atriplex ſylveſtris fructu mori minor.

MOROCARPOS major. Atriplex ſylveſtris fructu mori major Moriſ. H. 2. vulgo Spinachiæ fragiferæ. In hortis florent æſtate.

CHENOPODIVM, pes anſerinus I. Taberu. icon. 427. Atriplex dicta, pes anſerinus I. B. 2. 975. Atriplex ſylveſtris, latifolia C. B. P. 119. Inter olera & ſegetes paſſim floret æſtate. Gänſe-Fuß, wilde Melte.

CHENOPODIVM, pes anſerinus II. Tabern. icon. 428. Atriplex ſylveſtris, latifolia, acutiore folio C. B. P. 119. Atriplex dictus, pes anſerinus alter, ſive ramoſior I. B. 2. 976. cum præcedente, & in ruderibus. Germ. Neun-Spitzen, Säu-Todt.

CHE-

CHENOPODIVM folio ſinuato, candicante Tournefort. inſtit. p. 586. Atriplex ſylveſtris, folio ſinuato candicante C. B. P. 119. Atriplex ſylveſtris I. B. 2. 972. Tabern. icon. 426. In ſimetis & ruderibus, nec non inter olera, & ſegetes frequens floret æſtate; foliis aliquando minus ſinuatis, halimi maritimi minoris æmulis, variat. Germ. Scheiß Melte.

CHENOPODIVM fœtidum Tournefort. Inſt. 506. Atriplex fœtida C. B. P. 119. I. B. 2. 974. Vulvaria Tabern. icon. 428. Germ. Wuhl-Kraut, Buhl-Kraut, ſtinckende Hure, Schaam-Kraut, Bocks-Kraut, ſtinckende Melte. In ruderibus, & ad ſepes frequens floret æſtate.

CHENOPODIVM anguſtifolium, laciniatum, minus Tournefortii. Tournef. inſtit. p. 506. Atriplex anguſtifolia, laciniata, minor I. B. 2. 972. Atriplex ſylveſtris, anguſtifolia, laciniata, minor Chabr. p. 305. Ad ſimeta v. gr. vor dem Saal-Thore auf der Inſul floret æſtate.

CHENOPODIVM folio laciniato, coma purpuraſcente Tournefort. inſtit. p. 506. Atriplex ſylveſtris, folio ſinuato, ſaturate virente, ſpica rubra Moriſon. Hiſt. oxon. part. 2. 604. in ſimetis v. gr. in denen Vorſtädten ad foſſulas v. gr. wo man nach dem Paradieß gehet, floret æſtate. Coma virescente quandoque variat; uti recte obſervavit Tournefortius.

CHENOPODIVM atriplicis ſativæ folio & facie, ſpicis multis, ſurrectis, veluti racemoſis, in foliorum alis. In pagis & ruderatis locis nach Gera hin; iſt auch häuffig in denen Dörffern zwiſchen Düben und Kämberg, wo man nach Wittenberg reiſet.

CHENOPODIVM folio triangulo Tournefortii. Lapathum unctuoſum folio triangulo C. B. P. 115. Bonus Henricus I. B. 2. 965. Tota bona Dodon. Pempt. 651. Stoltzer Heinrich, guter Heinrich, Schmirgel; ad pagos & rudera frequens floret Majo & Jun.

CHENOPODIVM betæ folio Tournef. inſtit. pag. 506. Blitum polyſpermum a ſeminis copia C. B. Pin. 118. Blitum erectius, ſive III. Tragi I. B. 2. 967. Blitum ſylveſtre

Camer.

Camer. Epit. 137. Germ. Stauderich. De hujus plantæ uſu ad capiendos piſces vid. C. B. in Matthiolum & ibique ſimul figuram hujus plantæ nitidam depictam pag. 358. Inter olera & ſegetes floret æſtate.

CHENOPODIVM ſuaveolens, foliis quernis. Chenopodium ambroſioides, folio ſinuato Tournefort. inſtit. p. 506. Botrys officinar. Botrys ambroſioides vulgaris C. B. P. 138. Botrys Dodon. Pempt. 34. In hortis floret æſtate. Germ. Trauben-Kraut, türckiſcher Beyfuß.

CHENOPODIVM ſuaveolens foliis longioribus Mexicanum. Chenopodium ambroſioides, Mexicanum Tournefort. inſtit. p. 506. Botrys ambroſioides, Mexicana C. B. P. 138. & app. 516. In horto medico. Hæc planta a plurimis pro thea venditatur, ſed male, non ſecus ac Gagel Germanorum male a Simone Pauli pro thea vera fuit habitum. De vera thea vid. Breynius & Kæmpffer. in amœnitat. exot. nec non S. Dale in Pharmacol. & Suppl.

CHENOPODIVM lini folio villoſo Tournef. Scoparia Rivini. Linaria Scoparia C. B. P. 212. Linaria belvedere dicta I. B. 3. 462. Oſyris Dodon. Pempt. 101. Belvedere Hortulanorum, apud quos inter hortorum ornamenta propter naturalem in pyramidem creſcendi, in metamque aſſurgendi modum, frequens eſt in hortis, v. gr im Fürſten-Garten, & floret æſtate.

CHENOPODIVM maritimum fruticoſum, teretifolium. Sedum minus, fruticoſum alterum. C. B. Pin. pag. 284. In horto medico floret Junio.

CHENOPODIVM annuum, humifuſum, folio breviori, & capillaceo Tournefort. Camphoratæ congener C. B. P. 486. Anthyllis altera Italorum. Lobel. icon. 404. In agris, & in ſabulis rivulorum quandoque obvium floret æſtate. Iſt häuffig neben der Straße über dem Ketſchauer Berge, nach Ketſchau hin; auch bey Teutſchdahl, wo man nach Schmohne reißet.

CAMPHORATA hirſuta C. B. P. iſt häuffig in ſabuloſis an der Berg-Straße, & floret Jul.

BLITVM album majus & minus C. B. P. 118. Inter

olera & in hortorum areolis, v. gr. im Fürſten-Garten floret æſtate.

HERNIARIA glabra I. B. 3. 378. Polygonum minus, ſive millegrana major, glabra C. B. P. 281. Herniaria Dod. Pempt. 114. In arenoſis v. gr. nach dem Dörffgen Rothe zu, und der neuen Schencke, auch auf der Land-Veſte hinter der Schieß-Mauer ꝛc. floret æſtate. Bruch-Kraut, Tauſend-Korn, Harn-Kraut. vid. Tract. de herniaria ocularia.

PARIETARIA officinarum & Dioſcoridis C. B. Pin. 121. Parietaria Dod. Pempt. 102. I. B. 2. 976. In dem Zwinger hinter der Stadt-Mauer, variis in locis frequens floret Majo & Junio. Germ. Glaß-Kraut, Sanct Peters-Kraut.

PARIETARIA minor ſive folio ocymi. In muris Germaniæ inferioris & Bataviæ non infrequens floret cum præcedente, v. gr. zu Düſſeldorff, Keyſers-Werd, Leyden ꝛc.

ATRIPLEX hortenſis, alba, ſive pallide virens C.B. Pin. 119. Atriplex alba, hortenſis I. B. 2. 970. Atriplex ſativa alba. Lobel. icon. 253. Inter olera v. gr. auf der Inſul floret æſtate. Melte.

ATRIPLEX hortenſis rubra. C. B. Pin. 119. Atriplex rubra hortenſis I. B. 2. 970. cum præcedente.

ATRIPLEX latifolia, ſive halimus fruticoſus Moriſon. Hiſt. oxon. part. 2. 607. Halimus latifolius ſive fruticoſus C. B. P. 120. Halimus I. Cluſ. Hiſtor. 53. Halimus Cluſii I. B. 1. 227. In horto medico floret æſtate.

ATRIPLEX maritima, anguſtiſſimo folio Moriſon. Hiſt. oxon. part. 2. 608. Halimus ſive portulaca marina C. B. P. 120. Portulaca marina; An Crithmum Dioſcoridis Lobel. icon. 392? cum præcedente.

ATRIPLEX anguſto, oblongo folio C. B. P. 219. Atriplex ſylveſtris, polygoni aut helxines foliis Lobel. icon. 257. Atriplex vulgaris, anguſtifolia, cum folliculis I. B. 2. 973. In ſimetis & ad rudera, nec non ad ſepes frequens floret æſtate. Communiter folia habet anguſta, oblonga, non laciniata; rarius foliorum principio, ſive baſi alæ duæ apponuntur, uti recte obſervavit C. P. in Pinace.

ATRI-

ATRIPLEX folio haſtato, ſeu deltoide Moriſon H. R. Bleſ. cum præcedente, qua latiora multo folia habet deltoidea, & in acutum mucronem excurrentia.

ATRIPLEX ſylveſtris fructu roſeo, compreſſo C. B. Pin. 119. & Prodr. 58. Ad mœnia & rudera v. gr. um ganz Lobeda, Wöllnitz, und Burgau floret æſtate; folia habet incana, anguloſa. Atriplex, tam ſativa, quam ſylveſtris, duplicis generis ſemina habet; altera Chenopodii ſeminibus plane ſimilia, altera vero non tam depreſſa, quam compreſſa, & longe ampliora, & duobus utrinque teguntur foliis angulatis aut cordiformibus, vel etiam liiia gallica referentibus, quod præcipue de ultima incana fructu roſeo valet. Melte.

BETA alba, vel palleſcens, quæ Cicla officinarum C. B. P. 118. Beta candida I. B. 2. 961. Dod. Pempt. 260. In hortis & agris ſata frequens floret æſtate v. gr. auf der Inſul, und bey Wenigen-Jena. Germ. Römiſch Kohl, Beiß-Kohl. Hujus bétæ ſuccus eſt errhinum fortiſſimum, non ſine cautione adhibendum.

BETA rubra vulgaris C. B. P. 118. Beta rubra I. B. 2. 961. Dod. Pempt. 620. cum præcedente.

BETA rubra, radice rapæ C. B. P. 118. Beta radice rubra, craſſa I. B. 2. 961. Beta rubra, romana Dod. Pempt. 620. cum præcedentibus; hujus radicibus communiter comeduntur in cœna cum carnibus aſſatis, ubi rothe Rüben vocantur.

BETA pallide virens, major C. B. P. 118. cum præcedentibus.

PINASTELLA ſurrectior. Polygonum fœmina Dioſc. & Matthioli, nec non Camerar. Epit. p. 324. Equiſetum brevioribus ſetis, polyſpermon C. B. in ſtagnantibus aquis & paludibus bey Karßdorff, auch im Paſſendorffiſchen Graben bey Halle, wird auch zuweilen bey Schleben auf denen Teichen gefunden, floret Jun.

PINASTELLA infirmioribus & hamoſioribus caulibus, foliis inſtar cornu cervi diviſis. Millefolium aquaticum cornutum I. B. an & C. B. omnia quadrant, ſi florem de-

mas; ſiquidem hoc genus florem habeat imperfectum, ſtamineum, ad foliorum alas, & ſemen in iisdem ſeſſile, nudum, unicum, cortice viridi tectum.

CLASSIS XVII.

DE PLANTIS FLORE CARENTIBVS, VEL SALTIM FLORE MINVS CONSPICVO, CVJVS NEC STAMINA HACTENVS DETECTA SVNT, INSTRVCTIS.

I. Dorſiferæ, vel Epiphylloſpermæ.

THELTPTERIS Dioſcoridis. Filix fœmina officinarum & Dod. Pempt. 462. Filix ramoſa, major, pinnulis obtuſis, non dentatis *C. B.* P. 357. Filix major & prior Trago, ſive ramoſa, repens I. *B.* 3. 735. In ſylvis nach Schlefreißen und Rothe zu viget, & ſeminum glomeres limbum foliorum pulchre occupantes profert æſtate; In hac ſeminum ſeminaliumve capſularum diſpoſitione thelypteris differt a filicibus, quæ per totam averſam foliorum ſuperficiem diſperſas reniformes gerunt capſulas. Farren-Kraut. Vulgus hujus radicem ſuperſtitioſe, imo impie vocat JEſus Chriſtus Wurtzel; quia ſibi perſuadet, in hujus radicibus transverſim diſſectis, conſpiciendas ſe præbere duas literas J. C. vel quoniam hæc radix dicto modo conciſa, ſignum crucis hominibus immaginatione fortiori gaudentibus, vel quaſi exhibet; ſed hæc ſunt nugæ a quonam aſſecla Romani Pontificis forſan excogitatæ. Præterea vanitas hujus immaginationis ex hoc elucefcit, quod

quod alii ex papicolarums cruce effinxerint aquilam bicipitem, quæ a cruce Salvatori noſtri tantum diſtat, quantum cœlum a terra.

THELYPTERIS paluſtris, non ramoſa. Filix ad marem vulgarem, non ramoſam accedens non dentata Chabr. p. 553. Et hæc in limbo diſpoſita ſemina gerit, non ſecus ac præcedens; adeoque huc ſpectat. Iſt häuffig in ſumpfigten Wäldern um Wittenberg, v. g. in den großen Luch, auch wo man nach Tragun gehet, viget cum præcedente.

FILIX ramoſa minor, pinnulis dentatis C. B. Pin. 3. 58. Filix querna ejusdem; ibid. Filix ramoſa minor I. B. 3. 741, In montoſis ſylvis v. gr. auf der Wellmeſe nach Rothe zu. Junio ſemina producit.

FILIX non ramoſa dentata C. B. Pin. 358. Filix vulgo mas dicta, ſive non ramoſa I. B. 3. 737. Filix mas officinarum & Dod. Pempt. 462. In ſylvis paſſim nach Kleine und Schlefreiſen zu ſemina fert Julio; hæc eſt illa filix, cujus radix officinas ingreditur, ſub nomine filicis maris.

FILIX non ramoſa, petiolis tenuiſſimis & tenuiſime dentatis C. B. Pin. 358. Filicula petræa, fœmina, I. Tabern. icon. 793. In petris & ſylvis zwiſchen Kleine, Rütſtersdorff und Schlefreißen, cum præcedente.

FILIX mollis, ſive glabra, vulgari mari, non ramoſæ accedens I. B. 3. 738. cum præcedentibus.

FILIX tenuiſime ſecta ex monte Balon I. B. 3. 739. cum præcedentibus in umbroſis.

FILIX rhætica, tenuiſime dentata I. B. 3. 740. Chabr. 554. Filix paluſtris maxima C. B. Prodr. 150. In ſylvis umbroſis & udis nach Schlefreiſen zu.

FILIX mas, non ramoſa, tenuiſime, & profunde dentata Chabr. p. 553. cum præcedentibus.

FILIX lonchitidi affinis Chabr. 554. Filix mas aculeata minor & major C. B. Prodr. 151. Lonchitis aculeata major & minor Tournefort. inſtit. p. 538. cum præcedentibus.

FILIX ſaxatilis, ramoſa, nigris maculis punctata C. B. Pin. 358. Filix ſaxatilis prima vel mas Cluſii pannon. &

hiſtor. plantar. In ſylvis ad arborum radices & petras umbroſas bey Haynbüchen und Rothe viget, & ſemen perficit æſtate.

FILICVLA fontana minor C. B. Pin. 358. Filicula fontana Tabern. icon. 792. In petris udis & umbroſis v. gr. im Rauhenthale.

FILICVLA fontana major, ſive adianthum album filicis folio C. B. Pin. 358. Adianthum album folio filicis I. B. 3. 741. Cum præcedente, ſed rarius.

FILICVLA, quæ adianthum nigrum officinarum, pinnulis obtuſioribus, acutioribusve Tournefortii in inſtit. pag. 542. Adianthum foliis longioribus, pulverulentis, pediculo nigro C. B. Pin. 355. Adianthum nigrum officinar. I. B. 3. 742. Dryopteris nigra Dod. pempt. 466. an Felſen nach Haynbüch und Rothe zu.

FILICVLA montana, folio vario Tournef. inſtit. 542. Adianthum album, tenuifolium, rutæ muratiæ accedens I. B. 3. 743. Adianthum foliis minutim in oblongum ſcisſis, pediculo viridi C. B. Pin. 355. cum præcedente.

FILICVLA ſaxatilis, corniculata Tournef. inſtit. p. 542. Filix ſaxatilis, corniculata C. B. P. 358. Filix ſaxatilis Tragi I. B. 755. Holoſtium petræum Tabern. icon. 736. In petris vaſtioribus variis in locis viget æſtate, nec hyeme plane perit. Nach Dörffgen Rothe, und der Leuchtenburg.

FILICVLA ſaxatilis non ramoſa alis reflexis, in petris nach Städtgen Rotha und Haynbüchen, viget tota æſtate.

TRICHOMANES, ſive polytrichum officinarum C. B. Pin. 356. Trichomanes, ſive polytrichum I. B. 3. 754. Trichomanes Dod. pempt. 471. Trichomanes minor mas Tabern. icon. 803. ubi & varietatem ramoſam exhibet. In petris umbroſis v. gr am Hauß-Berge, und im Rauhenthale hin und wieder. Wieder-Tod, güldner Wiederthon, Steinbrech.

POLYPODIVM vulgare C. B. Pin. 359. Polypodium I. C. 3. 746. Polypodium majus Dod. pempt. 464. in petris & arborum truncis nach der Leuchtenburg und Rothe

zu

zu viget ſemenque perficit æſtate. Engel-ſüß, wild Süß-Holtz.

SPICANT Tragi & Germanorum. Polypodium anguſtifolium, folio vario Tournef. inſtit. p. 540. Lonchitis minor C. B. Pin. 359. Lonchitis altera, folio polypodii I. B. 3. 744. Germ. Spicant, oder Krafft-Faren, groß Miltz-Kraut. In ſylvis nach der frölichen Wiederkunfft zu, auch zwiſchen Bollwerck und Schlefreiſen, viget æſtate; Hæc planta a polypodio diſtinguitur, non ſolum quod duplicis generis habeat folia, altera meditullium ceſpitis occupantia, anguſtioribus, quaſi ſcalaribus & ſeminiferis laciniis diſſecta, altera vero limbum ceſpitis occupantia, latioribus lobis inciſa & ſterilia: Sed & quod vermiculi ſeminales phyllitidem magis, quam polypodium æmulentur. Spicantam Schlefreiſenſes eorumque vicini cereviſiæ indunt non absque ſanitatis emolumento.

PHTLLITIS Dioſcoridis. Lingua cervina officinar. C. B. Pin. 353. Phyllitis, ſive lingua cervina vulgi I. B. 3. 756. phyllitis vulgaris Cluſ. hiſtor. CCXIII. In hortis viget æſtate: v. g. in hortulo rhizotomi Wenig-Jenenſis; ſua ſponte autem provenit in ſylvis circa Saalfeldam. Hirſch-Zunge. Vulgus cum ſcolopendrio confundit, quod nomen potius ſequenti plantæ competit.

ASPLENIVM, ſive Ceterach officinarum C. B. Pin. 354. Aſplenium Dod. pempt. 468. An der Kirch-Mauer zu groſſen Ehrich viget æſtate. Miltz-Kraut. Egregia Aſplenii figura vid. in Epiſt. Matthiol. ad Maranthum & Camerarii Epit. Matthioli p. 306.

MVRARIA Rivini. Ruta muraria Tournef. C. B. Pin. 956. I. B. 3. 753. & officinarum, nec non Dodon. pempt. 470. Paronychia Matthioli. Mauer-Raute. In muris, variis in locis v. gr. beym Pförtgen an der Schloß-Mauer & alibi viget æſtate.

II. Plantæ, quæ nec florem, nec fructum, quantum conſtat, gignunt, qualem antea recenſitæ plantæ, floris vero loco ferunt capitula varie diſpoſita & figurata, in quibus pollen, pollinis ſtaminum plantarum flore

perfecto gaudentium, æmulus; qualem v. g. deprehendimus in antheris liliorum alborum.

OSMVNDA major & paluſtris. Filix latifolia Cordi & Tragi copioſa provenit ad piſcinas Miſniæ bey dem Churfürſtlichen Jagd-Hauſe, Sitzin-Rode.

LVNARIA Rivini, & Dod. pempt. 139. Lunaria botrytis I. B. 3. 709. Lunaria racemoſa, minor vel vulgaris C. B. Pin. 354. Osmunda foliis lunatis Tournefort. inſtit. p. 547. Mond-Kraut, Mond-Raute; teſte Camerar. In aſperis, apricis & vineis neglectis variis in locis v. gr. nach dem Rauhenthale, Cloſewitz und Krippendorff zu, iſt auch an ſumpffigten Orten um die Teiche zwiſchen dem Voigtlande und Böhmen; de aliis locis vid. Tragus. Viget Junio. Racemis ramoſis & multifidis quandoque variat, quæ eſt

LVNARIA racemoſa, ramoſa major C. B. P. 355. Osmunda foliis lunatis ramoſa Tournefort. inſtit. p. 545. cum præcedente, ſed rarius. Sæpius occurrit auf dem Enſels-Berge. De Lunariæ varietatibus & ſpeciebus vid. Camerar. Epit. Matthiol. pag. 308.

OPHIOGLOSSVM vulgatum C. B. Pin. 354. Ophioglosſon officinarum & I. B. 3. 708. Dod. pempt. 139. In apricis pariter atque umbroſis v. gr. in der Zißke und auf der Tannig-Wieſe bey Jena-Prieſenitz; occurrit Majo & Junio. Foliis anguloſis & ſubrotundis quandoque variat; quin & lingua gemella quandoque ludit, de quo vid. Matthiolus a C. B. editus, & Menzelius in pugillo. Schlangen-Zunge, Natter-Zunge.

LYCOPODIVM officinarum, & Tabern. icon. 814. Muſcus ſquamoſus, vulgaris, repens a Trago pictus I. B. 3. 766. Muſcus terreſtris, clavatus C. B. Pin. 360. In ſylvis remotioribus nach Querl und Vollwerck ꝛc. zu frequens ſpicas producit hyeme & vere; hujus ſpeciei pollen in julorum, ſquamarumve reniformibus corpuſculis contentus officinas ingreditur ſub nomine ſulphuris Lycopodii. Germ. Bärlap, Wolffs-Klauen, Gürtel-Kraut, Gürtel-Moß, Teuffels-Klau, Haarſchaar ꝛc. De hujus efficacia contra plicam polonicam vid. Obſervationes Eberhardi Goeckelii;

ckelii; & de uſu ejusdem ad ignes artificioſos apud Moſcos & Perſas vid. Olearii itinerarium. Superſtitioſi ex hac planta circulos efficiunt, & de parietibus ſuſpendunt ad detegendas ſagas; ſiquidem ipſis perſuaſum ſit, ſi ſaga ingrediatur in hypocauſtum illud, tunc lycopodium moveri.

LYCOPODIVM alterum, foliis juniperinis, reflexis, clavis ſingularibus, ſine pediculis nudis. Muſcus ſquamoſus, foliis juniperinis reflexis Tournefort. Muſcus clavatus, juniperinis foliis reflexis, clavis ſingularibus, ſine pediculis Moriſon. Hiſtor. oxon. part. 3. 624 Sect. 15. Tab. 5. fig. 3. Cum præcedente, præcipue in pinetis nach Rudersdorff und der Leuchtenburg zu, auch nach der frölichen Wiederkunfft hin.

LYCOPODIVM ſabinæ facie. Muſcus terreſtris, ramoſus, pulcher I. B. & Chabr. p. 560. Sabina ſylveſtris Tragi & Matthioli. Muſcus ſquamoſus, montanus, repens, ſabinæ folio Tournefortii. In altioribus ſylvis, v. gr. bey Rothe, auf dem Enſels-Berge bey Gotha viget toto anno, auch unter Schieblau im Walde; und auch bey Saals Münſter; in groſſen Wäldern hinter Gera im Voigtlande. Sabina ſylveſtris dicitur propter ſimilitudinem & faciei & virium.

EQVISETVM paluſtre, longioribus ſetis C. B. Pin. 15. Equiſetum majus aquaticum I. B. 3. 728. Hippuris Lobel. icon. 793. In paluſtribus, udis, montoſis tamen v. gr. in der Zißke, und bey der Wöllnitziſchen Mühlen floret Vere. Tabernæmontanus in iconibus vocat Hippurin Dioſcoridis, caudam equinam p. 251. Pferde-Schwantz.

EQVISETVM ſylvaticum tenuiſſimis ſetis C. B. Pin. 16. Equiſetum, ſive Hippuris tenuiſſima, non aſpera. I. B. 3. 730. In ſylvis & agris nach Rothe und Schlefreißen zu floret Aprili & Majo; hæc ſpecies julum fert in ſummo caule, præcedens vero in remotis, brevibus petiolis, id quod Tabernæmontanus figura ſua recte expreſſit. Hæc planta agris, valde exitioſa eſt, quos ſæpius totos occupat, & ſegetes defraudat.

EQVISETVM paluſtre, brevioribus ſetis C. B. Pin. 15. Equiſetum paluſtre Lobel. icon. 795. In aquoſis v. gr.

neben dem Fuß-Wege, wo man nach Burgau gehet, über die Wiesen in denen sumpffigten Weiden floret Majo; hæc species primo plane nuda est. Pyxidatim vero articulata sunt ipsius caulis & folia, non secus ac aliorum omnium equisetorum.

EQVISETVM arvense, longioribus setis C. B. Pin. 16. Equisetum minus terrestre I. B. 3. 730. In pratis & agris passim floret Martio & Aprili; Germ. Kanne-Kraut, Tauben-Rock, hoc utuntur mulierculæ ad vasa stannea mundanda & polienda. Et hæc species suos julos, sive clavas in separatis fert scapis, ceu asparagis ex eadem tamen radice oriundis ante alterorum folioforum & sterilium caulium proruptionem, unde Equisetum nudum, minus, variegatum basileense C. B. P. 16. ab hoc minime distinguendum puto.

EQVISETVM palustre minus, polystachyon C. B. Pin. 16. II. in prodromo. Am Ufer der Saale v. g. in denen Weiden und Erlen an der Saale gegen der Rase-Mühlen über, floret Majo & Junio.

EQVISETVM foliis nudum, non ramosum, sive junceum, ἱππούρις ἄφυλλος C. B. Pin. 16. Hippuris nuda, Equisetum nudum Tabern. icon. 251. In sylvis nach Schleßreißen und Steinburg zu floret majo; hæc est aspera illa equiseti species, cujus cauliculis utuntur opifices ad perpolienda sua opera, quam vulgo Schachtel-Halm vocant. Equiseti species, non secus ac osmundæ, & lycopodii, ophioglossique in suis clavis non semina, sed sulphur gignunt; hinc consultius huc reponuntur, quam cum Tournefortio inter spinachiam & Ricinum, quæ enim Preston apud Rajum in methodo plantarum emendata & aucta de seminibus equisetorum profert, hactenus deprehendere nemo potuit.

SELAGO foliis & facie abietis. Selago tertia Thalii. Muscus erectus, ramosus, saturate viridis C. B. Pin. 360. Muscus terrestris, rectus, I. B. 3. 767. Muscus erectus, abieti formis Raj. hist. 121. Muscus squamosus, abieti formis Tournefort. instit. p. 553. In sylvis zwischen Rosthe und Schleßreißen, auch bey Bollwerck in Wäldern, wo

wo die Spicant wächſt, florat, vigetque Martio & Aprili. Hæc planta a lycopodio diſtinguenda, ſiquidem corpuſcula ſulphur ſuum foventia, non in clavam, ſpicamve adacta, nec ad apocarpos referri non poteſt muſcos, cum non in ſummitate plantulæ ſingulum gerat capitulum, ſed in foliorum alis per totam ramulorum longitudinem. De hujus plantæ viribus in meretriculis ad abortum excitandum conſulantur Ephemerid. naturæ Curioſorum Germaniæ. Germ. wilder Sade-Baum, propter ſimilitudinem tum quoad faciem externam, tum quoad vires; nam & Sabina eadem virtute pollere apud ſcorta ſatis nota eſt.

Sequuntur Muſci; quos melioris diſtinctionis gratia in apocarpos, (h. e. petiolis verſus capitula deſtitutos, ſive quorum capitula nullis petiolis inſident; a particula privativa Græcorum α, & voce Græca πούς, pes, & καρπὸς fructus, quaſi dicas fructum gignens ſ. gerens ſine pediculo,) & pediculis donatos dirimemus. Hos vero poſteriores, denuo in terreſtres repentes, & erectos ſ. polytricha dictos diviſuri.

MVSCVS apocarpus, ſaxatilis, capitulis obſcure rubris; hujus etiam meminit Rajus, in ſupplemento hiſtoriæ plantarum inter reliquos muſcos apocarpos authori a D. Scherardo, (Botanico ſolertiſſ. & perſpicaciſſ. qui poſtea Anglorum Smyrnæ Conſul conſtitutus fuit) communicatos. In ſaxis hinc inde inter reliquos muſcos frequens capitula gignit Hyeme & primo Vere.

MVSCVS apocarpus, ſaxatilis, capitulis & tota planta albo-pellucidis; In ſaxis montis Kunizenſis capitula profert cum præcedent.

MVSCVS apocarpus, ſaxatilis, brevi, denſo tamen, ceſpite naſcens, capitulis amplioribus, dilutius rubentibus, ſtriatis. In ſaxis vinearum v. gr. bey der Schneide-Mühlen capitula producit Martio & Aprili.

MVSCVS apocarpus ſylvaticus, ceſpitoſus, capitulis craſſis, virenti bus; hic loco ſulphuris tria quatuorve granula continet a ſeminis milii magnitudine, quod hactenus

nus in muſcorum regno inauditum : viget im Rauhenthale.

MVSCVS apocarpus, terreſtris, foliis latiuſculis, congeſtis, capitula occultantibus. In ſuburbiorum agris capitula maturat Martio, quæ inter foliorum congeſtionem conniventem requirenda ſunt. Multum ſimilis eſt muſco coronato, minori, foliis latiuſculis, ad caulem convolutis, capitulis obtuſis aureis, (de quo poſtea) ſi demas, quod noſter hic ſit apocarpos, alter vero longis petiolis capitula ſuſtentet adunca & nutantia.

MVSCVS apocarpus, capitulis ſeſſilibus, inter foliolorum, capillo quovis tenuiorum, ceſpitulos, capitulis, primo albis, per maturitatem vero fuſcis, rubrisve.

MVSCVS apocarpus, omnium minimus, capitulis omnium minimis, intra breviſſimorum foliolorum ſquamoſorum, & ſquamatim ſibi incubentium perbrevem, flaveſcentem ceſpitulum occultatis; cum præcedente in aggeribus foſſularum agros terminantium.

MVSCVS apocarpos, aquaticus, foliis triangularibus, complicatis, acutiſſimis, in flagellis longis, potomegetonis cujusdam inſtar fluitantibus. Muſcus ſquamoſus, foliis acutiſſimis in aquis naſcens Tournef. inſtit. p. 554. & 555. Muſcus aquaticus, folio expanſo C. *B.* Prodr. 154. Fontalis minor lucens I. *B.* 3. 778. Muſcus aquaticus, viticulis longis, minus ramoſis, lucidis, foliis acutis, triangularibus cinctis Moriſon. Hiſt. oxon. part. 3. p. 626. ſect. 15. Tab. 6. fig. 32. In ſtagnis v. gr. im groſſen Paradieße, nach Wöllnitz zu, auch anderswo in den Bächen, v. gr. nach denen Schlefreiſiſchen Schneide-Mühlen hin. Capitula producit in ſingulis foliolorum alis, ſingula non prorſus quidem ſeſſilia, ſed perbrevibus petiolis ſuſtentata, nuda tamen & calyptra plane deſtituta, unde huc ſpectat: Omnes enim apocarpi capitula habent calyptra deſtituta. Hujus capitula ſunt duriuſcula, & veluti ovata, vel pyriformia, in ſummitate apiculata.

Sequuntur nunc Muſci pediculis & calyptris inſtructi; inter quos, tanquam apocarpis proximus agmen ducit.

MV-

MVSCVS capillaceus, minimus, acaulos, calyptra ſtriata Tournefort. inſtit. 552. Adiantum aureum, acaulon, pilis ſtriatis Muſ. Petiv. cent. I. num. 34. In petris & ſaxis campeſtribus paſſim, ut & in corticibus arborum. Poſtquam calyptram exuerit, aliam fere faciem induit: præcipue ſi loca fuerint nemoroſa, & umbroſa; producit capitula hyeme & Vere.

MVSCVS capillaceus, major, pediculo & capitulo craſſioribus Tournefort. Polytrichum aureum majus C. B. Pin. 356. Polytrichum Apuleji; majus quibusdam I. B. 3. 760. Adianthum aureum Tabern. icon. 797. & offic. Germ. güldner Wiederthon. In ericetis, & ſylvis paſſim toto fere anno capitulis quadrangularibus, quibus calyptræ villoſæ inſident, ornatum occurrit. In ſylvis uliginoſis & ericetis humidis, hinter Schlefreißen occurrit longe majus & filis ſive cauliculis rigidis, qui eſt muſcus Scoparia Belgarum, ex quo ſcopas ad veſtes everrendas parant, uti alibi exerica & Geniſta.

MVSCVS capillaceus, ſtellatus, prolifer Tournefortii cum præcedente.

MVSCVS capillaceus, major, capitulis longiſſimis, & acutiſſimis Tournef. inſtit. p. 551. Muſcus coronatus, medius, foliis tenuiſſimis, pallidis, longioribus, capitulis erectis, acutis Moriſon. hiſt. oxon. part. 3. 630. ſect. 15. Tab. 7. fig. 11. Polytrichum aureum, medium, Raj. Hiſt. 124. In ſylvis v. gr. auf dem Forſt ꝛc.

POLTTRICHVM ſeu muſcus capillaceus, minor, capitulis geminatis Tournefortii. In ſylvis bey Bollwerck und Schlefreißen occurrit Vere.

POLTTRICHVM ſ. muſcus capillaceus, minimus, capitulo minimo, pulverulento Tournefortii. In ſylvis bey Wittenberg. v. gr. in der Speck occurrit hyeme & vere.

MVSCVS capillaceus, medius, capitulis globoſis, Tournefort. inſtit. p. 551. Muſcus trichoides, minimus, ſericeus, capillaceus, capitulis ſphæricis Moriſ. Hiſt. oxon. part. 3. 628. ſect. 15. Tab. 6. fig. 6. Muſcus trichoides, medius, capitulis ſphæricis D. Doodii Raj. Synopſ. 30. in aggeribus viarum per ſylvas montoſas ducentium, v. g. im Rauhenthale

henthale nach dem Fichten-Walde zu, auch auf dem Cunitzer Berge, viel häuffiger auf dem Hartz bey Ilefeld. NB. Hic eſt idem ille muſcus alpinus cirrhoſus ſive crinium retortorum inſtar criſpatus, qui ſub hoc nomine a Scheutzero in itineris alp. 2di obſervationibus botanicis pag. 65. depictus exhibetur; Notandum vero hujus muſci recentia, & adhuc viridia capitula eſſe rotunda, per maturitatem vero flaveſcentia & oblonga, producit capitula Febr. & Martio.

MVSCVS capillaceus, minor, capitulo longiori, falcato, Tournefort. Muſcus capillaris Dod. Pempt. 475. Muſcus polytrichoides, elatior, foliis anguſtis, pellucidis, & fere membranaceis Raj. Synopſ. 32. Plukenet. phytograph. Tab. 44. fig. 7. In ſylvis, præcipue umbroſis, primo vere erumpit, & capitulis maturatis iterum evaneſcit.

MVSCVS capillaceus, omnium minimus Tournefort. inſtit. p. 552. Muſcus coronatus, minimus, foliolis & capitulis oblongis, in pediculis breviſſimis Moriſon. Hiſt. oxon. part. 3. 631. ſect. 15. Tab. 7. fig. 18. In aggeribus & ad ſcrobes um die Schneide-Mühlen herum floret Februario.

*M*VSCVS capillaceus, minimus, muralis, ſtellatus Tournefortii. *M*uſcus muralis, minimus, roſeus, ſive ſtellaris, capitulis longiuſculis, acutis, rectis, *M*oriſ. Hiſt. oxon. part. 3. 629. ſect. 15. Tab. 6. fig. 12. In murorum, pontiumque interveniis, ubi calx compagines firmat, capitula producit hyeme & primo Vere.

*M*VSCVS coronatus, humilis, rigidior, capitulis longis, acutis, ſeſſilibus, erectis *M*oriſ. hiſt. oxon. part. 3. 630. ſect. 15. Tab. 7. fig. 8. In muris & tectis ſtramineis ruſticorum frequens, nec non ad arborum radices in ſylvis, producit capitula Hyeme & primis Veris tempeſtatibus, procelloſisque imbribus, non ſecus ac univerſa muſcorum progenies.

*M*VSCVS capillaceus, minimus, calyptra longa, conoidea, nitida Tournef. *M*uſcus trichoides, minor, pileis magnis, acutis *M*uſ. Petiv. Cent. I. num. 89. Adianthum aureum, perpuſillum, foliis congeſtis, acutis, pileo extinctorii forma

forma æmulo Raj. Synopſ. 32. *Muſcus coronatus, humilis, tenuifolius, pileolo magno, acuto, infra aperto, extinctorium referente Moriſon.* Hiſt. oxon. Part. 3. 630. ſect. 15. Tab. 7. fig. 12. In muris, aggeribus, & montibus, v. gr. in dorſo ſeptemtrionem ſpectante, & verſus ſeptemtrionem declinante des Fuchs-Berges; item: auf den alten verfaulten Holtze der Welmſe, & alibi in locis conſimilibus. Ad ſepes in umbroſis, calyptris prælongis & conoidibus tecta capitula producit Februario, Martio & Aprili.

MVSCVS latifolius, erectior & altior, capitulis pariter calyptra conoidea, nitida, longioreque occultatis, foliolis latiſſimis in roſæ formam ſæpe diſpoſitis. Auf dem Forſt, auch in dem Holtze bey Cloſewitz.

MVSCVS capillaceus, minimus, capitulis pyriformibus, turgidis Tournefort. Muſcus coronatus, humilis, ſtellaris, foliis, capitulis pyriformibus, erectis, turgidiuſculis Moriſon. Hiſt. Oxon. part. 3. 631. Sect. 15. Tab. 7. fig. 16. Muſcus capillaris, parvus, capitulis magnis pyriformibus, erectis, in pediculis brevioribus Raj. Synopſ. 29. In aggeribus foſſularum & ſtagnorum, v. gr. in umbroſis aggeribus, an denen Mühlen vor dem Johannis-Thore.

MVSCI TRICHOIDES nunc ſequuntur capitulis pendulis, ſive nutantibus.

*M*VSCVS capillaceus, major, capitulis craſſioribus, cylindraceis, nutantibus Tournef. *Muſcus capillaris*, foliolis latiuſculis, congeſtis, capitulis oblongis, reflexis Raj. Synopſ. 33. *Moriſon.* hiſt. oxon. part. 3. 629. Tab. 6. Sect. 15. fig. 19. In ſylvis & nemoribus; Stellatis foliis citra pediculum, & capitulum quandoque variat, quod recte annotavit Tournefortius.

*M*VSCVS capillaceus, major, & elatior, capitulis cylindraceis, obtuſis, nutantibus Tournefortii. *Muſcus capillaris major & elatior*, capitulis longis, obtuſis, deorſum reflexis, & veluti pendulis, prælongis pediculis, rubris. Raj. Synopſ. 34. *Moriſ.* hiſt. oxon. part. 3. 629. Tab. 6. Sect. 15 fig.

fig. 20. In saxis & vinearum muris hinc inde viget Vere & capitula sua profert.

MVSCVS capillaceus, folio rotundiore, capsula oblonga, incurva Tournefort. *Muscus* coronatus, minor, foliolis latiusculis, ad caulem convolutis, capitulis cernuis, obtusis, aureis *Morison.* hist. oxon. part. 3. 631. sect. 15. Tab. 7. fig. 17. *Muscus* capillaris, pediculis bulbosis, uncialibus, pallidis, capitula oblonga, reflexa sustinentibus Raj. Synopf. 34. In sylvarum putrefactis truncis, & in locis, ex quibus hortulani cespites effoderunt, & alibi in agrorum confiniis capitula producit primo anno; Calyptras habet primo angulosas, pediculo brevi insidentes, sub quibus vix, & ne vix quidem capitula apparent, si detrahas; postea vero incrementum acquirens, & altius excrescens calyptras deponit, & capitula pyriformia reddita, incurvantur, & cauliculi præ pondere capitulorum veluti in semicirculum flectuntur. Posteaquam vero pediculi, veluti elaterem per siccitatem rigidam acquisiverunt, iterum se erigunt, & capitula antea, vel maxime nutantia, nonnisi aduncа repræsentant. Adeoque multum errant, qui cum Tournefortio Polytrichum aureum, minus C. B. Pin. 356. sive polytrichum Apuleji, minus quorundam I. B. 3. 760. pro distincta muscі specie habent, siquidem nonnisi ætate differant. Figura ipsius videatur in Pancovii herbario portatili.

MVSCVS capillaceus, lanuginosus, minimus Tournefort. *Muscus* trichoides, hirsute canescens, capitulis *subrotundis*, reflexis, in perbrevibus pediculis Raj. Synopf. 34. *Muscus* trichoides, hirsutus, capitulis oblongis, reflexis, pediculis brevibus insidentibus D. Doodii *Morison.* Histor. oxon. part. 3. 629. sect. 15. Tab. 6. fig. 21. In saxis campestribus pariter atque sylvaticis nec non in tectorum tegulis frequens capitula sua gignit Februario, eademque perficit Martio & Aprili.

MVSCVS capillaceus, minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo Tournefort. *Muscus* trichoides, capitulo parvo, reflexo, pediculo imâ medietate rubro, summâ luteo-viridi Raj. Synopf. 34. *Morif.* hist. oxon. part. 3. 629. sect.

ſect. 15. Tab. 6. fig. 15. In aggeribus, & muris paſſim figet, & capitula gignit primo Vere.

MVSCVS terreſtris capillaris, foliis rarioribus & acutioribus capitulis, deorſum pendentibus, ac veluti roſtratis & apiculatis oblongis. Provenit prope molendinas torrenti leiter appoſitas, an denen Mühl-Graben.

MVSCVS argenteus, capitulis reflexis, Raj. Synopſ. 34. Muſcus minimus, e viridi argenteus, capitulis oblongis cernuis, Moriſon. hiſt. oxon. part. 3. 629. ſect. 15. Tab. 6. fig. 17. In murorum apricis, & aggeribus Soli oppoſitis circa pagos pariter atque urbes viget, & capitula gignit primis anni deglaciationibus, poſtquam degelaſcit annus, & prima Botanices rudimenta pullulant; quod & de reliquis muſcis fere omnibus valet; hi enim circa muſcos labores ſunt quaſi hyemales & autumnales.

MVSCVS ſquamoſus, paluſtris, candicans molliſſimus Tournefort. inſtit. p. 554. Muſcus paluſtris Dodon. pempt. 472. Muſcus paluſtris terreſtri ſimilis Raj. hiſt. 122. In pratis & ericetis uligine madentibus v. gr. nach Bubeck und Waldeck hin paſſim capitula gignit toto anno ſpadicea horizontaliter diſſilientia, uti recte obſervavit Pluknetius & Scherhardus Poſet, ſi placeret, ad apocarpos referri, ſiquidem pediculo, ſaltim longiori, pariter atque calyptra deſtituatur; Foliis candicantibus, & rubentibus variat, non ſecus ac latioribus ſtrictioribusve.

NB. Antecedentes muſci recenſiti, fuerunt capitulis reflexis, hic autem habet nuda ovalia & ſurrecta; ipſius fig. extat in Pluken. Phytographia, nec non in Bodonæo Scheutz. itin. alpin. I. obſ. botanicis Tab. 5. Fig IV. Hujus etiam meminit C. B. in Cap. de rorella in Pin. pag. 357. ubi dicit rorellam marem & fœminam inter muſci albicantis & ſubrubentis genera creſcere Vid. etiam Floræ Altorfinæ deliciæ ſylveſtres.

MVSCI TERRESTRES, capitula aduncа ſuſtinentes, ex foliorum alis prodeuntes, ſeu potius ex ramulorum ſubdiviſionibus.

MVSCVS filicinus, major C. B. P. 360. Muſcus filicinus I. B. 3. 764. Tabern. icon. 807. In ſylvis paſſim, præcipue ad arborum radices; producitque capitula cum præcedentibus. Ab hoc minime differt.

MVSCVS caſſubicus criſtam caſtrenſem referens Breynii. In petris & ad arborum radices im Rauhenthale unten in der Glunz.

MVSCVS ſquamoſus, foliolis rotundis, denſe poſitis, ramoſus, major, im Rauhenthale ad radices arborum occurrit; an ſpecies Jungermanniæ?

MVSCVS ſquamoſus, repens, veluti ſpicatus Tournefort. Muſcus ramoſus, repens, ſpicatus C. B. Pin. 36. Muſcus repens, veluti ſpicatus. Prodr. 151.

MVSCVS filicinus, minor C. B. Prodr. 151. Muſcus filicinus, minor, floridus C. B. P. 360. Moriſon. hiſt. oxon. part. 3. 625. ſect. 15. Tab. 5. Fig. 21. In ſylvis paſſim.

MVSCVS ſquamoſus, pennatus, capitulis adianthi Tournefort. inſtit. p. 555. Muſcus pennatus, capitulis adianthi Raj. Synopſ. edit. 1690. 236. Moriſon. hiſt. oxon. part. 3. 626. ſect. 15. Tab. 6. Fig. 36. In muris, & ad arborum baſes paſſim.

MVSCVS vulgaris, pennatus, major C. B. Pin. 360. Muſcus pennatus Prodr. 151. In ſaxis & ad arborum radices. Hic ſaxis arcte adnaſcitur, & ſæpe ſua veſtigia multo poſt ſui evaneſcentiam tempore conſpicua relinquit, unde ſuſpicor, ſimile quidpiam aliquando contingere in Islebienſibus illis lapidibus; quod aliis inquirendum relinquo & commendo, viſa ſane mihi fuere illa veſtigia eſſe potius muſci filicini, quam filicis.

MVSCVS vulgaris, pennatus, minor C. B. Pin. 360. cum præcedente.

MVSCVS pennatus, omnium minimus, cum præcedentibus.

MVSCVS foliolis planis, acutis, cornua alcis referens, ramoſus, major; In ſylvis udis & opacis v. gr. in der Druſenitz bey Wintzerla.

MVSCVS

MVSCVS foliolis planis, acutis, nemoroſus, non ramoſus, minor; in nemorum opacis locis. Hunc quidam pro muſco filicino, ſive pennato minore Johannis Raji venditant.

MVSCVS terreſtris, vulgatiſſimus. In pomariis, & pratis paſſim. Rarius capitula gignit: Mirum Botanicos in re tam vulgatiſſima pariter atque viliſſima conſentire hactenus non potuiſſe. Hortenſi una cum aliis primo Vere ex hortis projiciunt.

MVSCVS abietis facie C. B. Pin. & Prodr. p. 151. Ad arborum, fruticumque ſylveſtrium radices paſſim; foliola vero vix conſpiciuntur, niſi madefiant, quod etiam de reliquis muſcis valet, uti recte obſervavit Joh. Rajus.

MVSCVS ſquamoſus, erectus, major C. B. Prodr. 151. Ad arborum radices paſſim.

MVSCVS ſquamoſus, erectus, minor C. B. Prodr. cum præcedente.

MVSCVS ſaxatilis, ericoides, C. B. Prodr. p. 151. In fontium lapidibus diſperſus. v. gr. zu Lichtenhayn occurrit.

MVSCVS ſquamoſus, dendroides, repens Tournefort. inſtit. Muſcus dendroides, ſylvarum erectus, ramulis Kali æmulis, radice repente Raj. Synopſ. Moriſon. hiſt. oxon. part. 3. 626. ſect. 15. Tab. 5. fig. 22. In pratis, præcipue uliginoſis, pariter atque ſylvis. Hujus figura habetur in Tournefort. Tab. 326. Litera D.

MVSCVS ſquamoſus, dendroides, ſurculis veluti in capitulum congeſtis Tournef. inſt. p. 554. Muſcus dendroides, elatior, ramulis crebris, minus ſurculoſis, capitulis pediculis brevibus inſidentibus Raj. Synopſ. Moriſon. hiſt. oxon. part. 3. 626. ſect. 15. Tab. 5. figura 31. In pratis & ſylvis, præſertim uliginoſis frequens: Hujus figura habetur in Tournefortii Tab. 326. ſub litera B.

MVSCVS ſquamoſus, linariæ folio, major & criſpus Tournefort. inſtit. pag. 554. Muſcus terreſtris, ramulis compreſſis, foliis ſuperficie criſpis D. Scheuard. Moriſon. hiſt. oxon. part. 3. 625. ſect. 15. Tab. 5. fig. 10. Ad arborum truncos, ut & in petris deprehendimus, in groſſen

Wäldern paſſim. v. gr. bey Gießen im Kleiberger Walde, und auf dem Haugelſtein; iſt auch häuffig auf dem Hartz bey Ilefeld.

MVSCVS cupreſſiformis, Tournef. inſtitut. pag. 554. Muſcus cupreſſiformis, ramoſus C. B. Pin. 361. Muſcus cupreſſiformis Prodr. 152. Muſcus terreſtris, vulgaris, cupreſſi foliis Muſ. Petiv. Cent. I. num. 81. Ad arborum Truncos & ſtipites paſſim in ſylvis.

MVSCVS terreſtris, ramoſus, erectus, pallidus. In pratis, pomariis frequens obvius eſt; foliola habet tantillum reflexa.

MVSCVS terreſtris, e viridi palleſcens, denſe naſcens, foliolis reflexis; cum præcedente, præcipue in ſubudis.

MVSCVS montanus, erectus, ramoſus pallidus Joh. Raji. In ſylvis.

MVSCVS ericetorum, hirſutie caneſcens, & ramoſus; In ericetis, quercetisque paſſim.

MVSCVS montanus Tabern. icon. 809. In ſylvis paſſim.

MVSCVS polygoni folio, Tournefort. 326. fig. E. Muſcus ad polytrichoidem accedens, ramoſus, foliis longis, lucidis, & veluti criſpis Moriſon. Hiſt. oxon. part. 3. 630. ſect. 15. Tab. 6. fig. 1. Muſcus ad polytrichoidem accedens, arbuſcutam referens, foliis longis Raj. Synopſ. 36. Ad ſepes vinearum, & in dumetis, præcipue opacis frequens, rariſſime floret.

MVSCVS paluſtris, major, ſerpilli folio Tournefort. inſtit. 556. Muſcus polytrichoides, paluſtris, major, ſerpilli latioris folio pellucido Moriſon. Hiſt. oxon. part. 3. 627. ſect. 15. Tab. 6. fig. 39. Muſcus trichoides, foliis ſerpilli rotundis Raj. Synopſ. In paludoſorum pratorum limitibus frequens.

MVSCVS paluſtris, foliis ſubrotundis Tournefort. Muſcus polytrichoides humilior, alternis foliis pellucidis Moriſon. hiſt. oxon. part. 3. 627. ſect. 15. Tab. 6. fig. 40. Muſcus polytrichoides, humilior, foliis latis, ſubrotundis, Plukenet. Phytograph. Tab. 45. fig. 7. Muſcus trichoi-

des, foliis ſerpilli rotundis Raj. Synopſ. In paludoſis, & ad ſepes umbroſas & uliginoſas.

MVSCVS nummulariæ folio, major Tournefort. in inſtit. 555. Muſcus trichomanis facie, foliis utrinque ſplendentibus, rotundis Jungermanni Moriſon. Hiſtor. oxon. Part. 3: 627. ſect. 15. Tab. 6. Fig. 41. Muſcus trichomanoides, ſupinus, noſter, elegans, Plukenet. Almageſt. Bot. & Phytogr. In pratis uliginoſis, & inter pomariorum gramina frequens.

NB. Omnes hæ ſequentes plantæ, vulgo quidem muſcis permiſcentur, ſed male; aptius ad Jungermannias referuntur.

MVSCVS nummulariæ foliis, ſubrotundis, denſe poſitis Tournefort. Muſcus trichomanoides foliis rotundioribus, pellucidis, ſquamatim conjuncte ſibi incumbentibus Moriſ. Hiſt. oxon. part. 3. 627. ſect. 15. Tab. 6. fig. 42. In ſylvarum opacis v. gr. im Rauhenthale. Hic muſcus habet capitula ipſis foliorum ſquamis in extremitate ſurculorum occultata; poſſet ad Jungermannias referri, vel ad Lichenes.

MVSCVS ſaxatilis, nummulariæ folio, ſurſum reflexo, concavo, & bifido; an Muſcus ſaxatilis, nummulariæ folio, minor Tournefortii? In petroſis, udis, & opacis v. gr. zwiſchen Bollwerck und Schleyfreißen, neben dem Mühlen-Flüßgen hin ad ſemitam. Et hic muſcus inſtar præcedentis ſua gignit capitula.

MVSCVS ſuxatilis, foliis tribus quatuorve denticulis acute diſſectis, cum præcedentibus.

MVSCVS lichenoides, foliolis polygoni, oblongis, & rarius diſſitis, in cauliculis perbrevibus; cum præcedente.

MVSCVS lichenoides, capillaris & veluti ceſpitoſus. In ſylvarum rivulorum limitibus. v. gr. im Rauhenthale, neben dem Fahrwege, nach dem Fichten-Walde zu; iſt häufig im Kleiberger Walde bey Gießen, cum ſubſequente.

MVSCVS lichenoides, quaſi filicis folia diviſionibus ſuis referens. Vid. figura *Muſci* filicini Tournefort. inſtit.

ſtit. Tab. 326. Lit. C. wird im Naubenthale gefunden, wo man von dar nach dem Fichten-Walde gehet, und fähret.

MVSCVS pennatus, foliis ſubrotundis, bifidis, major Moriſon. hiſt. oxon. part. 3. 627. num. 46. Inter reliquos terreſtres muſcos in opacis & ſubudis ad ſepes.

MVSCVS pennatus, foliis ſubrotundis, bifidis, minor Moriſon. Muſcus lichenoides, foliis pennatis, bifidis, minor Raji Moriſon, hiſt. oxon. part. 3. 627. num. 47. Cum præcedente, præcipue in ſylvula prope neuen Flemmingen an diſſeit Naumburg.

LICHEN fructu hypophyllo, latifolius: Lichen petræus, cauliculo calceato C. B. Pin. Lichen alter minor, caule ὑποδεδεμένῳ Fab. Col. Ecphraſ. In nemoribus & ſaltibus; nec non ſub altiſſimâ ripâ Salæ, wo man nach Cunitz gehet, occurrit mediâ æſtate.

LICHEN petræus, minimus, fructu orobi C. B. Pin. 362. ſeu potius Jungermannia latifolia nemoroſa, capſulis oroboide. Lichen alter ὑποφυλλοκαρπος Fab. Column. cum præcedente:

JVNGERMANNIA nemoroſa, pediculo altiſſimo, tenerrimo, & candicante. Lichen petræus, cauliculo pileolum ſuſtinente C. B. P. 362. Lichen Plinii primus pileatus Fab. Columna. Ecphraſ. In ſylvarum udis & opacis v. gr. nach der Leuchtenburg zu, auch zwiſchen Bellwerck und Schleiffreißen viget toto fere anno.

JVNGERMANNIA foliis ſubrotundis, denſiſſime & imbricatim diſpoſitis, viridis, major; In arborum, & fruticum baſibus, truncisve humidis & opacis occurrit toto fere anno.

JVNGERMANNIA foliis ſubrotundis, denſiſſime & imbricatim diſpoſitis, viridis, minor. Muſcus ſquamoſus, foliis ſubrotundis, denſiſſimis Tournefort. Muſcus muralis, floridus, foliis, ſubrotundis, creberrime imbricatim diſpoſitis, ſive muſcus muralis platyphyllos Moriſon. Hiſt. oxon. part. 3. 627. ſect. 15. Tab. 6. Fig. 44. cum præcedente.

JVNGER-

JUNGERMANNIA ſylvatica minor, nigricans. In arborum, fruticumque caudicibus, terræ proximis.

JUNGERMANNIA alpina nigricans, major, pedes gallinaceos ſquamis ſuis mentiens, iſt ſehr häuffig an denen Felſen auf dem Hartz, beym Kloſter Ilefeld.

NB. Sub Lichenis nomine (quod hic omnino monendum videtur) plures veniunt plantæ, quæ tamen non fructificatione, vel florendi modo, ſed potius naſcendi modo inter ſe conveniunt; quas qui ſeparare ſub diſtinctis nominibus voluerit, gratum opus fecerit.

Sequuntur plantæ Lichenibus vel quaſi ſimiles, in pediculis ſuſtinentes capitula umbellatarum plantarum æmula, vel integra umbonis inſtar, vel radiatim diſſecta; quos Tournefortius, non ſecus ac carices (ad Cyperoideum familiam ſpectantes) tanquam ad ſorum ſuum non pertinentes, plane omiſit.

LICHEN petræus, latifolius, ſive hepatica fontana officinarum C. B. Pin. 362. In petris udis, & opacis, v. gr. nach Rothe hin; occurrit toto anno Hepatica I. Tabernæmontano dicitur in iconibus 815. videatur & Mathiolus, qui eandem figuram exhibet; aliquando foliis anguſtioribus, & imbricatim ſibi quaſi incumbentibus, vel adnatis, inſtar Opuntiæ, variat. Leber-Kraut, Brunnen-Leber-Kraut, Stein-Leber-Kraut.

LICHEN petræus, ſtellatus C. B. Pin. 362. Tabernæm. icon. 815. In petris aſpergine madentibus v. gr. an der Saale zwiſchen Kambs-Dorff und der Schneide-Mühlen, an dem Ufer unten.

LICHEN petræus, umbellatus C. B. Pin. 362. Hepatica tertia Tabern. icon. 815. cum præcedente, ſed rarius: Fruſtra vero Rajus hanc ſpeciem confundere nititur cum ſequente, quæ eſt

LICHEN ſaxatilis, latifolius, viridis, corium carchariæ piſcis referens, ad foliorum apices exanthemata ſua condens. Bey Städtgen Rothe an denen rothen Felſen frequens in opacis.

HEPATICA petræa, umbellata, pariterſ ac Cyathophora, in cujus Cyathis veluti ſemina nidulantur. In rivulorum, & aquæ ductuum marginibus in Wingerla, mit der Rothe; forſan quoque totum hoc genus meræ ſunt varietates, quocunque vero nomine cuilibet inſignire placuerit, per me licet: Hanc & huic congeneres eleganter cum ſtellata depictas quis videre cupit, adeat Camerar. in Epit. ad Matthiol. pag. 782. Tournefort. plane omiſit, non ſecus ac acorum & ſabinam.

Sequuntur Lichenes Tournefortiani peltati, digitative.

LICHEN cruſtaceus, cinereus, arborum, ſaxorum, ac tegularum. Lichen Dioſcoridis & Plinii ſecundus, colore cinereo Column. part. I. 331. Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens, colore cinereo C. B. Pin. 361. In locis indicatis occurrit toto anno. Colore viridi variat. Diverſus vero eſt, qui ſequitur

LICHEN cruſtaceus, arborum pariter atque ſaxorum tegularumve. Lichen Dioſcoridis & Plinii ſecundus, colore flaveſcente, Column. part. I. 331. Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens, colore flaveſcente C. B. Pin. 361. Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens, flavus Raj. Hiſt. 116. cum præcedente.

LICHEN cruſtæ modo arboribus adnaſcens, pullus Tournefort. Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens, pullus Raj. hiſtor. 116. cum præcedente; præcipue in corticibus alnorum in opacis, ut & in ſylvarum ramis.

LICHEN cruſtæ modo arboribus adnaſcens, tenuiter diviſus Tournefort. inſtit. 584. muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens, cinereus, mollior, & in anguſtiores lacinias diviſus Raj. hiſt. 116. cum præcedentibus.

LICHEN cruſtæ modo ſaxis adnaſcens, verrucoſus, cinereus, & veluti deuſtus Tournefort. In ſaxis campeſtribus, aſperis & apricis.

LICHEN arboreus, ſive pulmonaria arborea I. B. 3. 759. & officinarum. Muſcus pulmonarius C. B. P. 361.

361. Pulmonaria Dodon. pempt. 474. Baum-Lungen-Kraut. In quercubus pariter ac fagis occurrit toto anno. Hæc peltas profert copioſas atque fuſcas per totam foliorum ſuperficiem, ſed rarius, quod aliquando obſervavi in ſylva illa vaſtiſſima Kleibergenſi, menſe Februario. Laciniarum diviſionibus & figura, nec non colore quandoque variat.

NB. Camerarius in ſua epitome, juxta hanc ſequentia ad hunc depinxit genera, nimirum No. 2. anguſtifoliam, quæ lichen rigidus, foliis eryngii eſſe videtur. No. 3. aliam punctatam, quæ lichen terreſtris, viridis, latifolius, nigris tuberculis notatus videtur; Quam vero No. 4. exhibet eſt Lichenis ſpecies, C. Bauhino muſcus pyxidatus major dicta.

LICHEN arboreus, ampliſſimus, rigidus, per dorſum eminentiarum verrucoſis, albicantibus, & veluti margaritularum æmulis excreſcentiis obſitus. Cum præcedente.

LICHEN pulmonarius, cinereus, mollior, in amplas lacinias diviſus Tournefort. inſtit. p. 549. Lichen cinereus lactucæ folio Element. de Botanique 438. Tab. 325. fig. A. B. ut & in inſtitutionibus eadem in tabula, ubi nitidiſſima hujus lichenis ſub iisdem literis exhibetur figura: Ab hac lichenis ſpecie nonniſi ætate differre videtur muſcus arboreus foliis abſinthei C.B. foliorumque figura, & amplitudine mirum variat hæc lichenis ſpecies. Paſſim occurrit in ſylvis & pomariis.

LICHEN arboreus, capillaceus, ramoſus, cinereus. In arboribus variis occurrit toto anno. Ex hac ſpecie fieri ſolet pulvis cypricus vulgo Poudre dictus, admiſta iridis florentinæ pulvere.

LICHEN terreſtris, pinetorum, rigidus, foliorum Eryngii æmulus, baſi purpuraſcente, ſubſtantia ad fuſcum vergente: In pinetis nach dem Rauhenthale hin, und Spitznaſens Gut occurrit toto anno.

LICHEN pulmonarius, ſaxatilis, digitatus, major, cinereus, Tournefort. Lichen terreſtris, cinereus Raj. hiſt. 117. In ericetis, & paſcuis, vinearumque limbis occurrit toto anno, nec non in ſylvis ubi foliorum quantitate &

qualitate mirum ludit: De hujus plantæ virtutibus vid. Samuel Dahle in pharmacologiæ ſupplemento pag. 44.

LICHEN pulmonarius, digitatus, ericetorum læte virescens, nigris punctis notatus. Cum præcedente, præcipue nach der Leuchtenburg zu in Wäldern, occurrit toto anno.

LICHEN pyxidatus, major Tournefort. Muſcus pyxioides, terreſtris C. B. Pin. 361. Muſcus pyxidatus I. B. 3. 767. Muſcus terreſtris, pyxidatos alabaſtriculos imitatus Lobel. icon. 267. In ſylvarum putridis truncis, ſaxis, & deſertis viarum limitibus frequens occurrit, toto anno. Contra tuſſim convulſivam infantum laudat Williſius, & ex eo Sam. Dahle. Camerarius in ſuo Matthiolo vocat Cyprian Hößlin pag. 363. & juxta pulmonariam arboream pinxit. Magnitudine figura, altitudine pediculi, pyxide ramoſa, & quaſi prolifera (in cujus pyxidum oris ſuaviſſime coccineæ, & tumentes extuberantiæ, & quandoque fuſcæ conſpiciuntur) variat. De quibus videatur muſcus multiformiter pyxidatus, apicibus coccineis D. Plot. Hiſt. Staffordſ. 199 Tab. 14. fig. 1. Hujus elegantiſſimæ plantulæ varietates pluribus recenſet. Tournefort. in inſtit. p. 549. Vid. etiam Scheutzerus in Itin. alp. II. obſ. botanicis p. 63. nec non in itin. alp. I. p. 37. 39.

LICHEN terreſtris ericetorum, baſi mucoſa, capitulis fungoidibus, carnei coloris; Fungi minimi, muſco innati, incarnati coloris Mentzel. in pugillo. In ſylvis bey Schleiffreiſſen, auch Eiſenach, in ericetis paſſim, & locis apricis, argillosis.

LICHEN pyxidatus, acetabulorum oris fuſcis & tumentibus Tournefort. cum præcedentibus in arborum truncis putridis.

LICHEN cinereus, arboreus, marginibus fimbriatis Tournefort. inſtit. pag. 550. Muſcus arboreus, ſupinus, marginibus piloſis Raj. Hiſt. 116. In arborum truncis terræ proximis, non ſecus ac in dumetis occurrit toto anno.

LICHEN arboreus, hirſutus. capitulis cavis, nigris.

MVSCVS arboreus, capitulis cavis C. B. Pin. 361. Muſcus latifolius, ramoſus, minor, hirſutus Tournefort. inſtit. 550. Muſcus alter πλατυφυλλοδάσυφυλλος Fab. Column. 334. In arborum corticibus paſſim. Magnitudine, quin & colore, nec non capitulorum paucitate, vel multitudine mirum variat.

LICHEN arboreus, foliis abſinthii & mollioribus & candioribus. In arboribus, præcipue prunis, ſylv. majoribus bey Cloſewitz.

LICHEN arboreus, elegantiſſimus, bronchiarum ramificationes referens. In vaſtioribus ſylvis v. gr. bey dem Schleffreiſiſchen Teiche im Walde.

LICHEN pyxidatus, cornu ſimplici, quem Rajus in ſupplemento ex obſervatione D. Doodii annotavit, copioſe provenit cum vulgatiſſimo pyxidato, cujus nonniſi varietas videtur, non ſecus ac reliquæ ſuperius recenſitæ omnes.

LICHEN nemoroſus, vireſcens, peltis rotundioribus, ex fuſco & violaceo colore nigricantibus: im Raubenthale. Hic lichen inferius, ſive in parte foliorum averſa elegantibus ſulcis albicantibus diſtinctus eſt.

LICHEN ſaxatilis, ampliorib⁹, & elegantiſſimis ſcyphis nigricantibus ornatus. Hujus ſcyphulos male pro acetabulo petræo Plukenetii habuit Joh. Rajus, ſiquidem eandem figuræ Plukenetianæ plane quadrantem plantam deprehenderim in pineto bey Kleineu in confragoſis & riguis petris. Dicatur ergo hæc planta cum Plukenetio.

ACETABVLVM petræum, majus (ſiquidem & minus quandoque in corticibus arborum humidis deprehenderim) in udis & aſpergine madentibus petris bey Kleine im Fichten-Walde, figura vid. apud Plukenetium in phytographia.

LICHEN gelatinoſus, fugax, major. In opacis ſylvarum, & dumetorum lapidibus occurrit Majo & Jun.

LICHEN gelatinoſus, fugax, minor. Cum præcedente.

LICHEN gelatinosus, fugax, minor, lobis crassioribus, endiviæ foliorum æmulis. Cum præcedentibus.

LICHEN gelatinosus, minus fugax, in tenuia & veluti aculeata segmenta divisus. Cum præcedentibus passim.

LICHEN gelatinosus, lobatus, crassior, peltatus. Cum præcedentibus.

NB. Hæ plantæ gelatinosæ a nemine hactenus sunt descriptæ; videntur vero esse varietates lichneis membranacei fugacis, cujus meminit Petrus Magnol in Botanico Monspeliensi, ubi testatur, quosdam hanc plantam pro excremento stellarum habere, & eodem uti in laboribus chymicis; alii vero intestina ranarum a corvis devoratarum, colliquata pro tali venditant, uti testatur D. Merret. in pinace rerum naturalium Britanniæ; sed omnes ineptiunt; siquidem stella cadens sit meteorum ex sulphureis terræ exhalationibus ortum, instar ignis fatui.

LICHEN cinereus, latifolius, ramosus Tournefortii in instit. Muscus alter, quernus, latifolius, coralloides, aphyllon Fab. Column. part. 1. 335. In arboribus passim occurrit toto anno.

BYSSVS petræa, crocea im Rauhenthale in der Glunz; auch in der Drüsenitz bey Wintzerla.

BYSSVS petræa, carnescens: Variis in locis provenit instar muci; Muscus vero ipse nonnisi species Byssi videtur, siquidem non solum per microscopia capitula in eodem deprehendantur; sed & illius speciem invenerim, quæ capitula oculis enormibus plane perspicua gerebat, v. gr. in corticibus arborum putridis bey Lichtenhayn.

Sequuntur FVNGI, quos compendii & methodi gratia in ramosos, Boletos, echinatos, & porosos subdividere licuerit.

FVNGVS bulbosus, fuscus, duplici pileolo C. B. Pin. 371. Fungus quercinus, dipsacoides Column. part. 1. 337. in sylvis v. gr. auf dem Jentzig zwischen dem Hauß- und Gleißberge, occurrit Jun. Jul. & Augusto.

FVNGVS

FVNGVS lamellatus, & capitatus, vulgatiſſimus, Champignou vulgo dictus; Hujus lamellæ inferius rubent. In hortorum areolis, plantarum hybernaculis, & in ſylvarum opacis dumetis occurrit.

FVNGVS orbicularis, oris intro reflexis C. B. ab hoc parum differre videtur.

FVNGVS magnus, totus albus, ſine lacteo ſucco, edulis, Columbettes Montbelgard. I. B. 3. 826. in ſylvis variis autumno frequens eſt.

FVNGVS albus, dictus Mompelgardenſibus, & vicinis Biſette I. B. 3. 825. cum præced.

FVNGVS piperatus, albus, lacteo ſucco turgens I. B. 3. 825. Fungus, albus, acris C. B. Pin. 371. in ſylvis occurrit Aug. & Sept. v. gr. im Cloſewitziſchen Hölzgen. vid. Raj. hiſt. plant. univerſ.

FVNGVS pileolo lato, puniceo, lacteum & dulcem ſuccum fundens C. B. Pin. 371. in abietis & pinetis bey Kleine. Brötlinge.

FVNGVS abietinus, oris reflexis, ſubſtantia rubra C. B. Pin. 374. interius diffractus rubrum fundit ſuccum; hic comeditur & in pinetis & abietis frequens occurrit Jul. & Aug. Qui plures fungos noſſe deſiderat, adeat Cluſium, & Steerbekii theatrum fungorum.

FVNGVS lamellatus, varius, noxius, & muſcarius vulgo dicitur. Fungus muſcas interficiens C. B. vid. Camer. in Matth. p. 387. Fliegen-Schwamm. In ſylvis bey Ruttersdorff und Schlefreißen.

FVNGVS eſculento ſimilis, ſed noxius. In ſalicetis bey Wenigen-Jena occurrit æſtate.

FVNGVS Capreolinus Tabern. In ſylvis nach Kleine und Ruttersdorff hin occurrit æſtate.

FVNGVS echinatus, luteolus, minor, de quo videatur Joh. Bauhinus; cum præcedente.

FVNGVS echinatus, maximus, umbraculo ampliſſimo, obſcuro & nigricante; hujus ſynonymum videatur in Flora Altdorfina agreſtri. In ſylvis bey Kleine, Ruttersdorff, und der Leuchtenburg ſub pinis & abietibus occurrit æſtate.

FVNGVS

FVNGVS porosus, maximus. Fungus Augusti mensis Bauhini. In sylvis v. g. hinter dem Fürsten-Brunnen frequens viget Aug. Germ. Biltzen.

FVNGVS porosus, pediculo crassissimo, & instar caulis cepæ ventricoso; In sylvis v. g. auf dem Forst; hujus nitidissima figura videatur apud Clusium.

BOLETVS esculentus, rugosus, albicans, quasi fuligine infectus Tournefort. Morcheln Germanis, morille Gallis dictus. Hujus species videantur apud Menzelium, Clusium, & Tournefortium, quæ a rusticis in foro venduntur promiscue.

BOLETVS pediculo & capitulo donatus, nondum descriptus, inter præcedentis species occurrit Aprili & Majo.

BOLETVS mitram Pontificis referens, nigricans. Fungus autumnalis velut apex flaminis Plinii Menz. in pug. apud quem videatur figura delicatissima.

BOLETVS mitram Pontificis referens, albicans. Cum præcedente v. g. Hinter dem Fürsten-Brunnen in pineris: auch wo man von Jena-Priesenitz nach der Wellmese gehet.

BOLETVS phalloides Tournefort. Boletus phallum referens. Fungus phalloides vulgo. In sylvis bey Schwartzburg und Kalten-Nordheim: Wird auch zuweilen bey Jena im Rauhenthale gefunden, und in denen Wäldern bey Voltersrode. Germ. Hirsch-Brunst über der Erde.

FVNGVS ramosus, coralloides vulgo Ziegenbart dictus. In sylvis passim occurrit æstate.

CORALLOIDES flava Tournefortii. Fungus ramosus, flavus I. B. 3. 837. in sylvis occurrit Aug. & Sept. Germ. Ziegenbart, Händel-Schwamm.

CORALLOIDES albida Tourn. Fungus ramosus albidus I. B. 3. 837. cum præcedente.

CORALLOIDES dilute purpurascens Tournefort. XIX. generis esculentorum fungorum 2. species Clus. Histor. CCLXXV. cum præcedentibus.

CORALLOIDES ramoſa, minima, aurantii coloris Tournef. Fungus ramoſus, minimus, colorisaurantii Raji Synopſ. 15. In pinetis bey Ruttersdorff.

CORALLOIDES ramoſa, candidiſſima, digitata Tournef. Fungus ramoſus, condidiſſimus, ceranoides, ſeu digitatus, minimus Raj. Synopſ. 15. In ſylvis ad dejectos putridos arborum truncos bey Schleſreißen; wird auch im Rauhenthale gefunden.

CORALLOIDES ramoſa, nigra, compreſſa, apicibus albidis Tournefort. Fungus ramoſus, niger, compreſſus, parvus, apicibus albidis Raj. Synopſ. 15. ad putridos arborum truncos occurrit autumno & hyeme. Tournefort. hanc plantam duobus diverſis ſub titulis recenſuit, nam capite de agarico eandem poſuit ſub nomine agarici digitati nigri, apicibus albidis; loco ultimo inter agaricos.

FVNGOIDES vulgatiſſimum. Fungus ſeminifer Menzelii. In areolis hortorum, & quiſquiliarum putridis lignis occurrit Autumno. v. g. Auf der Land-Veſte nahe vor dem Saal-Thore.

FVNGOIDES ſylvaticum, hirſutum & fiſcum. In ſylvis v. g. im Rauhenthale, und auf der Wellmeſe ad truncos arborum.

FVNGOIDES Coccineum, oris piloſis, acetabuli forma Tournefort. Fungoides coccineum, oris piloſis, & veluti ciliaribus; ad ligna putrida v. g. an der Wehre gegen der Schneide-Mühlen über occurrit æſtate & autumno; auch bey Wöllnitz an dem Fußpfade derer Wieſen.

FVNGOIDES coccineum, acetabuli forma Tournefortii. Fungoides Peziza dictum, coccineum. Ad ſemitas v. g. wo man von Laaßdorff nach Bubeck reiſet.

FONGOIDES Peziza dictum, albicans; In umbroſis ſylvulæ Cluſewizenſis occurrit æſtate.

FVNGOIDES Peziza dictum, acetabulum referens, & ſubalbum; In putridis arborum truncis occurrit Autumno.

FVNGOI-

FVNGOIDES turbinatum, disco albo, basi fuliginosa. In vines desertis auf dem Hauß-Berge, wo man nach Jena zu herunter gehet occurrit Aprili.

FVNGOIDES sylvaticum minus & tenerius, pedicula donatum, nondum descriptum im Rauhenthale, unter dem Laub, an alten Aesten.

FVNGOIDES avorense turbinatum inferius nigrum, superius canescens, auf denen Aeckern und Wein-Bergen, wo man von Fuchs-Berge herunter gehet, occurrit cum præcedente Martio.

FVNGOIDES alpinum coccineum, pediculo longiori albicante donatum, unten an denen Gebürgen bey Jlefeld.

LYCOPERDON Parisiense, minimum, pediculo donatum Tournefort. Tab. 331. fig. E. F. Fulgus pulverulentus, minimus, pediculo longo insidens Raj. synopf. 16. In ambitu urbis, in muro occurrit Aprili: nec non in vinearum limitibus variis in locis.

LYCOPERDON capite cylindraceo, ex fuligineo colore nigicante, pediculo nigro, setaceo insidens basi pressissimæ, vestigiorum cochlearum æmulæ. In sylvarum dejectis putridis truncis viget æstate.

LYCOPERDON sanguineum, sphæricum Tournefortii. Fungus sanguineus, sphæricus Boccon. Musf. Part. 1. Tab. 304. fig. 3. Cum præcedente.

LYCOPERDON Vulgare Tournef. Fungus rotundus, orbicularis C. B. Pin. 374. Fungus orbicularis *Dodon.* descript. Pempt. 484. Fungus pulverulentus, dictus crepitus Lupi I B. 3. 848. In pascuis, & ericetis, nec non in sylvis occurrit æstate. Germ. Bovist. Hujus fungosa & spongiosa substantia crebro utuntur Chirurgi ad sistendum sanguinem ex vulneribus recentibus manantem.

LYCOPERDON pyriforme, gregatim nascens, verrucosum, & asperum, subfuscum: In sylvis, præcipue pinetis unter Schiblau.

LYCOPERDON verrucosum, ventricosum, & subfuscum, veluti echinatum; In sylvis bey Dörffgen Rethe unter Schiblau reperitur æstate. Cum præcedente.

TVBERA

TVBERA Matthioli. Tubera terræ vulgo. Græcis ὐδνα. Germ. in Pannonia (ubi frequens eſt) dicitur Hirſen Schwämme, Hirtzbrunſt, Erd-Schwämme, Ital. Tartuffi & Tartufole, Gall. Truffles, & odore ſuo, præſertim tempore pluviali ſe ſatis produnt, raro in Germania occurrunt; vid. tamen Menzelii indicem plantarum polyplottum, & pugillum nec non modus ridiculus venandi hæc tubera apud Matthiol.

TVBERA cervina. Germ. Hirſch-Brunſt. In ſylvis ſed rarius; v. gr. im Rauhenthal, aliquando occurrit, dum radices tempore verno eruuntur, interius pulvere nigro ſunt referta, de hujus virtute aphrodiſiaca vid. Clavis Schrœderiana Hoffmanni. Odorem viroſum, vehementem & hæc ſpecies habet, unde cervi eorum odore allecti, ea effodiunt, non ſecus ac apri.

AGARICVS pedis equini facie Tournefortii. Fungus in caudicibus naſcens, unguis equini figura C. B. Pin. 372. Fungi igniarii Trag. 943. In ſylvarum caudicibus frequens variis in locis occurrit toto anno. Ex hoc præparatur fomes, qui germanis Zunder oder Schwamm dicitur.

AGARICVS auriculæ forma Tournefort. Inſtitut. 562. Fungus membranaceus, auriculam referens, ſive ſambucinus C. B. Pin. 372. Primum genus pernicioſorum Fungorum Cluſ. Hiſtor. CCLXXVI. In ſambucorum caudicibus hinc inde frequens occurrit toto anno.

AGARICVS varii coloris, ſquamoſus Tournefortii. Fungus ceraſorum imbricatim alter alteri innatus, variegatus C. B. Pin. 372. V. genus pernicioſorum fungorum Cluſ. Hiſt. CCLXXVII. In arborum dejectorum caudicibus frequens occurrit toto anno: a quo vix differt.

AGARICVS lichenis facie, variegatus Tournefort. Fungus ſalignus, lichenis forma, variegatus C. B. Pin. 372. III. genus pernicioſorum fungorum Cluſ. Hiſt. CCLXXVII. Cum præcedente: a quo parum admodum differt.

AGARICVS fraxineus, niger, durus, orbiculatus Tournefortii. Fungus fraxineus, niger, durus, orbiculatus Raj. Hiſt. 109. Synopſ. 18. Hujus & Joh. Bauhinus jam olim meminit, & pueros hac loco pilæ luſoriæ uti, indicavit:

cavit: Naſcitur non ſolum in fraxinis, ſed & aliis arboribus paſſim.

AGARICVS eſculentus Tournefort. Fungus maximus, ungaricus, multis laciniis ſquamatim incumbentibus C. B. Pin. 372. XXI. genus fungorum eſculentorum Cluſ. Hiſt. CCLXXV. In ſylvis denſiſſimis, ſed rarius; hic facile omnium eſculentorum fungorum princeps eſt.

AGARICVS tubæ Fallopianæ inſtar laciniatus Tournefort. Fungus tubæ fallopianæ æmulus Raj. ſynopſ. 20. ſub abietibus v. g. bey Jena/Prieſenitz.

AGARICVS foliatus, cornua damæ referens Tournefort. & Academ. Reg. Scient. 89. In quercetorum putridis truncis occurrit toto anno.

AGARICVS digitatus, major.

AGARICVS digitatus, minor. Fungus digitelli Ruellii. In ſylvarum dejectis, putridisque foliis occurrit toto anno. Plures dantur harum plantarum varietates, quæ vid. apud Tournef. & Joh. Raj.

AGARICVS digitatus flaveſcens, & veluti clavatus. In pinetorum deciduis, putridisque foliis occurrit toto anno; Tournefortius has duas ſpecies ad coralloides, quod vocat, retulit, ſub titulo coralloides, ramoſæ, candidiſſimæ, digitatæ. Ejus ſynonimum eſto fungus ramoſus, candidiſſimus, ceranoides, ſeu digitatus, minimus Raj. Synopſ. 15. Iſt ſehr häuffig bey Halle in der Heyde.

AGARICVS ramoſus, cornua damæ referens, aurantii coloris. Coralloides ramoſa, minima, aurantii coloris Tournefort. Inſtit. p. 568. Fungus ramoſus, minimus, coloris aurantii Raj. ſynopſ. 15. In ſylvis bey Rutterßdorff.

AGARICVS clavatus nigerrimus, fiſſuris dehiſcens. In pinetis, & ericetis.

AGARICVS clavatus flaveſcens, & coriaceæ ſubſtantiæ. Foliis pini putridis adnaſcitur bey Halle in der Heyde frequens.

AGARICVS digitatus niger Tournef.

AGARICVS digitatus niger humilior & inſtar corii canis Carchariæ tuberculis exaſperatus, quæ ſingula, totidem

ovata

ovata indicant, nigerrimi pulveris receptacula, ſubſtantia vero interior eſt albiſſima im Rauhenthale ad arborum putridos truncos.

AGARICVS fuliginis & aterrimus vaſtum cavernulatum quendam inſecti nidum mentiens. Labyrinthibus meatibus ex cavata eſt hæc agarici ſpecies, a nemine hactenus deſcripta, quæ omnino notatu digna eſt. Provenit im Rauhenthale. Subſtantia, eſt per maturitatem rigida & exucca.

AGARICVS lignoſus, niger, hypoxylon Menzelio dictus; Ad lignorum putridorum baſes; v. g. im Rauhenthale ad truncos putridos, & dejectos.

HIPPVRIS craſſior. Equiſetum fœtidum, ſub aquis repens Bauhinorum. Hippuris coralloides Gerhardi, vel foliis manſu arenoſis Geſneri; In dem Bächlein des Rauhenthals; auch anderswo. Semina habet copioſa, rubicunda, uti recte obſervavit Flora quaſimodogenita Breynio juniore curante edita.

HIPPVRIS foliis ad inſtar cornu cervi diviſis, ſemine majore, viridi, tribus apicibus inſtructo, duobus ad baſin tanquam hamis, & uno longiori in apice, ſub viridi cortice durum, alterum & flavicantem condens, in quo ſemen medullâ albâ.

HIPPVRIS longioribus, rarioribus & tenuioribus ſetis; cum præcedente.

HIPPVRIS tenuioribus & bifureis ſetis. Hujus meminit Lœſelius in ſua flora Boruſſica. In ſtagnis & piſcinis nach Ruttersdorff, Gera und Schlaitz hin occurrit tota, æſtate unde ſagena ſæpius evellitur.

ALGA rivulorum lapidibus adnaſcens, brevioribus filamentis. In dem Bächlein, ſo von Prießnitz und Wage herkömmt.

ALGA longioribus & craſſioribus ſetis, veluti reticulatim diſpoſitis nondum deſcripta. In ſcrobibus bey Wormsdorff, occurrit tota æſtate.

ALGA marina, craſſioribus, brevioribus & concavis ſetis ſive filamentis flavo-viridibus, nondum deſcripta. Ad

lapillos, in der ſaltzigten See bey Eißleben, occurrit æſtate.

ALGA marina, trichodes, brevioribus & tenerioribus ſetis, cum præcedente.

ALGA fontalis foliis geniculatis, craſſioribus, tenerioribusve, ſive Alga geniculata major & minor. Conferva geniculata Plukenet. & Joh. Raji. An denen Steinen im Feld-Brunnen v. g. im Bußecker-Thal, auch bey Gießen in fontibus variis campeſtribus. Major vero occurrit mihi in quodam Germaniæ inferioris rivulo, in Ducatu Juliacenſi ſaxis rivuli adnata Menſe Mart.

ALGA fontalis Trichodes C. B. Pin. pag. 364. nec non Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus ejusdem, ibidem.

ALGA vulgatiſſima & longiſſima. Alga viridis, capillaceo folio. C.B. Pin. pag. 364. Conferva vulgi. In rivulis paſſim occurrit æſtate. Quo jure Tournefortius hanc plantam muſcis admiſcuerit, non capio.

ALGA brevioribus & craſſioribus ſetis. In dem Bächlein des Rauhenthals, und bey Braunsdorff in ſcrobibus occurrit toto anno.

ALGA tenuioribus, filamentoſis, & inſtar capillarium vaſorum diviſis ſegmentis; an Trichomanes aquaticum Dalechampii? In aquæ ductibus, & rivulis paſſim, v. g. in dem Mühl-Graben vor dem Johannis-Thore; auch wo man nach Jena-Prießenitz gehet, occurrit toto anno.

SPONGIA ramoſa, fluviatilis, ad confervam accedens, In dem ſo genannten Erd-Fall, ſo auf denen Wieſen unter dem Geraiſchen Schloße befindlich, welches ein ſtillſtehendes faules Waſſer iſt. Occurrit æſtate & autumno, vid. Plukenet, qui quandam exhibet figuram huic plantæ fere ſimilem, ſed ſeminum copioſorum (quæ oculos cancri microſcopio inſpecta ferme referunt) plane non meminit; quæ tamen nota adeo evidens eſt, ut ferme quis ſuſpicari poſſit, eſſe plantas diverſas; ſed nec C. B. in hippuride æque evidentia & copioſa obſervavit ſemina, nec tamen dubitare licet, hanc plantam eſſe equiſetum fœtidum, ſub aquis repens C. B. Sit itaque, ſi placet, noſtra & Plukenetiana planta una eademque, Fig. vid. in Tab. affectaNum. 1.

Coro-

III.



1

2



Coronidis loco monendum duxi, in variis locis circa Jenam decurſu aquarum fontanarum in campeſtribus lignis, foliis arborum, lapidibus, muſcis &c. apponi tartaream quandam materiam, ſub varia figura, ex eo genere, quæ conſtituit alias lapidem illum glaciei Mariæ ſimilem, cujus uſus eſt apud multos in pulverem contriti loco arenæ ſcriptoriæ; ſic in rivulo ex fonte illo Fürſten-Brunnen dicto decurrente verſus pagum Wöllnitz varia corpora, hac materia incruſtantur & veluti lapideſcunt, cujus originis pariter eſſe videntur illæ figuræ calcario lapidi impreſſæ, medio fere itinere inter fontem laudatum & pagum Wöllnitz; nec non lapis ille Num. 2. figura expreſſus, cui D. D. Schutteus nomen Lithophyton caryophylloides impoſuit, illumque invenit im Rauhenthale, in der Gluntz, ohnweit dem Waſſer-Falle. Hic etiam notandus eſt Rajus, qui in methodo plantarum & aucta exiſtimat omnes corallinæ ſpecies pariter nihil aliud eſſe quam accreſcentias tartareas ſalis marini ad varias plantas ſubmarinas: Eodem itaque jure & hoc lapidum genus ad regnum vegetabile referri poteſt, quo ſub marina illa; ſi vero quis tales ex plantarum numero excludere voluerit, cum eo tantopere non repugnabo.

Præterea & alia hujus farinæ & materiæ figurata corpora (ut & hæc indicare hic non omiſerim, me movit præcipue D. D. Mauritius Hoffmannus, qui in ſua floræ Altorfinæ deliciis ſylveſtribus eadem non neglexit) variis in locis reperiuntur, v.g. cornua ſic dicta Ammonis um das Pfarr-Hölzgen, ſo nach der Ginne gehöret, una cum matricibus ſuis, conchites variorum generum ibidem und beym Jäger-Hauſe, auch anderswo, cylindrites &c. Præterea Jaſpidem Jenenſem, & lapidem ſpecularem variorum colorum, aliaque regni mineralis potius ſimplicia hinc inde obvia, & in excurſionibus Botanicis non negligenda, aliis indaganda ulterius commendamus. vid. D.D. Teichmeyeri Phyſica.

Sequentes plantæ in ſuo ordine omiſſæ, ad ſequentia loca referendæ ſunt.

ad pag. 70.

PLANTAGO anguſtifolia major C. B. Pin. 189. Plantago lanceolata J. B. 3. 505. Plantago minor Dodon. Pempt. 107. In pratis, paſcuis & ſylvis paſſim floret Junio.

ad pag. 157.

TANACETVM foliis criſpis C. B. Pin. 132. Tanacetum criſpum, flore luteo J. B. 3. pag. 132. ſpecioſum tanacetum criſtatum Anglicum Lobel. icon. 749. In hortis floret Aug. & Septembri.

ad pag. 177.

IVA moſchata, folio multifido, Rivin. Chamædris laciniatis foliis Lobel. icon. 385. Botrys chamædrioides C. B. P. 138. Botrys verticillata J. B. 3. 298. In vineis & agris montoſis, ſterilibus frequens, floret Junio & Julio. Flore albo variat, ſed rariſſime.

ad pag. 215.

COLVTEA æthiopica, flore ſanguineo, barbæ Jovis facie Jac. Breynii. In hortis curioſorum frequens, floret æſtate. Ad hanc plantam C. B. non ſecus ac Breynius ipſe quandam ſpeciem Aſtragali vel potius Glaucis minus recte retulerunt, vid. Paurolff. Itinerar. & Tournef. Corollar.

ad Claſſem XVI.

KALI geniculatum majus C. B. Kali Matthioli. Salicornia Dodon. Germ. Saltz-Kraut, Glaſen-Schmaltz. Provenit in locis ſalſis, maritimis v. gr. bey der ſaltzigen See.

ad Claſſ.

ad Claſſ. XVI.

SABINA vulgaris Park. Sabina folio Tamariſci Dioſcorid. C. B. Sabina ſterilis J. B. Sabina mas Tabernæm. In hortis omni tempore virens deprehenditur. German. Sade-Baum, Sage-Baum, Seven-Baum, Sieben-Baum, Mägde-Baum, Kinder-Mord.

SABINA baccifera J. B. Sabina baccifera officinar. Gerh. Park. Sabina foliis Cupreſi C. B. baccata altera Lobel. Lugd. III. Fructifera Caſt. Cedrus baccifera, fructu minore cæruleo R. H. Hance plantam admodum vulgarem, & fere omnibus cognitam D. Tournefortius plane omiſit. Huc autem non ſpectat Sabina ſylveſtris Tragi & Matthioli, ſed ad Lycopodium, quod pag. 281. poſitum.

FINIS.

NOMINVM BOTANICORVM ABBREVIATORVM BREVIS EXPLICATIO.

Amm. char. plant. Pauli Ammanni character plantar. natural. Lipſ. 1676. 12.

Proſp. Alpin. Exot. De Plantis exoticis Lib. II. Proſp. Alpini. Venet. 1656. in 4t.

Ald. H. Farneſ. Exactiſſima deſcript. rarior. plantar. quæ continentur Romæ in Hort. Farneſiano. Tob. Aldino ſ. potius Petro Caſtello auctore. Romæ 1625. fol.

C. B. P. Caſpari Bauhini πίναξ Theatri Botanici. Baſileæ 1623. & 1671. in 4t.

C. B. Prod. Caſp. Bauhin. πρόδρομος Theatri Botanici Francof. 1620. Baſil. 1671. in 4.

J. B. 1. 249. I. Bauhin. tom. 1. pag. 249.

J. B. 2. 215. I. Bauh. tom. 2. pag. 215.

J. B. 3. 538. I Bauhin. tom. 3. pag. 538.

J. B. 3. *part.* 2. 14. I. Bauhin. tom. 3. part. 2. pag. 14.

J. B. Plant. a Div. Jo. Bauhinus de Plantis a Divis Sanctisque nomen habentibus Baſil. 1591. 8t.

J. B. Font. Bollenſ. Jo. Bauhini hiſtoria fontis & Balnei admirabilis Bollenſis Lib. IV. Montisbel. 1598. 4t.

Bocc. rar. plant. Icones & deſcriptiones rariorum Plantar. auctore Paulo Boccone. Oxon. 1674. 4t.

Breyn. Prodr. I. Jacobi Breynii Prodromus I. faſciculi rarior. plantarum. Gedani 1680. 4t.

Breyn. Prodr. II. Ejusdem Prodromus II. faſciculi rarior. plant. Gedani 1689. 4t.

Breyn. Cent. Jacobi Breynii Exoticarum, aliarumque minus cognitar. Centuria Gedani 1678. fol.

Cam. Epit. De Plantis Epitom utiliſima Petr. Andreæ Matthioli, a Joach. Camerario Francof. ad Mœn. 1688. 4.

Cam.

Cam. Hort. Med. Ejusdem Hortus Medicus Francof. 1588. 4t. ib. 1654. in 4t.

Cæſalp. Andreæ Cæſalpini de Plantis. Libr. XVI. Florentiæ 1583. 4t.

Chabr. Dominici Chabræi ſtirpium icones & Sciagraphia. Genevæ 1666. ib. 1677. fol.

Cluſ. Hiſt. Caroli Cluſii Rarior. Plant. Hiſtoria. Antwerp. ex officina Plantin. 1601. fol.

Cluſ. Pan. Caroli Cluſii rariorum aliquot ſtirpium per Pannoniam, Auſtriam &c. obſervatarum hiſtoria. Antwerp. 1583. 8tav.

Cluſ. Hiſpan. Ejusdem Cluſii rarior. aliquot Plant. per Hiſpanias obſervatar. Hiſtor. Antwerp. 1576. 8tav.

Car. Steph. Præd. Ruſt. Caroli Stephani Prædium ruſticum. Paris 1629. 8tav.

Col. Phytob. Fabii Columnæ φυτοβάσανος ſive Plantar. aliquot. Hiſtor. Neapoli 1592. 4t.

Col. Part. I. Ejusdem Columnæ minus cognitar. ſtirpium Ἐκφρασις. 1606. ibid. 1616. 4t.

Col. Part. alt. Ejusdem minus cognitarum ſtripium Pars altera. Rom. 1616. 4t.

Dod. Pempt. Remberti Dodonæi ſtirpium hiſtoriæ Pemptades ſex. Antwerp. 1616. fol.

Elem. Bot. Elemens de Botanique. A Paris 1694. 8tav.

Dalechamp. Jacobi Dalechampii Hiſtoria Generalis Plantar. in Lib. XVIII. Lugduni 1585. fol.

Ferr. Heſp. De Malorum Aureorum cultura & uſu Libri IV. Jo. Baptiſtæ Ferrarii Romæ 1646. fol.

Gerar. Emac. Joan. Gerar. Hiſtoria Plantar. emaculata Londini 1597. fol.

Hoff. Flor. Alt. Hort. Mauritii Hoffmanni Flore Altdorfinæ deliciæ Hortenſes Altdorf. 1660. 4t.

Hoff. Flor. Altd. Del. Ejusdem Hoffmanni Floræ Altdorfinæ Deliciæ ſylveſtres ibid. 1662. 4t.

H. Amſt. Hortus Amſtelodamenſis Joan. Commelini. Amſtel. 1689. 12.

H. Edinb. Hortus Medicus Edinburgenſis Jacobi a Sutherland. Edinburgi 1683. 8tav.

H. L. Batav. Horti Academici Lugduno-Batavi Catalogus Pauli Hermanni. Lugd. Bat. 1687.

H. Cathol. Hortus catholicus, Auctore Franciſc. Cupani. Neapoli 1696. 4t. cum ſupplemento.

H. R. Bleſ. Hortus Regius Bleſſenſis. Paris 1655. fol.

H. Mal. Hort. Malabaricus. Amſt. 1693. fol.

H. R. Pariſ. Hortus Regius Pariſienſis. Paris 1665. fol.

H. R. Monſp. Hortus Regius Monſpelienſis Petri Magnol. Monſpelii 1697. 8tav.

Jonq. Hort. Dionyſii Jonquet Hortus. Paris 1659. 4t.

Knauth. Chriſt. Knauthii Enumeratio Plantarum circa Halam naſcentium. Lipſ. 1687. 8tav.

Lobel. icon. Matthiæ Lobelii Plantarum ſ. ſtirpium icones Antw. 1581.

Lob. adverſ. Adverſaria nova ſtirpium, auctoribus Petro Penna & Matthia de Lobel Medicis. Londini 1570. & 1606. Antwerp. 1575. fol.

Matthiol. Petr. Andr. Matthioli Commentarii in ſex Libr. Pedacii Dioſcorid. Venet. 1565. fol. & Ejus opera omnia. Francof. 1598. Baſil. 1674. fol.

Merret. Chriſtoph. Merretti Pinax rerum Naturalium Britannicarum. Londini 1667. 8tav.

Menzel. Pugill. Chriſtiani Menzelii Pugillus Plantar. rarior. Berolini 1682 fol.

Moriſ. Hiſt. Oxon. Part. 2. Plantarum Hiſtoriæ univerſalis Oxonienſis Pars 2. auctore Roberto Moriſon. Oxonii 1680. fol.

Moriſ. Hiſt. Oxon. Part. 3. Ejusdem Moriſoni Pars III. Oxoni 1699. in fol.

Moriſ. Plant. umbelliſ. Plant. umbelliferarum Diſtributio nova, auctore Roberto Moriſon. Oxon. 1672. fol.

Muſ. Petiv. Muſæi Petiveriani Cent. I. Lond. 1695. Cent. II. & III. ibidem 1698. Cent. IV. V. ibidem 1699. in 8tav.

Parad. Batav. Pauli Hermanni Paradiſus Batavus Lugduni Batavor. 1608. 4t.

Park. Parad. Joannis Parkinſonii Paradiſus terreſtris. Londini 1629. fol.

Park.

Park. Theat. Ejusdem Theatrum Botanicum. Londini 1640.

Plin. C. Plinii Secundi Historiæ Mundi Lib. XXXVII. Francof. 1607. 4t.

Plumer. Description des Plantes de l'Amerique, par le Pere Plumier. A Paris 1693.

Pluk. Phytogr. Leonardi Plukenetii Phythographiæ Pars I. & II. Lond. 1661. III. 1692. IV. 1696. fol.

Pluk. Almag. Botanic. Ejusdem Almagestum Botanicum. Londini 1696. fol.

Prodr. Parad. Batav. Prodromus Paradisi Batavi Amstelod. cum Schola Botanica editus 1689. 12.

Raj. Hist. Historia Plantarum Auctore Jo. Rajo Londin. 1664. fol.

Raj. meth. Ejusd. methodus Plantar. emendata & aucta Amstel. 1710. 8tav.

Raj. Cat. Angl. Ejusd. Catalogus Plantar. Angliæ & insularum adjacentium. Londin. 1677. 8tav.

De Regio capsic. Gregorius de Regio de capsicorum Indicorum varietate. Extat cum curis posterioribus C. Clusii.

Riv. Ord. Aug. Quirini Rivini introductio Generalis in rem herbariam, cum ordine Plantar. quæ sunt flore regulari monopetalo. Lipsi. 1690. fol.

Ej. Ordo Plantar. quæ sunt flore irregulari tetrapetalo. Lipsi. 1691. fol.

Ej. Ordo Plantar. quæ sunt flore irregulari pentapetalo. Lipsi. 1699. fol.

Slo. Plant. jam. Hans Sloane Catalogus Plantarum Insulæ Jamaicæ. Londin. 1696. 8tav.

Scot. ill. Roberti Sibaldi Scotia illustrata. Edinburgi 1654. fol.

Stap. in Theoph. Theophrasti Eresii de Historia Plantarum Lib. X. quos illustravit Jo. Bodæus à Stapel. Amstelod. 1644. fol.

Schwenckf. Stirpium & fossilium Silesiæ Catalogus, à Caspar Schwenckfeld. Lipsi. 1600. 4to.

Tab.

Tab. icon. Jacobi Theodori Tabernæmontani icones Plantarum. Francof. 1590. 4t.

Trag. Hieronymi Tragi de Stirpibus Libri tres. Argentorat. 1552. 4t.

Tournef. inſtit. Joſephi Pitton Tournefortii inſtitutiones Rei Herbariæ. Paris 1700. 4t.

Tournef. Coroll. Corollarium inſtit. rei herbariæ, quod inſtitutionibus adnexum eſt.

Turre Georgii à Turre Catalogus Plantar. Horti Patavini. Patavii 1662. 12.

Veſl. in Proſp. Alp. Veslingius in Proſperum Alpinum. Patav. 1638. 4t.

Volckam. Flor. Norib. Jo. Georgii Volckameri Flora Noribergenſis. Norib. 1700. 4to.

INDEX

INDEX ALPHABETICVS LATINVS.

A Belmoſch, v. ſub Ketmiæ ſpeciebns pag. 31.
Abies fœmina ſ. ἐλάτη πτελέα 270
taxi folio fr. ſurſum ſpectante 270
tenuiore fol. fr. deorſum inflexo 270
Abrotanum campeſtre, caul. alb. 158
lini folio acriore 158
mas auguſtifol. maj. 158
minus 158
Abrotanum fœmina VI. Cluſ. v. ſub Santolinæ tit. 158
latifol. arboreſc. v. abſinth. tale 159
Abſinthium arboreſcens Lobelii 159
Ponticum, ſ. officinarum 159
tenuifolium 159
Abutilon Dodon. 31. ſeq.
Acacia Indica Farneſiana Ald. 18
Accipitrina Riv. & Loniceri 64
Acer campeſtre & minus 129
montanum, candidum 129
platanoides Munting. 129
Acetabulum petræum, majus 299
Acetoſa americana, fol. longiſſ. 46
arboreſcens, ſubrot. folio 47
Arvenſis, lanceolata 46
foliis criſpis 46
hiſpanica maxima Camer. 46
pratenſis C. B. 46
rotundifolia, hortenſis 47
Acetoſella flore luteo 102
vulgaris & officinarum 101
Achillæa Dod. v. Milleſol. vulg. alb. 140

Acinos Rivini 188
Aconitum. Hellebor.niger,tuberoſus 130
Aconitum helianth. canad. Corn. v. Sol fol.hydroph. 135
hyemale vulgo,v. Acon. Hel.niger,tuber. 130
pardalianches Plinii, v. Doronicum offic. 141
pardalianches I. C. B. v. Thora maj. Camer. 53
racemoſum,baccifer.v. Chriſtophoriana 74
Acopa Tabern. v. Menyanthes Tourn. 17
Acorum legitimum 261
Adianthum aureum Tabern. v. Muſcus capillaceus, maj. pedic. & capit. craſſioribus 285
Adianthi alias ſpecies, v. ſub tit. Muſci capillaris 285.286. & filiculæ 278
Adonis arvenſis flore ochroleuco 127
phœniceo. 127
montanus, perennis 126
Ægopodium, v. Podagraria Riv. & Lobel. 225
Ægylops Matth.v.Gram.aven.pan.ſparſa,locuſt.major. 254
Æthiops, v. Sclarea vulgaris 179
Agaricus auriculæ forma Tournef. 305
clavatus flaveſcens 306
nigerrimus 306
digitatus flaveſcens 306
major & min. 306
niger humilior 306
Tournef. 306
eſculentus Tournef. 306
foliatus corn. dam. refer. 306
fraxineus, niger, durus 305
fuliginis & aterrim. 307
lichenis facie, variegat 305
lignoſus, niger hypoxylon 307
pedis equini facie 305
ramoſus, corn. dam. ref. 306
tubæ Fallopianæ inſtar 306
varii coloris, ſquamoſ. 305
Ageratum fol. ſerrato. v. Ptarmica lut. 140
Agnus caſtus off. vid. Vitex Rivini 201

Agri-

Agrimonia officinarum 79
orientalis major 80
Ajuga folio integro Rivini 178
Ajuga ſ. Chamæpytis mas Dioſc. v. Chamæpytis off. 178
Alaternus I. Cluſ. 35
Alcea folio rotundo, laciniato 12
Alcea veſicaria, v. Bammia Rivini 31
vulgaris maj. ſ. off. v. Malva ſylv. altiſſ. 12
vid. ſub Ketmiæ titulo 31
Alchymilla alpina, fol. ſericeo 51
montana, minima 51
vulgaris 50
Alchymilla linariæ folio, cal. fl. alb. v. Lynoſyris Riv. 76
v. ſub titulo Knawel 76
Alga brevioribus & craſſioribus ſetis 308
fontalis, foliis geniculatis craſſior. C. B. 308
trichoides C. B. 308
longioribus & craſſioribus ſetis 307
marina craſſioribus, long. & concav. ſetis. 308
trichodes 308
rivulorum lapidibus adnaſcens 307
tenuioribus, filamentoſ. 308
vulgatiſſima & longiſſima 308
Aliſma anguſtifolium 47
Rivini & Cordi 48
Alkekengi, folio chenopodii 38
folio ſtramonei 38
Indicum, majus 38
majus, fl. & fr. verticillatis 38
Tournefortii 38
Alliaria Matthioli 61
Allium ſativum alterum 122
C. Bauh. 122
ſylveſtre, bulbiferum 122
campeſtre 122
capitatium 123
Allii reliqv. ſpecies v. ſub tit. Moly 122
Alnus alpina minor C. B. 265
rotundifolia, glutinoſa, viridis 26

Alni alias ſpec. v. ſub tit. Frangulæ 34. 35
Aloë africana, breviſſimo, craſſioque folio 201
margaritifera, minor 201
officinarum ſ. vulgaris 200
zeilanica pumila, fol. vario 201
Aloë aquatica C. B. 49
ſpuria ſ. Metl. American. 27
Alpinum montanum, fol. ampliore, v. Angelicá ad alas florens 223
Alſine altiſſima nemorum 86
hirſuta, magno fl. vaſculo cornic. 88
vaſc. corniculato 88
longiori, minima 88
incana, vaſc. longiori 88
longifol. uliginoſ. proveniens locis 88
media C. B. 87
montana latifolia 87
nemorenſis, fol. ſtrictiſſimo 87
paluſtris gram. fol. longiore 88
linifolia, magno flore 87
pratenſis, gramineo folio ampliore 87
Althæa Theophraſti, fl. luteo, v. Abutilon 31
Althæas reliqv. v. ſub Malvæ ſpeciebus 10. 11. 12
Alypum Matthioli, v. Eſula fol. amygdal. 220
Alyſſum foliis veronicæ 68
fruticoſum, incanum 68
incanum, lut. ſerpill. fol. majus 68
luteum ſerpilli fol. minus 68
elatius, fol. auriculatis 69
ſegetum folio auriculato 69
Amaranthoides Indicum 18
Amaranthus major panicul. virid. erectis 97
maximus Bauh. 96
ſem. rubello 96
panicula incurva 97
ſimplici panicula 97
ſpicatus, ſericeus, fl. luteo 97
ſylveſtris maximus 97

Ambroſia campeſtr. v. Coronopus Ruell. 67
Ammi perenne, v. Falcaria Riv. 225
Amomum Plin. v. Solanum fruticoſ. baccif. 37
Amygdalus ſativa, fr. majore 107
Anacampſeros, v. Fabaria 103
Anagallis fl. cœruleo 15
phœniceo 14
lutea nemorum 15
ſpuria, ſ. minima arvenſ. 15
Anagallis aquat. v. Beccabunga 199
Anagyris altera Matth. v. Laburnum Riv. 208
Anblatum Tourn. v. Squamaria 193
Androſace 13
Androſæmum, v. Hypericum 99
Anemone ſylvatica, alba 128
tenuifolia multiplex rubra 128
Anethum hortenſe C. B. 222
Angelica ad alas florens 223
lucida Canadenſis 223
ſativa C. B. 222
ſylveſtris major 222
tenuifolia Rivini 222
Angelica mont. perenn. v. Leviſtic. off. 225
prat. apii fol. v. Seſeli prat. 226
repens, v. Podagraria 225
Anguria citrullus dicta 43
Aniſum officinarum 229
Anonis ſpinis carens, purpurea 214
ſpinoſa, fl. purpureo 214
Anſerina offic. v. Pentaphylloid. arg. alatum 85
Anthriſcus v. Caucalis vulgaris 224
Anthyllis Rivini 208
Anthyllis altera Italorum Lob. v. Chenopodium ann. humifuſ. 273
Antirrhinum arvenſe, majus C. B. 196
fl. albo 196
vulgare J. Bauh. 196

Aparine ſem. coriandri ſaccharat. 4
vulgaris 4
Aphaca Lobelii 211
Aphaca anguſtior. folio, v. Dens leonis tal. 159
Aphyllanthes Anguillare, v. Globularia 176
Apios americana Cornuti & Riv. 218
Apium criſpum 229
hortenſe ſ petroſelinum 229
paluſtre & officinar. 229
Apium ſylv. lacteo ſucco turg. v. Thyſſelium 222
Apocynum æthiopicum fruteſc. 19
erectum, incanum 19
latifolium 19
Apocyni alias ſpec. v. ſub tit. Vincetoxic. 20. & Craſſæ Riv. 20. 21
Aquifolium Tournefortii 35
Aquilegia hortenſis var. colorum 131
ſylveſtris 131
Aracus Tabern. v. Cracca Riv. 212
Arbor ſiliquoſa Virgin. v. Pſeudo acacia 208
vitæ, ſ. paradiſiaca vulgo. v. Thya Theophraſti 271
Arenaria arvenſis vulgatior 89
campeſtr. fl. purp. 90
maritima 89
multicaulis, ſerpilli fol. 90
paluſtris 89
plantaginis folio 90
teretifolia vern. fl. albo 90
vernæ, fugax glabra 89
ſtrictiſsimo folio 89
Argentina Dod. v. Pentaphylloides arg. alatum 85
Aria Theophraſti vulgo, v. Meſpilus alpinus, fol. alni lanato maj. 100
Ariſarum Rivini 203
Ariſtolochia cretica Rivini 202
multiflora Riv. 202
rotunda, fl. ex purp. nigr. 202

Ariſto-

Ariſtolochia rot. fabaceâ off. v. Split rad. rot. non cava 217
Armeniaca fr. majore, nucleo amaro 107
Armeria prolifera Lobel. v. tunica ſylv. faſciculat. fl. 94
Armoracia Rivini 67
Arnica Schrœderi 141
Artemiſia vulgaris maj. 158
marina Neotericorum. v. Jacobæa marit. 143
tenuifol. III. Cluſ. v. Abrotanum camp. 158
fl. ſimpl. & pl. v. Matricaria vulg. & pl. fl. 139
Arum maculatum, macul. nigr. 203
max. non maculatum 203
polyphyllum Riv. 203
vulgare, non macul. 203
Arundo Indica variegata ſ. Laconica Theophr. 255
vulgaris ſ. Phragmites Dioſc. 255
Aſarum Dioſc. & officin. 49
Aſclepias africana aizoides, v. Craſſa minor 21
albo fl. v. Vincetoxicum Dod. 20
Aſcyron Dodonæi v. Hypericum aſcyron 99
exiguo fol. fl. magno 103
Aſparagus ſativus 126
ſpinoſus, corruda dictus 126
Aſperugo Tournefortii 8
Aſperula alpina, quadrifolia 4
cœrulea arvenſis 5
hexaphyll. purpurea 5
lævior acut. quatern. fol. 4
quadrifolia paluſtr. 4
ſylvatica 4
Aſphodelus luteus, fl. & rad. 124
Aſphodelus bulboſ. Dod. v. Ornith. anguſtif. majus 120
minor, fl. fiſtuloſo, v. Phalang. narb. 124
Aſplenium ſ. Ceterach. officin. 279
Aſter anguſtifol. ſerotinus 144
arvenſis, cœruleus, ſacris 144

Aſter atticus cœrul. vulgaris 144
autumnalis, elatior fl. cœrul. 144
canadenſis ſubhirſutus, ſalic. fol. 144
luteus, hirſuto ſalic. fol. 145
major, fol. ſucciſæ 145
maritimus, paluſtris cœrul. 144
montanus lut. ſal. glabro fol. 145
novæ Angliæ, altiſſ. hirſ. 144
paluſtr. parv. flore globoſo 143
pratenſis, autumnal. conyzæ fol. 143
ramoſus annuus, canadenſis 144
virginianus, anguſtifol. ſerot. 145
Aſter canadenſis ann. v. Virga aurea Virginiana 146
omnium max. v. Helenium officinar. 141
peruanus tuberoſus, v. Sol altiſſ. rad. tuberoſa eſculi. 135
Aſteriſcus ann. fol. ad flor. rig. 139
flore nutante 139
Aſtragaloides, v. Orobus ſylv. fl. obl. 209
Aſtragalus lut. perenn. procumbens 217
major Fuchſ. v. Orobus ſylv. viciæ fol. 209
ſylvat. Chabr. v. Orobus fol. obl. 209
Aſtrantia major Moriſ. 226
Atractylis lutea, v. Cnicus atractylis 153
Atriplex anguſto obl. folio 274
fol. haſtato, ſeu deltoide 275
hortenſis, alba 274
rubra 274
latifolia 274
maritima, anguſtiſſ. fol. 274
ſylv. fr. roſeo, compreſſo 275
Atriplicis ſpecies alias, v. ſub tit. Chenopodii 271. ſeq.
Aucuparia Rivini 112
Avellana Lugdunenſis major, Camer. v. Corylus ſativa, fr. rot. maximo 265
Avena elatior, panicula propendente 244
ſemine nigro 244
vulgaris ſeu alba 244

Auran-

Aurantium acri medullæ, vulgare 113
Auricula leporis, v. ſub Bupleuri ſpec. 226. 227
muris, fl. parv. v. Alſine hirſ. vaſc. corn. fl. min. 88
hiſpânica, v. Piloſella peregrina 163
urſi, fl. luteo 14
purpureo 14

B.

Baccharis, v. Conyza maj. vulgaris 154
Balauſtia hiſpanicæ, v. Punica fl. pl. maj. 133
Ballote Matthioli 182
Balſamina Dodonæi 217
Balſamica v. Momordica 41
Balſamina minor Dod. v. Ptarmica lut. ſuavéol. 140
Bammia Rivini 31
Barba capræ, fl. compactis, v. Ulmaria 81
oblongis v. Drymopog. Riv. 99
Barbarea muralis, v. Turritis hirſuta 62
Barbula hirci, v. Tramopogon purpuro-cœrul. 168
Bardana off. v. ſub Lappæ ſpeciebus 152
Baſilicum Indicum, maculatum v. Ocimum latifol. 178
Batrachium ſalutifer. v. Ranunculus prat. erect. dulc. 81
Baucia, v. Paſtinaca ſylv. latifol. 221
Beccabunga fol. obl. major 199
minor 199
minor, fol. ſubrot. 199
officinarum 199
Bechium Dod. v. Tuſſilago 141
Been alb. off. v. Muſcipula prat. 100
Beidelſar, v. Apocynum erect. incan. latif. 19
Belladonna 204
Bellis hortenſis, caule folioſo 138
fl. pleno albo 138
magno 138
parvo 138
rubro 138
ſemifloſcul. 139
prolifera 138

Aſter atticus cœrul. vulgaris 144
autumnalis, elatior fl. cœrul. 144
canadenſis ſubhirſutus, ſalic. fol. 144
luteus, hirſuto ſalic. fol. 145
major, fol. ſuccisæ 145
maritimus, paluſtris cœrul. 144
montanus lut. ſal. glabro fol. 145
novæ Angliæ, altiſſ. hirſ. 144
paluſtr. parv. flore globoſo 143
pratenſis, autumnal. conyzæ fol. 143
ramoſus annuus, canadenſis 144
virginianus, anguſtifol. ſerot. 145
Aſter canadenſis ann. v. Virga aurea Virginiana 146
omnium max. v. Helenium officinar. 141
peruanus tuberoſus, v. Sol altiſſ. rad. tuberoſa eſculenta 135
Aſteriſcus ann. fol. ad flor. rig. 139
flore nutante 139
Aſtragaloides, v. Orobus ſylv. fl. obl. 209
Aſtragalus lut. perenn. procumbens 217
major Fuchſ. v. Orobus ſylv. viciæ fol. 209
ſylvat. Chabr. v. Orobus fol. obl. 209
Aſtrantia major Moriſ. 226
Atractylis lutea, v. Cnicus atractylis 153
Atriplex anguſto obl. folio 274
fol. haſtato, ſeu deltoide 275
hortenſis, alba 274
rubra 274
latifolia 274
maritima, anguſtiſſ. fol. 274
ſylv. fr. roſeo, compreſſo 275
Atriplicis ſpecies alias, v. ſub tit. Chenopodii 271. ſeq.
Aucuparia Rivini 112
Avellana Lugdunenſis major, Camer. v. Corylus ſativa, fr. rot. maximo 265
Avena elatior, panicula propendente 244
ſemine nigro 244
vulgaris ſeu alba 244

Auran-

Aurantium acri medullæ, vulgare 113
Auricula leporis, v. ſub Bupleuri ſpec. 226. 227
muris, fl. parv. v. Alſine hirſ. vaſc. corn. fl. min. 88
hiſpânica, v. Piloſella peregrina 163
urſi, fl. luteo 14
purpureo 14

B.

Baccharis, v. Conyza maj. vulgaris 154
Balauſtia hiſpanicæ, v. Punica fl. pl. maj. 133
Ballote Matthioli 182
Balſamina Dodonæi 217
Balſamica v. Momordica 41
Balſamina minor Dod. v. Ptarmica lut. ſuavéol. 140
Bammia Rivini 31
Barba capræ, fl. compactis, v. Ulmaria 81
oblongis v. Drymopog. Riv. 99
Barbarea muralis, v. Turritis hirſuta 62
Barbula hirci, v. Tramopogon purpuro-cœrul. 168
Bardana off. v. ſub Lappæ ſpeciebus 152
Baſilicum Indicum, maculatum v. Ocimum latifol. 178
Batrachium ſalutifer. v. Ranunculus prat. erect. dulc. 81
Baucia, v. Paſtinaca ſylv. latifol. 221
Beccabunga fol. obl. major 199
minor 199
minor, fol. ſubrot. 199
officinarum 199
Bechium Dod. v. Tuſſilago 141
Been alb. off. v. Muſcipula prat. 100
Beidelſar, v. Apocynum erect. incan. latif. 19
Belladonna 204
Bellis hortenſis, caule folioſo 138
fl. pleno albo 138
magno 138
parvo 138
rubro 138
ſemifloſcul. 139
prolifera 138

Bellis hortenſis rubra, fl. multiplic. 138
ſylveſtris minor 138
fl. albo 138
Bellis cœrul. caule folioſo, v. Globularia 176
lut. fol. profunde inciſ. v. Chryſanthem. arvenſe 136
ſylveſtr. v. Leucanthemum vulgare 137
Belvedere Hortulanor. v. Chenopod. linifol. villoſo 273
Berberis off. 125
Beta alba, vel palleſcens 275
pallide virens maj. 275
rubra, rad. rapæ 275
rubra vulgaris 275
Betonica alba 186
purpurea 186
Betula Dodonæi 265
Bidens, v. ſub Verbeſinæ ſpeciebus 135
Bignonia americana, v. Gelſeminum Riv. 200
Biſtorta 78
Blattaria flore albo 196
purpureo 196
lutea, fol. oblongo lacin. 195
Blitum album maj. & minus 273
Boletus eſculentus, rugoſ. albic. 302
mitram Pontificis ref. 302
pediculo & cap. donatus 302
phalloides Tournef. 302
Bonifacia ſ. bis lingua, v. Ruſcus anguſtifol. 125
Borrago officinarum 10
Borrago ſylv. v. Echioides fl. cœrul. 176
Botrys ambroſioides, Mexicana, v. Chenopod. ſuaveol. 273
chamædrioides C. B. v. Iva moſchata 310
officin. v. Chenopod. ſuaveol. fol. quern. 273
verticillata J. B. v. Iva moſchata 310
Branca urſina Germ. v. Sphondilium vulg. hirſ. 221
Braſſica alba, criſpa 59
vel viridis 58
alpina, perennis 59

Braſſica arvenſis 59
campeſtris, perfoliata 59
capitata alba 58
rubra 59
cauliflora 59
fimbriata 59
gongylodes 59
radice napi, ſ. non cauleſc. 59
ſeleneſiaca, anguſtifolia 59
ſeleniſia, latifolia 59
Bryonia nigra Dodon. 39
Bubonium luteum Tabern. v. After mont. lut. 145
Bugloſſoides cretica Rivini 177
Bugloſſum anguſtifolium majus 9
latifol. ſemper virens 9
Bugloſſum arvenſe ann. v. Echioides fl. albo 176
latifol. C. B. v. Borrago off. 10
Bugula Dodonæ 187
montana Riv. 187
Bulbocodium hiſpanic. v. Narciſſ. maj. tot. lut. 26
Bulbonac ann. ſiliq. rotundiore, fl. purp. 70
ſiliq. rot. fl. albo 70
rad. rediviva fl. cinereo 70
Bulbus ſylv. Fuchſ. v. Ornithogal. lut. 120
leucanthemus min. v. Ornithogal. med. umbella 120
vomitorius v. Muſcari Cluſ. 28
Bunias ſylv. v. Napus ſylv. 65
Bupleurum arboreſc. ſalicis fol. 226
folio rigido 226
ſubrotundo 226
minimum Fab. Col. 227
montan. latifol. 226
Bupleurum perfoliatum rot. ann. vid. perfoliata off. 227
Buphthalmum tanaceti min. fol. 136
fl. alb. 137
ſulph. 137

Burſa paſtoris eleganti folio 68
maj. fol. non ſin. 67
ſinuato 68
media 68
Buxus arboreſc. 264
fol. rotundioribus 264
Byſſus petræa caneſcens 300
crocea 300

C.

CAcubalus Tournefortii 114
Calamintha incana, ocymi fol. 188
puleg. odore 188
vulgar. vel officin. 187
Calamagroſtis alt. Tragi, v. Cyp. min. pan. ſparſ. ſub fluv. 256
Lob. v. Gr. pan. arund. ſpic. multipl. 253
Calamintha humilior, fol. rot. v. Chamæciſſ. Riv. 188
Calaminthæ plur. ſpecies v. ſub tit. Menthæ 185
Calceolus 237
Calcitrapa. Carduus ſtellatus 149
ſ. ſoliſtitialis fl. luteo, caul. alato 148
Calendula africana fl. int. alb. 138
maj. polyanthos 138
minor, arvenſis 138
multiflora, maxima 138
orbiculata 138
prolifera 138
ſativa, polyanthos 138
Caltha flore pleno 106
paluſtr. fl. ſimpl. 105
Caltha arvenſis, v. Calendula min. arv. 138
Camara Riv. 202
Camaratinga Piſon, v. Camara Riv. 102
Cameraria 96

Cam-

Campanula fol. echii 23
hortenſ. fol. & fl. oblongo 23
rapunc. rad. 24
media 23
minor, rotundifolia, alp. 24
nemoroſa anguſtifolia 24
perſicæ folio 24
pratenſ. fl. conglomerato 23
pyramidata, altiſſ. 23
rad. eſcul, fl. cœrul. 24
vulgatior, fol. urticæ 23
Campanula exotica, Aldini v. Convolv. Luſ. 22. 23
Indica, v. Convolvulus purp. 22
Camphorata hirſuta 273
Campoides hiſpida Rivini 215
ſiliq. cochleata & ſtriata 216
Canna Indica, fl. lut. punctato 201
Rivini, v. Cannacorus 201
Cannabina aquatica mas Lob. v. Eupator. cannab. 154
v. ſub Verbeſinæ ſpeciebus 134. 136
Cannabis erratica 263
ſativa 263
Cannabis Veter. ſpec, v. ſub tit. Galeopſidis 182. 183
Cannacorus Tournefort. 20
Capnoides Rivini 215
Capparis, v. Fabago 102
Caprifolium, v. ſub Periclimeni ſpec. 202, 203
Capſicum ſiliq. long. propend. 37
Cardamindum majus 230
min. & vulg. 203
Cardamine annua exiguo fl. 62
fl. maj. elatior 62
pratenſ. magno fl. purp. 62
ſylvatica hirſuta 62
Cardiaca 184
Cardinalis Rivini 201

Carduus acanthoides 149
albis maculis 150
capit. rot. toment. 150
caule criſpo 149
lanceatus latifol. 149
lanc. latif. fl. albo 149
nutans 149
tomentoſus 150

Carduus benedictus, v. Cnicus ſylv. hirſutior 152
fullonum, v. dipſacus ſativus 175
mariæ off. v. Card. alb. maculis notatus 150
pratenſis latif. v. Cnicus pratenſ. 152
ſ. ſcolymus, v. Cinara hort. 150
ſolſtitiatis, v. ſub Calcitrapæ ſpec. 148. 149. & alias ſpec. ſub Cirſio 151. ſeq.

Carex anguſtifol. ſpic. ruf. divulſa 259
major ſpic. min. compacta 259
minor, ſpica divulſa 259
montan. ſpic. compreſſa diſticha 259
multicaulis, ſpic. longior. gryſ. 259
nemoroſus, ſpic. parv. aſperis 259
polycephalos 259
polyſtachyos 259
ſylvat. ſpic. parv. ſeſſil. in fol. alis 259

Carlina acaulos, magno fl. 171
cauleſcens, magno fl. 172

Carlina acaulos, min. purp. fl. v. Cirſium acaul. 151
min. purp. fl. v. Cirſ. acaul. fl. purp. 151

Carpinus Dod. 265
Carthamus off. 159
Carum Rivini & Dod. 227
Caryophyllata aquatica 86
vulgaris 86

Caryophyllus mexic. fl. fiſt. ſ. v. Taget. Ind. fl. ſ. 171
min. mural. v. Lychn. annua 93

Caryo-

Caryophyllus montanus maj. fl. globoſo v. Statice 75
prat. fl. lacin. ſimpl. v. Lychn. tal. 92
ſub Tunicæ ſpeciebus 93. 93
Caſſida paluſtris, vulg. fl. albo 180
paluſtris, vulg. fl. cœrul. 180
Caſſutha, v. Cuſcuta maj. 21
Caſtanea equina Dod. v. Hippocaſtan. 235
Catanance leguminoſa, v. Niſſolia 211
Cataputia minor, I. B. v. Eſula maj. Riv. 219
Cataria Tournefort. v. Nepeta Rivini 191
Caucalis chærephylli fol. Riv. 224
vulgaris 224
Caucalis max. v. Tordylium max. 220
v. ſub echinophoræ ſpec. 223
Cauda equina, v. Equiſetum 281
muris, v. Myoſurus 83
vulpis, v. Panicum maritimum 245
Cedronella orientalis, ſalic. fol. Riv. 182
Rivini 182
Cedrus baccifera, v. Sabina baccifera 311
Centaureum flore albo 17
phœniceo 17
purpur. minim. 17
Centaureum collinum Geſn. v. Jacea vulg. laciniata 147
majus off. v. Chironia Riv. 150
min. adulterin. v. Muſcipula hiſpan. 100
Cepa Aſcalonica 123
bicornis, tenuifolia 123
oblonga Dodonæi 123
fectilis Camerar. 123
vulgar. flor. & tun. candid. 123
purp. 123
Ceraſia acida Tabern. v. Ceraſus ſativa fr. acido 107
nigra, racemoſa, v. Padus germ. 108
Ceraſus fructu acido 107
albo, dulci 107
hortenſis, pleno flore 108
major & ſylveſtris 108

Ceraſus pumila 108
racemoſa, hortenſis 108
ſativa, fructu rot. rubro acido 107
majore C. B. 107
Cerefolium officinarum 228
ſylveſtre Rivini 228
Cereus 133
Cereus craſſiſſimus v. Melocactus 133
Cerinthe flore ex rubro purpuraſc. 6
major ſpinoſo folio 6
verſicol. flore 6
minor Bauhin. 6
Cervaria Rivini 221
Cervicaria major, v. Campanula vulgatior 23
media Thalii, v. Campan. media 23
Cervi ſpina Riv. & Cordi 74
Chærophillum ſylv. v. Caucalis chæroph. fol. 224
v. ſub Cerefolii ſpec. 228
Chalcitis Tabern. v. Chryſanthem. fol. matricariæ 130
Chamæbalanus leguminoſa v. Lathyrus arv. rep. tuberoſ. 210
Chamæceraſus v. ſub Xyloſtei ſpeciebus 203
Chamæciſſus fl. purpureo 188
Rivini 188
Chamæcypariſſus, v. Santolina fol. teretibus 158
Chamædrys minor, repens 177
fl. albo 177
Chamædrys fruticoſa, ſylv. meliſſæ fol. vid. Scorodonia 177
maritima, v. Marum Cortuſii 177
paluſtris, canadenſ. v. Scordium 177
ſpuria min. rotundifol. v. Veronica min. 179
Chamæiris flore ſatur. violaceo 25
minor, fl. varie picto 26
Chamælæa tricoccos C. B. 49
Chamælæa Germ. v. Laureola fol. deciduo 32
Chamælæon exiguus, v. Cirſium acaul. 151

Chamæmelum fœtidum 139
inodorum 139
nobile 139
vulgare 139
Chamæmelum chryſanth. v. Bupht. tanac. min. fol. 136
Chamænerion altiſſ. ſylvaticum 29
glabrum, latifol. maj. 30
min. 30
paluſtre fol. ſaligno 29
hirſ. magno flore 30
parvo flore 30
Chamæpitis officinarum 178
Chamærubus Cluſ. v. Rubus alp. fol. ribes 115
ſaxatilis, v. Rubus alp. humil. 115
Chamæpyxos v. Buxus fol. rotundioribus 264
Chamomilla, v. Chamæmelum. 139
Cheiri v. Keiri 60. 61
Chelidonia rotundif. maj. & min. v. Ficar. vulg. 127
Chelidonium ſive Chelidonia 56
Chenopodium anguſtifolium laciniat. 272
annuum humifuſ. 272
atriplicis ſativæ fol. 272
betæ folio 272
fœtidum 272
folio ſinuato 272
triangulo 272
lini folio villoſo 273
pes anſerin. I. Tabern. 271
II. Tabern. 271
ſuaveol. fol. long. 273
quernis 273
Chironia Rivini 150
Chondrilla cœrulea 166
juncea viſcoſa 166
ſonchi folio, fl. luteo 166
purpur. 167
Chondrilla purp. fœt. v. hyer. dent. leon. fol. fl. rub. 160
v. ſub ſpeciebus Sonchi 165

Chriſtophoriana vulgaris 74
Chryſanthemum arvenſe 136
fl. part. cand. part. lut. 136
part. cand. part. lut. fl. pl. 136
fol. matricariæ 136
maj. fol. prof. lacin. 136
Chryſanthemum aſteris facie, v. Aſteriſcus annuus 139
Chryſanthemi plures ſpec. v. ſub tit. Solis 135
Chryſocome, v. Elichryſ. ann. 156
Chryſoſplenium fol. amplioribus auriculatis 57
Cicer ſylv. fol. obl. v. Glaux Riv. 217. ſeq.
Cicercula ægyptiaca, v. Lathyrus ang. 210
Cichorium criſpum 169
latifolium 169
ſativum 169
ſylveſt. ſ. officin. 168
Cichorium verrucar. v. zazintha 169
Cicla offic. v. Beta alba 275
Cicuta major 229
Cicuta aquatica Wepff. v. Cicutaria Riv. 228
min. petroſel. ſim. v. Cynapium Riv. 228
Cicutaria Riviui 229
Cicutaria ſata Lobel. v. Cynapium Riv. 228. 229
vid. ſub tit. Myrrhis 227. 228
Cinara hortenſ. aculeata 150
fol. non aculeat. 150
Circæa Lutetiana 44
minima 44
Cirſium acaul. fl. purpureo 151
arvenſe, ſonchi folio 151
pratenſe Aſphod. rad. 151
polycephalon 151
ſingul. capit. parvis 151
Ciſſampelos ſ. Malaccociſſos 53
Ciſtus folio ſalviæ 101
rotundifolius, fl. roſeo 101
Ciſtus humilis, v. Parnaſſia 91
Citreum vulgare Tourneſ. 113

Citrullus fol. colocynth. v. Anguria 43
Clematis flore ſimplici 54
purpur. fl. pleno 54
Clematis daphnoid. maj. fl. cœrul. v. Vinca Riv. 21
ſcandens, v. Flammula 53
v. ſub Granadillæ titulo 134
Clematis cœrulea, v. Clematis purpur. 54
daphnoides maj. v. Vinca Riv. 21
Clinopodium origano ſimile. 188
Clymenum hiſpanic. v. Lathyrus fol. pinnatis 211
Cnicus atractylis lut. dictus 153
pratenſis, acanthi folio 152
pratenſis humilior 153
ſylveſtris hirſutior ſ. C. B. 152
Cnicus vulg. ſ. ſativ. v. Carthamus off. 159
Coccigrya, v. Cotinus Tourn. 80
Cochlearia altiſſ. fol. glaſti 67
folio ſubrotundo 67
Cochlearia fol. cubitali, v. Armoracia 67
Cochleata echinata acul. ſurſ. & deorſ. tend. 214
fr. doliato Riv. 214
minima Riv. 214
Colchicum commune 27
flore pleno 28
Colonea Matth. v. Cydonia 112
Colutea æthiopica 310
veſicaria 215
ſcorpioides, v. Coronilla maj. 216
ſiliquoſa, min. v. Coronilla mont. 216
Coma aurea germ. Park. v. Conyza linar. fol. 155
Conferva geniculata v. Alga fontalis 308
Conſolida Rivini 6
Conſolida media, v. Bugula 187
pal. v. Jacobæa pal. altiſſ. fol. ſerr. 142
regalis v. Delphinium ſeg. 234
Convolvulus Indicus fl. purpuraſc. 22
Luſitanicus 22
major, albus 23

Convolvulus minor, arvenſis fl. roſ. 22
orientalis 23
purpur. fol. ſubrot. 22
Conyza africana fruteſcens 155
fol. primulæ ver. 154
linariæ folio 155
major, vulgaris 154
Conyza canadenſis, v. Virg. aur. virginiana 146
Conyzæ vid. pl. ſpec. ſub tit. Jacobææ 142. 143
Coralloides albida Tourn. 302
dilute purpuraſcens 302
flava 302
ramoſa, candidiſſ. 303
minima 303
nigra 303
Coralloides min. bulbif. v. Dentaria 63
ramoſa, minima, v. Agaric. corn. dam. ref. 63
Coriandrum majus 229
Corindum Tournefort. 220
Cornus ſylveſtris, mas 72
vulgaris 72
Corona imperialis Dod. 119
fl. pulch. lut. 119
fol. vario 119
Corona Solis, v. Sol. 134. 135
Coronilla major Rivini 216
montana Riv. 216
fl. vario 216
Coronopus Ruellii 67
Corylus ſativ. fr. albo minore 265
oblongo, rubente 265
rotundo max. 265
ſylveſtris ſive vulgaris 265
Coſtus hort. v. Tanacet. hort. 157
Cotinus Tournefortii 80
Cotoneaſter Bauhinorum 109
Cotyledon æthiopicus 31
Dioſcoridis 31

Cotyle-

Cotyledon altera Matth. v. Geum 97
aquat. Dod. v. Hydrocotyle 221
media fol. obl. ferr. v. Saxifraga ſedi fol. 98
Cracca flore ochroleuco 212
minor Rivini 212
ſiliqua gemella 212
ſolitaria 212
Rivini 212
ſylvatica Riv. 212
rotundifolia 212
Craſſa, minor 21
Rivini 10
Cratægus alpinus, alni fol. incano 109
folio lanciniato Tourn. 109
Crepidus lupi J. B. v. Lycoperdon vulgare 304
Criſta galli anguſtifolia 194
humilior 594
major & elatior 194
pratenſis, humilior 194
Crithmum IV. Matth. v. Falcaria Riv. 225
Crocus vernus anguſtifol 26
latifol. alb. variegatus 26
flavus 26
ſativus C. B. 26
Crocus autumnalis, v. Crocus ſativus 26
Cruciata hirſuta 3
Crupina Belgarum 148
Cucumis vulgaris ſativ. 41
Cucumis aſininus, v. Elaterium 41
Cucurbita longa 43
Cucurbitæ pl. ſpecies, v. ſub tit. Pepon. 42. 43
Cuminum prat. v. Carum Riv. 227
Cupreſſus meta in vaſtig. convol. 270
ram. extra ſe ſparg. 271
Cuſcuta major C. B. 21
minor C. B. 22

Cyanus floridus odoratus fl. albo 146
luteo 146
major. 146
hortenſ. dil. janth. 147
diſco carneo 147
immac. cand. 147
purpuraſc. 147
purpureo 147
rubro 147
flore incarn. 146
rubro 146
purpureo 146
montanus latifolius 146
ſegetum fl. albo 146
cœruleo 146
Cyanus moſchatus, v. Cyanus floridus 146
pulchro ſem. cent. min. v. Crupina Belg. 148
ſylv. v. Jacea latif. cap. hirſ. 147
Cydonia fr. breviore & rot. 112
Cymbalaria floſc. purpuraſc. J. B. 197
Cynapium Riv. & Tabern. 228
Cynogloſſum maj. vulg. 9
Cynogloſſum mont. maj. v. Cerinthe maj. 6
Cynosorchis macrocaul. v. Orchis palm. prat. max. 242
mil. mont. v. Orchis ſpica conglob. Riv. 239
Cyperella altiſſima 116
capit. pſilli 115
latifolia 116
nemorenſis 116
ſerotina 116
ſylvatica & ſaxatilis 116
Cyperoides capit. ranunc. 258
latifol. ſpic. teretibus 257
ſpic. rufa 256
nigro luteum, vern. maj. 257
min. 257

Cyperoides pal. acul. capit. brevioribus 257
polyſtach. flavicans 257
lanuginoſum 257
ſpicis parv. long. diſt. 257
pendul. brevior. 258
longior. 258
variis 258
ſylvarum tenuius ſpicat. 258
Cyperoides, v. ſub Caricis ſpeciebus 258. 259
Cyperus minimus, pan. ſparſ. ſubflav. 256
nigric. 255
rotundus, inod. germ. 255
Cytiſus Maranthæ vulgo, v. Falcata inc. Riv. 213

D.

Damaſonium flore albo 237
rubro 237
Damaſonium fl. herbac. v. Helleborine anguſtif. 237
I. Dioſc. v. Arnica Schræd. 141
Daphnoides fl. purp. v. Laureola fol. decid. 32
Datura, v. Stramoneum 30
Daucus anguloſi caul. Cord. v. Libanot. 226
mont. apii fol. maj. v. Cervaria Riv. 221
Delphinium elatius 235
hortenſe 235
ſegetum 234
vulgare 235
Delphinium buccinum Dioſc. v. Chamænerion pal. fol. ſaligno 29
Dens canis 120
Dens leonis ampliſſ. folio 159
anguſtiore folio 159
foliis minimis hirſ. 160
Dens leonis latiore folio 159
tenuiſſimo folio 160

Cyanus floridus odoratus fl. albo 146
luteo 146
major. 146
hortenſ. dil. janth. 147
diſco carneo 147
immac. cand. 147
purpuraſc. 147
purpureo 147
rubro 147
flore incarn. 146
rubro 146
purpureo 146
montanus latifolius 146
ſegetum fl. albo 146
cœruleo 146
Cyanus moſchatus, v. Cyanus floridus 146
pulchro ſem. cent. min. v. Crupina Belg. 148
ſylv. v. Jacea latif. cap. hirſ. 147
Cydonia fr. breviore & rot. 112
Cymbalaria floſc. purpuraſc. J. B. 197
Cynapium Riv. & Tabern. 228
Cynogloſſum maj. vulg. 9
Cynogloſſum mont. maj. v. Cerinthe maj. 6
Cynosorchis macrocaul. v. Orchis palm. prat. max. 242
mil. mont. v. Orchis ſpica conglob. Riv. 239
Cyperella altiſſima 116
capit. pſilli 115
latifolia 116
nemorenſis 116
ſerotina 116
ſylvatica & ſaxatilis 116
Cyperoides capit. ranunc. 258
latifol. ſpic. teretibus 257
ſpic. rufa 256
nigro luteum, vern. maj. 257
min. 257

Cyperoides pal. acul. capit. brevioribus 257
polyſtach. flavicans 257
lanuginoſum 257
ſpicis parv. long. diſt. 257
pendul. brevior. 258
longior. 258
variis 258
ſylvarum tenuius ſpicat. 258
Cyperoides, v. ſub Caricis ſpeciebus 258. 259
Cyperus minimus, pan. ſparſ. ſubflav. 256
nigric. 255
rotundus, inod. germ. 255
Cytiſus Maranthæ vulgo, v. Falcata inc. Riv. 213

D.

Damaſonium flore albo 237
rubro 237
Damaſonium fl. herbac. v. Helleborine anguſtif. 237
I. Dioſc. v. Arnica Schræd. 141
Daphnoides fl. purp. v. Laureola fol. decid. 32
Datura, v. Stramoneum 30
Daucus anguloſi caul. Cord. v. Libanot. 216
mont. apii fol. maj. v. Cervaria Riv. 221
Delphinium elatius 235
hortenſe 235
ſegetum 234
vulgare 235
Delphinium buccinum Dioſc. v. Chamænerion pal. fol. ſaligno 29
Dens canis 120
Dens leonis ampliſſ. folio 159
anguſtiore folio 159
foliis minimis hirſ. 160
Dens leonis latiore folio 159
tenuiſſimo folio 160

Dentis leonis pl. ſpec. v. ſub tit. Piloſell. 164
Dentaria heptaphyll. baccif. 63
Dentaria aphyllos III. Cluſ. v. Orobanche ſpur. 242
maj. Matth. v. Squamaria Riv. 193
Dictamus Creticus off. 191
adulterin. v. Pſeudo-Dict. 184
albus off. v. Fraxinella 235
Digitatis lutea, magno fl. 200
purpurea 199
Digitatis Indica, anguſtif. v. Dracocephal. 180
minima, v. Gratiola off. 200
Dipſacus folio laciniato 176
ſativus C. B. 175
ſylveſtris, capit. nim. 176
ſ. virga paſt. 176
Doronicum officinar. 141
Doronicum plantag. fol. v. Arnica 141
Draba minor, v. Alyſſ. fol. veron. 68
Dracocephalon Americanum 180
Draco herba Dod. v. Abrotanum linif. 158
ſylv. Dod. v. Ptarmica vulg. off. 140
Dracunculus aquat. Matth. v. Ariſarum Riv. 203
hort. v. Abrot. linif. 158
prat. v. ſub Ptarmicæ ſpec. 140
Dracuntium & Dracuncul. Vet. v. Arum polyphyll.
Drymopogon Rivini 99
Dulcamara, v. Solanum ſcand. 36

E.

EBulus ſ. Sambucus herbacea, v. Samb. humil. 35
Echinomelocactus Lob. v. Melocactus 41
Echinophora fl. magno Riv. 223
ſem. magno Riv. 224
parvo Riv. 224
Echinopus major 159
Echioides flore albo 176
cœrul. 176
pullo 177
calam plo 177

Echium vulgare 176
Echium fl. pullo Cluſ. v. Echioid. tal. 177
Fuchſii, v. Echioid. fl. cœr. 176
ſcorpioides, v. Myoſotis 7-8
Elæagnus Dalech. v. Salix, fol. longiſſ. 267
Elaphoboſcum ſativ. Paſtinaca 221
Elaterium Riv. & offic. 41
Elatine fol. acuminato 197
ſubrotundo 197
Elichryſum american. latif. 155
annuum, fl. conglobatis 156
montanum, fl. rot. 156
long. fol. & fl. 156
ſpicatum Tourn. 156
ſ. ſtœch. citr. anguſtif. 155
latifol. 155
Emerus Cæſalp. v. Coronilla maj. Riv. 216
Endivia criſpa, v. Cichorium criſp. 169
fol. lacin. dorſo ſpin. v. Lact. ſylv. coſt. ſpin. 167
vulg. v. Cichorium latifol. 169
Enneadynamis, v. Anthyllis Riv. 208
Enula campana v. Helenium 141
Ephemerum virgin. v. Tradeſcantia 48
Epimedium fruticans. v. Toxicodendron. 80
Epithymum, v. Cuſcuta minor 41
Equiſetum arvenſe, long. ſet. 282
foliis nudum 282
pal. brev. ſet. 281
long. ſet. 281
minus 282
ſylvat. tenuiſſ. ſet. 281
Equiſetum fœtidum v. Hippuris craſſior. 307
Erica ſpuria ſ. Tetralix 31
vulg. fl. albo 71
purp. 71
Erigeron Lob. v. Senecio 154
tomentoſ. v. Jacob. viſc. & hirſ. 143

Eruca arvenſ. vulgaris 6
rapifolio 6
Erucæ plur. ſpec. v. ſub tit. Siſymbr. 6
Ervum canad. v. Vicia ſat. alb. 21
Eryngium latif. planum 22
vulgare 22
Eryngium arv. fol. ſerr. ſimil. v. Falcaria Riv. 22
Eryſimum alterum 6
germanic. 6
vulgare 6
Eryſimum Theophr. v. Fagopyr. vulg. erect. 79
Erythrolapatum v. Lapath. fol. ac. 41
Eſula caule craſſo Riv. 22
dulcis Tragi 219
fol. amygdali, anguſt. 22
latifolia, arvenſ. 219
major Rivini 219
paluſtr. Riv. 219
punctis croceis notata C. B. 218
Rivini & Officinar. 218
rotundifol. non cren. 219
ſoliſequa 219
tenuifolia ſ. exigua 219
Eſula degener Riv. v. Eſula punctis croc. not. 218
Eupatorium cannabinum 154
novæ Angliæ beton. fol. 154
urtic. fol. 154
peruanum fruteſc. 154
Eupatorium cannab. chryſ. v. Verbeſ. fol. integro 135
veterum, v. Agrimon. off. 79
Euphraſia minus ramoſa 195
officinarum 195
ramoſa, pratenſ. 195
Euphraſia purp. & lut. v. ſub ſpec. Odont. 194
Evonymus vulgaris 74

F,

Faba flore candido 212
rotunda, oblonga 212
Fabaginea Cam. v. Fabago Tourn. 102
Fabago Tournef. 102
Fabaria officinarum 103
rotundifolia 103
Fagonia Tournef. 102
Fagopyrum ſcand. altiſſ. 79
vulg. erect. 79
ſcandens 79
Fagotriticum, v. Fagopyrum vulg. erect. 79
Fagus Dodon. 264
Falcaria Rivini 225
Falcata incana Riv. 213
Rivini 213
ſativa, fl. cœrul. 213
Farfara Dod. v. Tuſſilago off. 141
Ferrum equinum comoſum Riv. 215
Feſtuca, v. ſub tit. Gram. avenac. 254. 255
Ficaria vulgaris 127
Ficoides africana, erecta 132
procumb. 132
peregrina 132
Ficus Indica, v. Opuntia 133
Filago altera Dod. 157
minor 157
paluſtris 157
L herba impia Dod. 157
vulgar. fl. per caul. ſparſ. 157
tenuiſſ. folio 157
Filicula fontana major 278
minor 278
montana, fol. vario 278
quæ adianth. nigr. offic. 278

Filicula ſaxatilis, corniculata 278
non ramoſa 278
Filipendula officinarum 129
Filipendula aquat. v. Oenanthe 225
Filius ante patrem, v. Tuſſilago off. 141. ſeq.
Filix lonchitidi affinis 277
mas non ramoſa 277
mollis, glabræ 277
non ramoſa, dentata 277
petiol. tenuiſſ. 277
ramoſa minor 277
rhætica, ten. dentata 277
ſaxatilis, ramoſa 277
tenuiſſime ſecta 277
Filix fœmina off. v. Thelypteris Dioſc. 276
latifol. Cord. & Trag v. Oſmunda 287
mas off. v. Filix non ramoſ. dent. 277
Flammula Dod. 53
pannonica erecta 54
ſepium, fol. dent. 54
integr. 54
ſurrecta 54
Flos adonis, v. Adonis 126. 127
africanus, v. Tagetes 170
cardinalis, v. Cardinalis 201
conſtantinopol. v. Lychn. hirſ. fl. coccineo 91
cuculi Dod. v. Cardam. prat. 62. & Lychn. prætenſ. 92
hyeroſolymit. v. Lychn. hirſ. fl. coccineo 91
paſſionis, v. Granadilla 134
ſolis Dod. v. Helianth. vulg. fl. lut. 95
alias ſpec. v. ſub tit. Solis 134. 135
Trinitatis, v. Viola tricolor. 233
Fœniculum dulce 224
vulg. & officin. 224
Fœniculum aquat. v. Stellaria 43
galericul. v. Lentibularia 192
Fœnum Græcum, ſativ. 213
Fœnum græcum ſylv. v. Aſtragalus 217

Fontinalis, v. Potamogeton. 51. 52
Fragaria fructu albo 86
parvi prun. 86
vulgaris 86
Frangula Dodonæi 34
polycarpos 35
Fraxinella & Dictamnus alb. off. 235
flore albo 236
Fraxinus excelsior 269
Fritillaria præcox 119
Fritillaria crassa, cap. bon. sp. v. Crassa Riv. 20
Frumentum Indic. v. Mays, gr. aur. 261
Turcic. v. Mays gr. aur. 261
Frutex spiratus, fol. salig. serr. v. Spiræa fol. salicis 103
Fumaria officinarum 205
Fumaria bulbosa, v. Split. 216. 217
spuria afric. v. Capnoid. 215
Fungoides alpin. coccineum 308
arvense turbinatum 304
coccineum acet. forma 303
oris pilosis 303
peziza dictum acet. ref. 303
albic. 303
sylvaticum, hirsut. 303
minus 304
turbinatum disco albo 304
vulgatissimum 303
Fungus abietinus oris refl. 301
albus Mompelgard. dictus 301
bulbosus, fuscus 300
capreolinus 301
echinatus lut. min. 301
maximus 301
esculento similis 301
lamellatus & capitat. 301
varius 301
magnus totus alb. sine lact. fuco 301
orbicularis 301

Fungus pileolo lato 301
piperatus alb. lact ſucc. turg. 301
porotus pediculo craſſo 302
craſſiſſimo 302
ramoſus coralloid. 302
Fungus alb. acr. v. Fug. piperatus 301
Auguſti menſ. v. Fung. poroſus 302
autumnal. v. Boletus mitr. Pont. ref. 302
muſcarius, v. Fungus lamellatus 301
orbicular. v. Lycoperd. vulg. 304
phalloides. Tourneſ. v. Boletus tal. 302
pulverulentus, dict. crepid. lup. v. Lycoperd. vulg. 304
min. v. Lycoperd. pariſ. 304
quercinus, v. Fung. bulboſ. 300
ramoſ. minim. v. Coralloid. ſpec. 302. 303
ſanguineus, v. Lycoperd. 304
ſeminiſer Menz. v. Fungoid. vulgatiſſ. 303

G.

Galega vulgaris 214
Galega nemor. v. Orobus ſylvat. purp. 209
Galeopſis altera, caul. acul. 282
lutea, amplior. fol. 183
paluſtris, beton. fol. 183
patula ſegetum, fl purp. 183
fol. latiore 183
procerior, caule acul. 182
fœtida 182
urtica iners, fl. lut. 183
Galeopſis, v. Lamium 181
Gallitrichum ſativum, v. Sclarea Tab. 179
ſylv. v. Sclarea prat. fol. ſerr. 179
Gallium album, latifol. pratenſ. 2
ſylveſtre 2
ſupinum 3

Gallium luteum 2
montanum altiſſ. 3
Gallium pal. alb, v. Aſperula, quadrifol. 4
Gelſeminum Indicum tetraphyll. 200
Rivini 200
Geniſta juncea 215
ſpartium min. germ. 215
tinctoria germ. 215
Geniſta ſpinoſa, v. Geniſta ſ. part.min.germ. 215
Gentiana alba off. v. Laſerpit. fol. lat. 223
alpina, fl. magno, v. Gentianella alp. 16
autumnalis, v. Gentianella autumn. 16
minor ſ. cruciata, v. Gentianell. per. 16
nigra off. v. Cervaria Riv. 221
Gentianella alpina, verna major 16
anguſtif. autumn. maj. 17
autumnal. annua 16
cœrulea, oris piloſis 16
perennis, rad. cruciatim pertuſa 16
Geranium african. alchimillæ fol. 232
arboreſcens, fol. malvæ 232
ibiſci fol. 232
fol. infer. aſari 232
maximum 232
batrachoides 231
cicutæ fol. minus 231
moſchatum 231
latifol. longiſſ. acu 231
lucidum ſaxatile 231
Robertian. officinar. 231
triſte, ſ. Indicum 232
Geranii plur. ſpec. v. ſub tit. Gruinal. 103. 104. 105
Geum folio obl. ſerrato 97
rotundo majus 97
ſubrotundo 97
Gladiolus germanicus 201
Gladiolus aquat. Dod. v. Butomus 124
Glaſtum ſ. Iſatis 50

Glaucium fl. lut. Tournef, 56
hirſut. fl. phœn. 56
Glaucoides maritima 16
Glaux Rivini 217
Glaux latiore fol. Thuringica, v. Glaucoides maritima 16
Globularia vulgaris 176
Glycyrrhiza officinarum 214
Glycyrrhiza ſylv. fl. lut. v. Aſtragalus 217
Gnaphalii ſpec. v. ſub tit. Elichryſ. 156. & Filag. 157
Goſſypium, v. Chamænerion. 30
pal. hirſ. parv. 30
Gramen agrorum Lobel. v. Gr. ſegetum panic. arundinac. 254
alopecuroides v. Gr. ſpicat. ſpica cyl. 248.249
alopecuros, minus, ſpica long. v. Panicum mant. 245
amabile trem. v. Gr. pan. loc. max. phœn. trem. 233
amoris dictum, v. Gr. panicul. elegantiſſ. 251
anatum Tragi, v. Gr. panic. aquat. fluit. 250
anthoxanthon ſpicat. 247
aquaticum paniculatum 252
ariſtatum J. B. v. Gr. ſpicat. glum. criſt. 248
arundinaceum aceroſa glum. v. Gr. pan. aqv. phalar. ſem. 252
enode maj. mont. v. Gr. panic. aut. pan. ampl. 249
geniculat. v. Gr. aqv. pan. lat. 252
ſpica multipl. v. Gr. pan. tale 253
avenaceum arv. glum. non villoſ. 254
glumarum ſtam. aur. 254
locuſtis villoſ. craſſioribus 254
montanum lanuginoſ. 254
locuſt. rubr. 254
panic. ſparſ. locuſt. maj. 254
pratenſe, glumis xeramp. 255
ſylvat. paniculat. latifol. 254
utriculis lanuginoſis 254

Gramen

Gramen-caninum paniculatum 251
capillatum 253
caninum arv. v. Gr. loliac. rad. rep. 245
longius radicat. maj. v. Gr. panic. latit. rad. rep. 250
cum cauda muris, v. Gr. ſpicat. ſpica cyl. 248
cyperoides v. ſub tit. Cyperi 255. ſeq.
Cyperoid. 256. ſeq. & Caric. 258. ſeq.
dactylon, anguſtifolium 248
Indicum, ſpic. longior. 249
radice rep. ſ. off. 248
digitatum hirſ. v. Gr. Dactyl. 248
floridum, v. Aſine prat. gram. fol. 87
hirſutum v. ſub Cyperellarum ſpec. 116
junceum ſpicatum, v. Triglochin. Riv. 47
& plur. ſpec. ſub Junci tit. 117
lanatum. v. Gr. prat. panic. molle 251
latif. ſpica triticea 246
legitimum, v. Gr. Dactyl. rad. rep. 248. ſeq.
loliaceum, altiſſimum 246
anguſtiore folio 245
corniculat. 246
minus ſupinum 246
minim. fol. junceis 246
nemorenſe latif. hirſ. 246
rapice repente 245
ſpica long. ariſt. 245
ſine ariſtis 245
triticea comp. 246
maritimum, ſpic. alt. v. Trigl. mar. 47
miliaceum aquat. v. Gr. pan. aqv. mil. 250
Lob. v. Gr. ſylv. pan. mil. ſparſ. 252
minus vulgare, panic. rigida 252
montanum, avenaceum, locuſt. rubr. 254
murorum, duriuſc. v. Gr. pan. min. rad. rep. 250
nodoſum, v. Gr. ſpic. cil. brevi 248
officin. v. Gr. loliac. rad. rep. 245

Gramen paluſtre, panic. altiſſima 252
panicula miliacea 252
paniculatum aquat. fluitans 250
miliaceum 250
phalaris ſem. 252
fol. var. 253
arundin. ſp. multipl. 253
autumn. pan. ampl. 249
anguſt. 249
latif. rad. repente 250
locuſtis maximis 253
majus & perenne 251
medium 251
minimum, molle 251
minus, loc. parv. trem. 253
rad. repente 251
proliferum 252
ſpica craſſ. & brev. 250
paniculis elegantiſſimis 251
panicum, v. ſub tit. Panic. 244
Parnaſſi, v. Parnaſſia 91
pennatum, v. Gr. ſpic. ariſt. penn. 247
plumeum, v. Gr. ſpic. ariſt. penn. 247
plumoſum Lob. v. Gr. pan. arund. pan. denſa 253
pratenſe panicula duriori 252
paniculat. majus 295
medium 251
minus, alb. 251
rubr. 251
molle 251
ſecalinum majus ſylvat. 247
pratenſe & elatius 246
ſegetum, pan. arund. 254
ſerotinum, ſpica laxa, caneſc. 247
ſpica brizæ minus 246
lavendulæ, Merret. v. Gr. panicul. aut. pan. ang. 249

Gramen ſpicatum aquaticum 249
ariſtis pennatis 247
glumis criſtatis 248
variis 247
ſemine miliaceo albo 247
ſparteum 247
ſpica cylindr. brevi 248
longiſt. 248
molli 249
tenuiori 248
tenuiſſima 248
vulgare ſecalinum 246
ſylvaticum, panic, miliac. ſparſa 252
tomentoſum, v. Linagroſtis 260
& Gr. pan. arund. pan. denſ. 253
tremulum minus, locuſt. deltoid. 253
v. Gr. panic. min. 253
panicula fuſca, v. Gr. panic. locuſt. max. 253
typhoides, v. Gr. ſpicat. ſpica cylindr. 248
verſicolor. J. B. v. Gr. ſpicatum glumis variis 247
xerampelinum 251
Granadilla 134
folio tricuſpidi, fl. parvo 134
Gratiola officinarum 200
Gratiola cœrul. v. Caſida pal. 180
Groſſularia hort. maj. fructu 40
multiplici acino 40
non ſpinoſa, fr. nigro 41
ſimplici acino 40
ſpinoſa, ſativa 40
vulgar. fr. dulci 40
Gruinalis arv. fol. tenuius diſſ. 105
fol. malvæ rotundo 104
rot. fl. majore 104
pedic. longiſſ. inſiſt. 201

Gruinalis montana hæmotodes 104
fl. varieg. 104
petal. nigro fusc. 104
petalis eleganter striatis 104
fuscis, reflexis 104
pratensis, fol. ranunc. 103
maxima 203

H.

Hæmanthus africanus 27
Hæmatodes, alter. fol. batrachoid. v. Geran. batrach. 231
Lobel. v. Geran. latif. 231
v. Gruinalis montana 104
Halicacabum peregr. v. Corindum Tourn. 220
Riv. v. Alkekengi Riv. 38
Halimus latifol. v. Atriplex talis 274
f. portul. marina. v. Atriplex maritima 274
Hedera arborea 110
Hedera terrestris vulg. v. Chamæcissus Riv. 188
Hedypnois Tournef. 169
Hedypnois, v. Dens leon. latiore fol. 159
Hedysarum clypeatum 215
Hedysarum alter. v. Glaux Riv. 217
Helenium officinarum 141
Helenium Indic. max. v. Sol. ampl. nut. fl. 134
Helianthemum annuum, fol. plant. hirs. 95
flore maculoso 95
serpilli folio 95
vulgare, fl. luteo 95
Helianthemum Ind. v. Sol. altiss. rad. tuberosa 135
Helianthus africanus 220
minor fœtidus 220
Heliochrysos Trag. v. Conyza linar. fol. 155
Helleboraster 131

Helleborine altera, atro-rub. fl. 238
anguſtifol. 237
Rivini 237
ſylv. rad. rep. 238
fol. teſſellat. 238
Helleborine fl. albo, v. Damaſ. fl. albo 237
rot. v. Calceolus 237
paluſtr. noſtras, v. Helleborine anguſtif. 237
recentiorum III. Cluſ. v. Damaſ. fl. r. Riv. 237
IV. Cluſ. v. Damaſ. fl. alb. 237
Helleborus nig. anguſtior. foliis 130
hortenſ. fl. viridi 130
Helleborus alb. fl. atro-rub. v. Veratrum 123
Hippocratis, v. Adonis mont. 126
nig. fl. roſeo, v. Helleb. nig. ang. 130
fœtid. v. Helleboraſter 131
legitim. v. Helleb. nig. ang. 130
ranunc. fol. v. Trollius 130
tuberoſ. ran. fol. v. Aconitum 130
ſanicul. fol. v. Aſtrantia 226
Helxine ciſſampel. v. Convolv. min. arv. 22
Hepatica fl. pleno, cœrul. 127
purpur. 127
ſimpl. argent. 127
cœrul. 127
ſubpurp. 127
petræa, umbellata 296
Hepatica alba off. v. Parnaſſia 91
fontana off. v. Lichen petr. latifol. 295
I. & III. Tabern. v. ſub Lichenis petr. tit. 295
Hepatorium Dod. v. Eupatorium 154
Heracantha Tabern. & Riv. 172
Herba Bromos Dod. v. Gr. aven. pan. ſparſa 254
coſtæ, v. Hieracium alpin. latif. 162
Julia, v. Ptarmica lutea 140
locuſta, v. Valerianella arv. præc. 174
maxima v. Sol 134

Herba paris Tourn. & off. v. Paris 74
ramiſta Jung. v. Valerianell. arv. præc. 174
Herniaria glabra 274
Heſperis hortenſis C. B. 61
fl. viridi 61
montana, pallida odor. 61
Hieracium alpinum latif. macul. 162
amygd. amar. olens 160
aſperum, maj. flore 161
quibusd. hyoſc. ang. 161
dent. leon. fol. fl. ſuav. rub. 160
monoclonon 160
oblongo 160
obtuſ. maj. 161
echioides capit. Card. bened. 163
fol. coronopi 161
piloſiſſ. minimum 161
fruticoſum, anguſtif. 162
latifol. 162
ſtrictiſſ. fol. 163
latifol. glabrum 161
præmorſa rad. 162
luteum hirſutum 163
maj. erect. anguſtif. 160
minus dent. leon. fol. obl. 160
ſub aſp. 168
præmorſa rad. 160
montanum rapifolium 161
murorum, fol. minus piloſo 161
piloſiſſimo 162
laciniatum minus piloſ. 162
piloſum, latifol. altiſſ. 161
narbonenſe 160
Hieracium capill. fol. v. Scorz. lacin. fol. 168
minus, fol. ſubrot. v. Hyoſeris latif. 170
parv. hirſ. v. Dens leon. fol. minimo 160
ſiliqua falcata v. Phagadiolus 170
ſtellatum, v. Phagadiol. alter. 170

Hieracium v. Piloſellæ ſpec. 163
& Sonchi 165
Hippocaſtanum Tournef. 235
Hippogloſſum, v. Ruſcus anguſtifol. 125
Hippolapathum, v. Lapath. hort. 45
Hippomarathrum Riv. 226
Hippuris craſſior. 307
foliis ad inſtar C. C. div. 307
longioribus, rarior. & ten. ſet. 307
tenuioribus & bifureis ſet. 307
Hippuris Lob. v. Equiſet. pal. long. ſet. 281
tenuiſſima, v. Equiſet. ſylv. 281. ſeq.
Hirundinaria off. v. Vincetoxicum Dod. 20
Hiſpidula Rivini, v. Elichryſ. mont. fl. rotundiore 156
Holoſteum caryophylleum, v. Alſine hirſ magno fl. 88.
& ſub arenaria vernæ 89
Matthiol. junceum, v. Junc. pal. hum. 117
petræum Tab. v. Filic. ſaxat. cornic. 278
Hordeum polyſtich. hybernum 244
Horminum coma purpuro-viol. 178
pratenſe, fl. minore 178
ſylveſtre, latifolium 178
ſalvifol. minus 178
Hormini pl. ſpec. vid. ſub Sclareæ tit. 179
Hyacinthus indicus, tuberoſus 28
oriental. caule macul. 28
Hyacinthi pl. ſpec. v. ſub tit. Muſcari 28. 29. & Ornithog. 120. 121
Hydrocotyle Tournef. 221
Hydrolapathum v. Lapath. aqv. min. 46
Hydropiper, v. Perſicaria urens 78
Hyoſcyamus albus minor 200
vulgaris vel niger 200
Hyoſcyamus Peruvianus, v. Nicotiana maj. 19
Hyoſeris latifolia 170
Hyoſeris altera vel ang. v. Hierac. min. dent. leon. fol. obl. 160. 161

Hypericum aſcyron dict. 99
elegantiſſimum 99
fruticoſum creticum 99
minus ſupinum 99
villoſum, erectum 99
vulgare Bauhinor. 98
Hypericum arboreſcens Munt. v. Spiræa hyperic. fol. non cren. 103
mont. olympi, v. Aſcyr. exig. fol. 103
Hypochœris porcellia, v. Hierac. latif. 161
Hypopitis Riv. 71
Hyſſopus officinarum cœrul. 191
rubro flore 192
vulgaris alba 191

I.

Jacea alba, hirſuto capite 147
auſtriaca III. Cluſ. 148
fol. candicantibus, laciniatis 148
cichoraceis, villoſis 148
erucæ, lanuginoſis 148
latifolia, cap. hirſuto 147
nigra anguſtifolia 147
pratenſis latif. 147
vulgaris laciniata, fl. purp. 147
Jacea annua fol. laciniat. v. Crupina Belgar. 148
lutea, capite ſpinoſo majori, v. Calcitrapa, f. ſolſtitial. 148
oleæ folio, capite ſimpl. v. Stœbe Riv. 171
tricolor, v. Viola tricolor 233
Jacobæa africana, annua 143
altiſſima, fol. erucæ 142
maritima 143
montana, lanuginoſa 142
nemorenſis 142

Jacobæa paluſtr. alt. fol. ſerrato 142
ſuaveol. 143
fol. diſſect. 143
ſenecionis folio 142
viſcoſa & hirſuta 143
vulgaris, laciniata 143
Jaſminum, ſ. Gelſemin. lut. 34
hiſpanicum, fl. maj. 34
indicum, flavum 34
luteum, vulgo bacciferum 34
vulgatius, fl. albo 33
Jaſminum Perſicum, v. Syringa liguſtri fol. 18
Iberis Matthioli 67
Iberis Fuchſii, v. Cardam. prat. 62
latiore fol. C. B. v. Lepidium anguſtif. 67
offic. S. Dal. v. Lepid. ang. 67
Illecebra ſpuria vel ſedoides 79
off. v. Sedum parv. acre 102
Impatiens Rivini 217
Imperatoria offic. 222
ſativa, v. Angelica ſativa 222
Intybum, v. ſub ſpeciebus Cichor. 169
Inula Columellæ, v. Helenium 141
Jovis herba Dod. v. ſemper vivum tector. maj. 132
Iris graminea 25
lutea, ſativa 25
variegata 25
paluſtris lutea 26
pratenſis, anguſtifolia 25
tenuifolia, major 25
vulgaris, germanica 25
Iris bulboſa, tota violacea, v. Xyphium Tourn. 26
Iſatis ſylveſtris 50
Iſatis, v. Glaſtum ſativum 50
Iſchænum II. Tabern. v. Gr. dact. anguſtif. 248
Iva moſchata 310
Jucca glorioſa hort. v Tucca 124
Juncago Tourn. v. Trigloch. Riv. 47

Juncellus inutilis, ſ. chamæſchœnos, v. Cirpus omnium min. cap. brev. 256
minimus, capitulis equiſeti, v. Scirpus omn. minimus 256
Juncus acutus pan. ſparſa 116
alpinus, fol. rigid. 117
fol. artic. fl. umbell. 117
cum utricul. 117
& panic. diſp. 117
foliatus minimus 118
lævis, panic. ſparſa maj. 116
non ſparſa 116
nemoroſus, fol. articulat. 117
paluſtris humilior 117
parvus, c. pericarp. rot. 117
pratenſis humillimus 117
Juncus capitulis equiſeti maj. v. Scirpus talis 256
capitulo lanugin. v. Linagroſtis ſylv. 260
floridus maj. v. Butomus fl. roſeo 141
max. holoſchœnus, v. Scirpus pal. altiſſ. 256
Juncipl. ſpec. v. ſub tit. Cyperellæ 115
Jungermannia alpina, nigricans 295
fol. ſubrot. major. 294
minor 294
nemoroſa, pedic. altiſſ. 294
ſylvat. min. nigricans 295
Juniperus vulgaris, fruticoſa 271

K.

KAli geniculatum majus 310

Keiri flore albo, odoratiſſ. 60
incanum majus 60
coccineum 60
minus 60

Keiri luteum, magn. flore 60
maxim. 60
pleno flore 60
vulgare 60
majus, fl. pleno ferrugineo 61
ex purp. & aureo varieg. 61
purpur. vel rubrum 60
ſylvat. fol. hierac. 61
Ketmia ægyptiaca 31
Syrorum 31
veſicaria vulg. 31
Knaul Tragi & Germ. v. Knawel 76
Knawel fol. & fl. albic. 76
viridi 76

L.

Labrum Veneris alter, v. Dipſacus ſylv. 176
Matth. v. Dipſacus ſativ. 175
Laburnum Rivini 208
Lacrymæ Jobi 261
Lactuca ſativa 167
ſylveſtr. alter. 167
coſta ſpinoſa 167
odore viroſo 167
Lactuca pl. ſpec. v. ſub Chondrillæ titulis 166. 167
Lactuca angnina Tabern. v. Valer. arv. præc. 174
Ladanum ſaget latif. v. Galeopſ. tal. 183
Lagopus, v. titulis rubris 207
Dodonæi 207
Lagopus maj. alt. Dod. v. Trifol. mont. ſpica longiſſ. 206
Lamium alba linea notatum 181
fol. caul. ambiente 181
oblongo 181
purpureum fœtid. 181
vulgare, album 181

Lamii plur. ſpec. v. ſub Galeopſide 183
Lampſana Dodonæi 169
ſylvatica elatior 169
Lantana, v. Viburnum 32
Lapathum aquaticum minus 46
exotic. fol. ampliſſ. 44
fol. acut. fl. aureo 45
criſpo 45
plano 45
rubente 45
minus acuto 45
hortenſe, latifolium 46
fol. oblongo 45
maximum aquaticum 46
minimum 45
ſylv. magnum vulgare 46
Lapathum fluitans v. Potamoget. long. ſerr. fol. 52
Lapathi pl. ſpec. v. ſub Spinacia 261
Lappa ſ. Bardana maj. fl. albo 152
montana 152
officinorum 152
Lappula flore albo 10
Rivini 19
Lappula, v. ſub Echinophoræ ſpec. 223. ſq.
Laſerpitium foliis latioribus 223
minus Rivini 223
Lathyris, v. Eſula major 219
Lathyrus anguſtif. ſem. maculoſo 210
arvenſ. rep. tuberoſus 210
foliis pinnatis 211
latifolius 210
paluſtris fl. orobi nemor. 211
pratenſis Rivini 211
ſativus, fl. fructuque albo 209
ſiculus Rivini 210
ſiliqua hirſuta Riv. 210
ſylveſtris major 210
tingitanus 211

Lathyrus, v. Niſſolia 211
Lavandula anguſtifolia 190
folio diſſecto 190
latifolia 190
Lavandula fol. crenato, v. Stœchas fol. ſerr. 190
Laureola alpina, linifolia 32
fol. deciduo, fl. albo 32
ſ. meſereon 32
Laurus latifolia πλατυτέρα 73
vulgaris 73
folio undulato 73
Laurus ſylv. v. Tinus prior Cluſ. 32
Laurus-Tinus prior v. Tinus prior Cluſ. 32
Ledum roſmarini folio 101
Lens major 209
vulgaris 209
maj. rep. v. Falcata 213
Lentibularia Geſn. & Riv. 192
Lentiſcus 269
Leonurus perennis, african. 184
Lepidium anguſtifolium 67
latifolium 67
Lepidium glaſtifol. v. Cochlear. altiſſ. 67
Leucanthemum american. altiſſ. 137
fruteſcens, ſapor. pyrethri 137
tanacet. fol. fl. maj. 137
min. 137
vulgare Tournefort. 137
caule vill. caneſc. 137
Leucojum hortenſe minus 121
ſerotinum multiflor. 121
ſylvaticum 121
Leucojum bulboſ. hexaph. v. Leucoj. ſylv. 121
lunatum, v. Bulbonac ann. purp. 70
maj. multifl. v. Leucoj. ſerot. multifl. 121
triph. v. Leucoj. hort. minus 121
Leucojum v. ſub Keiri ſpeciebus 60. 61

Leviſticum officinarum 225
Libanotis altera, v. Cervaria Riv. 221
Lichen arboreus, amplisſimus 297
capillac. ramoſ. 297
capit. cavis 299
elegantisſimus 299
fol. abſinthii 299
ſ. pulmonar. arb. 296
hirſutus 299
cinereus, arboreus 298
latifolius 300
cruſtaceus, arborum 296
cinereus arb. 296
cruſtæ modo arb. adnaſc. 296
ten. div. 296
ſaxis adnaſc. 296
Dioſcoridis, v. Lichen cruſtaceus 296
gelatinoſus, fugax, maj. 299
min. 299
lobis craſſ. 300
lobatus 300
nemoroſus vireſcens 299
petræus, lat. fol. ſ. hepat. font. 295
minimus 295
ſtellatus 295
umbellatus 295
pulmonarius, cinereus 297
digitatus 298
ſaxatilis 297
pyxidatus, acetabul. fuſc. 298
cornu ſimpl. 299
major 298
ſaxatilis, ampl. & eleg. 299
latifolius 295
tereſtris ericetorum 298
pinetorum 297
Liguſticum vulgare, v. Leviſticum 225
Liguſtrum 36

Liguſtri pl. ſpec. v. ſub. Syringæ titulo 18. 19
Lilac v. ſub Syringæ ſpec. pag. 18. & Philadelphi 70
Lilium, album vulgare 118
convallium fl. rubris 38
officin. 38
purpureo croceum majus 118
Lilium convallium minus, v. Unifol. 73
rubr. rad. aſphod. v. Lilio-aſphodelus 27
v. Martagon 119
Lilio-aſphodelus luteus 27
phœniceus 27
Lilio-Narciſſus 27
Limon vulgaris 114
Limonium maritimum maj. 75
Linagroſtis ſpica multiplici 260
ſimplici 260
Linaria officinarum 196
pumila, vulgatior 197
triphylla, cœrulea 197
valentina 196
Linaria aurea maj. & min. v. ſub Conyzæ ſpec. 155
belvedere dicta, v. Chenopod. linif. villoſo 273
montana fl. albic. v. Linoſyris Riv. 76
Lingua cervina offic. v. Phillitis 279
Linodorum, v. Orobanche maj. 192
Linoſyris Rivini 76
Linum catharcticum 105
ſativum 105
latifol. african. 105
Linum umbilicatum Raj. v. Omphalodes 10
Lithoſpermum maj. erect. 8
minus rep. 8
Lithoſp. arund. v. Lacrymæ Jobi 261
v. ſub Myoſotid. ſpec. 7
Locuſta Riv. v. Valeriana arvenſ. præcox 174
Lonchitis minor. v Spicant 279
Lotus corniculata glabra 216
frutic. ſ. anguſtifolius 216
pentaphyllos, fl. maj. 216

Lotus ſiliquoſus, rubello fl. 216
tetragonolobus Riv. 216
Lotus, hort. odora, v. Melilotus fl. cæruleo 208
Lunaria racemoſa major 280
Riv. & Dod. 280
Lunaria, v. Bulbonac 70
Lupinus anguſtifolius 213
ſativus, fl. albo 213
ſylveſtris, fl. luteo 213
purpur. 213
Lupulinum minimum 207
montanum 207
Rivini 207
Lupulus fœmina 263
mas 263
Luteola foliis criſpis 234
herba, ſalicis folio 234
Lutum herba Dod. v. Luteola 234
Lychnis alba multiplex 91
ann. minima, fl. carn. 93
coronaria Dioſc. ſativ. 93
hirſuta fl. coccineo 91
incarnato maj. 91
minor, fl. varieg. 92
noctiflora C. B. 92
pratenſ. fl. lacin. 92
purpurea multiplex 92
ſ. ſaponaria fl. pleno 92
ſegetum major 92
rubra, fol. perfol. 92
ſylv. alba ſimplex 91
ſpica reflexa 93
ſ. aquatica 91
quæ ſaponar. vulgo 92
Lychnis calcedonica vulgo. v. Lychnis hirſ. fl. incarn. 91
ſylv. viſcoſa, r. ang. v. Veſicaria Riv. 101
trapezuntica v. Lychn. hirſ. fl. coccin. major 91
v. Muſcipula 100

Lyco-

Lycoperdon, capite cylindraceo 304
parisiense 304
pyriforme 304
verrucosum 304
vulgare Tournef. 304
Lycopersicum fructu rubro 37
Galeni Anguill. 37
Lycopodium alterum, fol. junip. 281
officin. & Tabern. 280
sabinæ facie 281
Lycopus palustris glaber 186
Lysimachia cœrulea, v. Cassida pal. 180
lutea corniculata, v. Onagra 29
Lysimachiæ plur. spec. v. sub Nummularia p. 14. & Chamæner. 29. 30

M.

Maguei v. Aloe spuria 27
Majorana rotundifol. scutellata 191
villosa 191
tenuifolia 191
vulgaris 191
Malus sylv. fr. valde acerbo 113
rubro 113
Malus armen. maj. v. Armeniaca 107
aurant. v. Aurantium 113
aureus, v. Lycopersicum 37
citr. vulg. Ferr. v. Citreum vulg. 113
granata, v. Punica 133
limonia, v. Limon 114
medica v. Citreum vulg. 113
persica, v. Persica 107
punica, fl. pleno maj. v. Punica tal. 133
Malva arborea, veneta dicta 11
crispa s. laciniosa 11
frutescens, fol. rotundiore inc. 12

Malva mauritiana 10
montana mollis, & incan. 12
rotundifol. lacin. 12
paluſtris mollis & incan. fl. maj. 12
P. Herm. 12
roſea fol. ſubrot. C. B. 11
fl. pleno 11
ſylveſtris altiſſ. ſ. alcea off. 12
folio rotundo 10
ſinuato 10
Mandragora mas ſ. offic. 37
Marrubiaſtrum, ſideritid. fol. 186
cardiacæ fol. 186
Marrubium album & offic. 187
anguſtif. 187
Marrubium aquat. v. Lycopus pal. 186
cardiaca dict. v. Cardiaca 184
nigrum, fœtid. v. Ballote Matth. 182
Marum Cortuſii 177
verum, v. Marum Cortuſ. 177
Martagon orientale 119
ſylvatic. offic. 118
Matricaria fl. pleno 139
vulg. & offic. 118
Matriſylva tanacetifol. v. Leucanth. tal. 137
officinarum v. Aſperula ſylv. 4
II. Trag. v. Gallium latif. ſylv. 2
Mays granis aureis 261
Medica v. Cochleatæ ſpec. 214. & Falcatæ 213
Melampyrum criſtatum Riv. 194
montanum Riv. 193
purpuraſc. coma 193
ſylvaticum Riv. 193
Melanthium, v. ſub tit. Nigellæ 131
Meleagris, v. Fritiluria 119
Melianthus africanus 220
minor, fœtidus 220

Melilotus fl. cœrul. 208
minima Rivini 208
officin. fl. albo 208
luteo 208
Melilótus V. Tragi. v. Coronilla fl. vario 216
Meliſſa hortenſis 187
Meliſſa adulterina, v. Meliſſophyllum Riv. 187
forte cavarina, v. Moldavia lævis 184
Fuchſii it. Tragi, v. Meliſſophyll. 187
humilis latifol. v. Meliſſophyllon 187
moluccana, v. Molucca lævis 184
turcica, v. Cedronella 182
Meliſſophyllum Rivini 187
Melo reticulatus J. B. 42
vulgaris C. B. 41
Melocactus american. fl. albo 133
Indiæ orientalis 41
minor & lacteſcens 41
Melones J. B. v. Melo vulg. C. B. 41
Melo-pepo clypei formis 43
Mentha arvenſis verticillata 185
rotundifol. criſpa 185
paluſtris 185
paluſtris, fol. oblongo 185
ſylveſtris 185
Mentha cataria, v. Nepeta Riv. 191
hortenſ. corymbifera, v. Tanacet. hort. 157
Menthæ plur. ſpec. v. ſub Menthaſtro 184. 185. & Puleg. 185. 186
Menthaſtrum folio rugoſo 184
ſpicatum, cultum 184
fol. criſpo 185
longo 185
Mespilus Germ. v. Laureola fol. decid. 32
Mespilus alpina, fol. alni 110
Germanica & offic. 110

Meſpilus apii folio laciniato, v. Oxyacantha vulg. 109
Sylv. v. Cratæg. fol. lac. 109
Meum fol. anethi 225
Milium ſemine albo officinarum 244
luteo, officinarum 244
nigro 244
Milium ſylvat. Tab. I. & II. v. Melamp. mont. 193. ſeq.
Millefolium fl. luteo 140
purpureum, maj. 140
vulgare, album 140
purpur. min. 140
Millefolium aquat. v. Pinaſtella infirm. 275. & Potamog. ſpec. 52. 53
fol. abrot. v. Ranunc. aqv. capill. 82
fœniculi, v. Ranunc. aqv. alb. 82
lentibulat. v. Lentibularia 192
Mirabilis Rivini 1
Moldavica americana trifol. odore gravi 182
Moldavica, v. Cedronellæ ſpecies 182
Mollugo montana, v. Gallium alb. latifol. 2
anguſtif. v. Gallium alb. latif. prat. 3
184
Moluccа lævis Dodonæi 184
Moly alpinum, latif. caule maculato 122
latifolium fl. albo 122
montanum, fol. narciſſi 122
pyrenaicum, fl. luteo 122
ſylvaticum, latifolium 122
Momordica vulgar. Tournef. 41
Momum plenum, v. Solanum fruticoſ. baccif. 37
Monophyllon, v. Unifolium 73
Morſus diaboli, v. ſucciſa 175
gallinæ fol. hederulæ v. Lam. fol. caul. amb. 181
ranæ foliis aſari 49
Morus fructu albo 271
nigro 271

Ioſchatellina Tournef. 40
Iuraria Rivini 279
Iuſcari Cluſii 28
minus, cœrul. racemoſum 28
nemorenſe, comoſum 28
paniculatum, monſtroſum 29
Iuſcipula hiſpan. latif. cal. turg. 100
umbellata 100
montana, hirſuta 100
pratenſis, veſicaria 100
Iuſcus abietis facie C. B. 291
apocarpus, aquatic. 284
capit. ſeſſil. 284
omn. minimus 284
ſaxatilis brev. denſ. 284
capit. albo pelluc. 283
obſcur. rubr. 283
ſylvatic. ceſpitoſus 283
terreſtris fol. latiuſcul. 284
arboreus, capitulis cavis, nigris 299
argenteus, capit. reflexis 289
capillaceus, fol. rotundiore 288
lanuginoſus 288
major, capit. craſſior. 287
longiſſ. 285
& elatior 287
ped. & cap. craſſ. 285
medius, cap. globoſis 285
minimus, acaulos 285
calyptra longa 286
cap. nutante 288
pyriform. 287
muralis, ſtellatus 286
minor, capit. longiore 286
omnium minimus 287
ſtellatus, prolifer 285

Muſcus craſſubicus criſt. caſtr. referens 290
coronatus humilis 286
v. ſub Muſcis capill. 285. 286. 287
Muſcus cupreſſi formis 292
dendroides, v. Muſc. ſquamoſ. dendr. 291
erectus, v. Selago 282
ericetorum hirſut. cáneſcens 292
filicinus, major 290
minor 290
foliolis plan. acut. corn. alc. refer. 290
nemor. non ram. 291
latifolius, erectior & altior 287
lichenoides capillaris 293
fol. polygoni obl. 293
quaſi filic. fol. 293
montanus, erectus, pallidus 292
Tabernæmontani 292
muralis, min. roſ. v. Muſc. Capill min. mur. 286
nummulariæ folio maj. 293
ſubrot. 293
paluſtris fol. ſubrotundis 292
major, ſerpilli folio 292
pennatus, fol. ſubrotund. bifid. 294
min. 294
omnium minimus 290
polygoni folio 292
polytrichoides v. Muſc. capill. minor 286
v. ſub Muſc. pal. 292
ſaxatilis ericoides 291
fol. 3. vel 4. denticulis 293
nummulariæ folio 293
ſquamoſus abieti formis, v. Selago 282
dendroides repens 291
ſurcul. 291
erectus, major 291
minor 291
ericoides C. B. 291
foliolis rotundis 290

Muſcus ſquamoſus linariæ folio 291
paluſtris, candicans 289
pennatus cap. adianthi 290
repens veluti ſpicatus 290
terreſtris capillaris 289
clavatus, v. Lycopod. 280. ſeq.
e viridi palleſcens 291
ramoſus, erectus 292
vulgatiſſimus 261
trichomanoides v. Muſc. nummular. fol. 293. & Muſc. capillac. med. 285
vulgaris, pennatus major 290
minor 290
Myagrum II. Lob. v. Turrit. leucoji fol. 62
v. ſub Alyſſi ſpeciebus 69
Myoſotis minor, arvenſis 8
paluſtris, major 7
fl. albo 7
ſylveſtris præcox 7
Myoſotid. al. ſpec. v. ſub Alſin. tit. 88
Myoſurus J. Bauhini 83
Myriophyllum Rivini 16
Myriophyll. aquat. v. ſub Potamog. fol. penn. 53. & Myrioph. Riv. 16
Myrrhis annua ſem. ſtriato 227
fœtens Rivini 228
latifolia Rivini 228
paluſtris, latifolia 228
perennis, alba 227
Myrrhis major, vel Cicutar. odor. v. Odorata Rivini 227
ſylveſtris v. Caucalis chæreph. fol. 224
Myrtillus, Tabern. v. Vaccinium Riv. 39
Myrtus Bœotica latifolia 114
foliis minimis & mucronat. 114
minor vulgaris 114
tarentina, fl. pleno 114

N.

Napellus flore cæruleo Riv. 234
luteo Riv. 234
Napus ſativa 65
ſylveſtris 65
Narciſſo-Leucoj. v. Leucojum ſylv. 121
Narciſſus flore ſimplici, med. purp. 27
juncifolius 27
major, fl. ochroleuco 26
totus luteus 26
multiplex 27
Narciſſus VI. Matth. v. Leucoj. hort. minus 121
VII. Matth. v. Leucoj. ſylv. 121
Naſturtium hortenſe, criſpum 66
latifolium 66
vulgatum 66
Naſturtium Indic. fol. peltato. v. Cardamind. ind. 230
ſylveſtre, v. Coronopns 67
verrucoſum, v. Coronopus 67
vid. porro ſub tit. Cardamin. 62. Syſymbr. 63.
Accipitr. 64
Thlaſpid. 218
Natrix Anonis ſpin. carens 215
minor, odore theriacæ 215
Nemoroſa flore minore, luteo 128
purpuraſcente 128
roſeo, albo expanſo 128
Nepetha Rivini 191
Nerion fl. albis 21
rubeſcentibus 21
indicum, anguſtifol. fl. odor. 21
latifol. fl. rubro pleno 21
Nerion Indicum, v. Nerion latifol. 21
Nicotiana major, latifolia 19
Nidus avis 238

Nigella arvenſis cornuta 131
cretica, latif. odorata 131
fl. majore pleno cœruleo 131
Nigella alba, ſimpl. fl. v. Nigella cretica 131
Nigellaſtrum Dod. v. Lychn. ſeg. maj. 92
Niſſolia Tournefortii 211
Noli me tangere, v. Impatiens Riv. 217
Nummularia erecta Riv. 14
ſupina & off. 14
Nux juglans ſ. regia vulgaris 264
metella Matth. v. Stramoneum fr. rot. 30
Nymphæa alba, major 130
lutea, maj. & offic. 130
Nymphæa alba min. v. Morſus ranæ 49
lutea, minor, v. Nymphoides 17
Nymphoides Tournefortii 17

O.

Ocimaſtrum, ſ. ocymoides, v. Lychn. ſylv. alba ſimpl. 91
verrucarium, v. Circæa Lutetiana 44
Ocimoides alb. fl. pl. v. Lychn. multipl. 91
album multis, v. Lychn. ſylv. alba ſimpl. 91
noctiflorum, v. Lychn. noctifl. 92
Ocimum caryophyllat. maj. 178
latifolium 178
vulgatius 178
Ocimum ſylveſtre, v. Acinos Rivini 188
Odontites flore luteo 194
Rivini & Tabern. 194
Odorata Rivini 227
Oenanthe aquatica C. B. 225
Olſenichium Cordi, v. Thyſſelium 222
Olſenitium off. & Riv. v. Thyſſelium 222
Omphalodes pumila, verna 10
Tournefortii 10

Onagra Tournef. & Rivini 29
Onobrychis foliis viciæ 206
orientalis, maj. 206
Onobrychis arvenſis, v. Speculum 25
Ophiogloſſum vulgatum C. B. ſ. offic. J. B. 280
Ophrys ſive Ophris 238
minor alpina 238
Opulus flore globoſo 33
Ruellii 33
Opuntia folio ſpinoſo, longiſſ. 133
maxima, fol. ſpinoſo 133
vulgo herbariorum 133
Orchis foliis ſeſſilibus non macul. 240
fœtida, ſylvatica, præcox, alba 239
fucum referens, col. rubig. 241
maſcula Riv. 238
militaris major 238
minor 239
morio fol. ſeſſilib. macul. 240
mas, fol. maculat. 239
myoides, galea & alis herbidis 240
odorata moſchata 240
odore hirci, brev. & lat. fol. 239
minor 239
palmata flore viridi 242
paluſtr. latifolia 242
pratenſis, maxima 242
ſambuci odore 242
ſpica conglobata Rivini 239
ſpiralis alba, odorata 240
Orchis abortiva, fuſca, v. Nidus avis 238
bifolia, latiſſima, v. Satyr. Riv. 241
minor, rad. rep. Camer. v. Helleborine ſylv. 235
Oreoſelinum apii fol. maj. v. Ceryaria Riv. 221
off. & Rivini 221
Origanum heracleoticum 191
fol. ſubrotundo 191

Origanum fruteſcens fol. oblongo 191
ſylveſtre 191
Ornithogalum anguſtif. bulbifer. 120
majus 120
fl. cœruleo ſpecioſo 121
luteum C. B. 120
minus 120
luſit. latif. fl. albo 121
cœrul. 120
medium, umbellat. 120
Orobanche major, caryoph. olens 192
minor, purpur. floribus 192
ramoſa, fl. cœrul. 192
ſpuria ſive corallorrhiza 242
Orobanche, quæ hypopyt. dici poteſt, v. Hypopytis 71
Orobus ſylvaticus, fol. oblong. glabr. 209
purpureus vernus 209
Orvala Dod. v. Sclarea Tabern. 179
Oſmunda maj. paluſtris 280
Oſmundæ rel. ſpec. v. ſub tit. Lunariæ 280
Oſſea Loniceri & Rivini 73
Oſtrya ulmo ſimilis, v. Carpinus Dod. 265
Oſtrutium, v. Imperatoria off. 222
Oſyris Dod. v. Chenopod. linifol. villoſ. 273
major, v. Linaria off. 196. 197
Otites Tabernæmont. 100
Oxalis vulg. v. ſub Acetoſæ ſpec. 46
Oxyacantha vulgaris 109
Oxycoccus Tournefortii 74
Oxys, v. Acetoſella 101. 102

P.

Padus exotica, folio amplo, craſſo 108
germanica, fol. deciduo 108
Paliurus Dodonæi 109

Palmata anguſtifolia maculata Riv. 241
non maculoſa 241
Palmata, ſ. cynosorch. macroc. v. Orch. palm. prat. max. 242
Panaces chironicum Matth. v. Helianth. vulg. 95
Panicum germanicum 244
maritimum, ſpica longiore 245
vulgare ſpic. multipl. aſpera 242
long. ariſt. 244
ſimpl. & aſpera 245
molliori 245
maritimum, ſpic. longiore 245
Papas americanum J. B. v. Solanum tuberoſum eſcul. 37
Papaver criſtat. fl. et ſemine albo 55
ex albo rub. mixt. 55
erraticum, capite longiore 56
longiſſimo 56
majus 56
minus 56
pleno flore 56
hortenſe, fl. pleno, dilute violaceo 55
violaceo 55
ſemine albo 55
nigro 55
Papaver corniculat. v. ſub Glaucii ſpec. 56
Parietaria minor ſ. fol. ocymi 274
officinarum & Dioſc. 274
Parietaria Lipſienſ. Tragi, v. Melamp. ſylv. 193
ſylv. II. Cluſ. v. Melamp. mont. 193
Paris Rivini 74
Parnaſſia Tournefortii & Riv. 91
Paronychia altera Dod. v. Saxif. verna 98
Matth. v. Muraria Riv. 279
Paſſerina Tragi 51
Paſtinaca paluſtr. altiſſ. 221
ſativa, latifolia 221
ſylveſtris, latifolia 221
Paſtinaca, v. ſub ſpeciebus Staphilini 224

aſtoria burſa, v. Burſa paſtoris 68
ecten Veneris J. B. v. Scandix ſem. roſtrato 223
edicularia fœtida III. Tragi, v. Helleboraſter 131
edicularis humilior 195
major 194
edicularis ſerotina, v. ſub Otontit. ſpec. 194
entaphylloides argenteum, alatum 85
paluſtre, rubrum 85
rectum, fruticoſum 85
ſupinum 85
entaphyllum ſupinum v. Pentaphylloid. tal. 85
vid. Quinquefolium 84. 85
viride, min. v. Torment. rad. rep. 53
epo oblongus C. Bauh. 42
fructu minimo, ſphæriceo 42
turbinato 42
ovato, flaveſcente 43
alter 43
variegato 43
parvo, pyriformi 43
pilæ palmariæ forma 42
ſubrotundo, variegato 42
turbinato, albido 42
ſubcroceo 42
variegato 42
rotundus aurantii forma 42
vulgaris 42
Perfoliata officinarum 227
Perfoliata montana Camerar. v. Bupleur. mont. 226
Periclimenum, perfoliatum C. B. 202
ſerot. 202
virginianum Rivini 203
vulgare germanicum 202
Periclimenum, v. ſub Xyloſtei ſpec. 203
Periploca Tournefort. 21
Periploca monſpeliaca, v. Vincetoxic. volub. 20
Perſica africana, nana, fl. incarn. 107
molli carne & vulgaris 107

Perſicaria anguſtifolia 78
mitis, maculoſa 77
cum maculis ferrum eqv. ref. 77
non maculoſa 78
orientalis altiſſima nicot. fol. 77
paluſtris, fluitans, fol. brev. 78
ſalicis folio 78
urens ſeu hydropiper 78
Perſicaria puſilla rep. v. Perſicaria minor, 78
Perſonata, v. ſub Lappæ ſpeciebus 152
Pervinca Tournefortii v. Vinca Riv. 21
Pes columbinus v. Gruinal. fol. malvæ rot. 104
leonis, v. Alchymilla vulg. 50
Petaſites major & vulgaris 153
Petum Rivini 19
Peucedanum germanicum 222
Phagadiolus alter Cæſalp. 170
Phalangium fl. maj. ſ. min. ramoſ. 124
narbonenſe fol. fiſtuloſis 224
parvo fl. ramoſum 224
Phalangium ephemerum, v. Tradeſcantia 48
Phalaris major, ſem. albo, v. Gr. ſpicat. ſem. mil. albo 247
Phaſeolus ægyptiacus, ſem. nigro 213
puniceo flore 213
vulgaris 213
Phellandrium caule craſſo 227
Dodonæi 227
Philadelphus Athen. & Rivini 70
flore pleno 71
Phœnix ſ. lolium mur. Dod. v. Gr. lol. anguſtiore fol. 245
Phu folio anguſtiore 174
glaſti 174
Phylica elatior C. B. v. Alaternus 35
Phyllirea, Dod. v. Liguſtrum 36
Phyllitis Dioſcoridis 279
Phyteuma Dod. v. Antirrh. arv. maj. 196
Phytolacca Americana 115

Picea maj. I. ſ. abies rubra, v. Abies ten. fol. 270
Piloſella major erecta 164
repens, min. hirſut. 164
montana, hiſpida, parv. fl. 163
officinarum 164
peregrina, fl. ſat. croceo 163
Piloſella maj. v. Hierac. muror. fol. piloſiſſ. 162
ſiliquata Thalii, v. Turritis vulg. 61
Pimpinella, ſaxifraga maj. umbell. 230
altera 230
minor C. Bauh. 230
tenuifolia Rivini 230
Pimpinella ſpicata, max. v. Melianthus african. 220
Pimpinell. pl. ſpec. v. ſub Sanguiſorb. 50
Pinguicula Geſneri 192
Pinaſtella infirmioribus & hamoſ. caulibus 275
ſurrectior 275
Pinaſter vulgaris 270
Pinus ſylveſtris, vulgaris 270
Piper Indicum, v. Capſicum ſiliqv. long. 37
Piperitis offic. v. Lepidium latifol. 67
Piſtacia ſylv. v. Staphylodendron Matth. 98
Piſum arvenſe 209
majus quadratum 209
umbellatum 209
Piſum ſylveſtre v. ſub Craccæ ſylv. ſpec. 212
veſicarium fr. nigro, v. Corindum Tourn. 220
Plantaginella 18
Plantago anguſtifolia maj. 310
minor 70
latifolia glabra 69
incana 69
roſea, fl. expanſo 69
inſpica diſp. 70
maritima, fol. graminis 70
Plantago aquat. latifolia v. Aliſma Riv. 47
minima, v. Plantaginella 18
Platanaria, v. ſub Spargan. ſpeciebus 260

Pneumonanthe Tabern. v. Gentiana anguſtif. 17
Podagraria Rivini & Lobelii 225
Pœonia fol. nigricante, ſplendido 130
fœmina 130
Polemonium fl. cœruleo & albo 24
Polemonium petræum Geſn. v. Muſcipula, mont. hirſ. 100
Polium lavendulæ folio v. Ajuga 178
montanum off. v. Ajuga 178
Polygala major 204
vulgaris 205
Polygalon Geſn. v. Onobrych. fol. viciæ 206
Polygonatum anguſtifol. non ramoſ. 39
latifol. fl. dupl. odor. 38
majore 38
vulgare 38
Polygonum brevi, anguſtoque folio 77
latifolium 77
litoreum minus 77
min. caryophyllæum 77
oblongo, anguſtifol. 77
Polygonum fœm. Dioſc. v. Pinaſtella ſurrect. 275
minus, ſ. millegrana, v. Herniaria 274
Polygoni pl. ſpec. v. ſub Linoide 72. & Knawel 76
Polypodium vulgare 278
Polypodium anguſtif. fol. vario v. Spicant 279
Polytrichum ſ. muſcus capillac. minimus 285
minor 285
Poytrichi alias ſpec. v. ſub tit. Muſci capillar. 285
Pomum amoris, v. Lycoperſicum 37
Populago, v. Caltha pal. 105
Populus alba 268
nigra 268
tremula 268
Porrum rad. granulata ſ. grumoſa 123
ſectivum, juncifolium 123
Porrum ſylveſtre, v. Allium ſylv. camp. 122

Portu-

ortulaca latifolia ſ. ſativa 95
ſpuria aquatica 95
ortulaca arvenſ. exigua v. Cameraria 96
orrum ſylv. latif. v. Allium ſylv. 122
otamogeton alpinum platani fol. 51
alterum 51
anguſtifolium 52
capillaceo folio 52
foliis anguſtis 51
criſpis 52
pennatis 52
alterum 53
gramineum, ramoſum 52
longo ferrato folio 52
puſillum, gram. folio 52
rotundifolium 51
otamogeton ſalicis fol. v. Perſicaria talis 78
otentilla Tournef. v. Pentaphylloides argent. alat. 85
iapeja v. Petum Rivini 19
rimula veris Conſtantinopolit. 14
hort. periant. colorato 13
major, fl. lut. odorato 13
pratenſis, inod. luteo-pall. 13
runella cœrul. magno fl. 180
folio laciniato 181
fl. albo 181
hyſſopifolia 181
maj. fol. non diſſecto 180
unus Brigniolenſis 106
fructu majore rotundo 106
max. rot. flavo 106
rubro 106
minore, auſtero 106
parvo præcoci 106
myrobalanus dicta Cluſio 106
ſativa vulgaris 106
ſylveſtris C. Bauh. 106
præcox, altior 107

Pſeudo-

Pſeudo-acacia 208
Pſeudo-capſicum Dod. v. Solan. frutic. bæccif. 37
Pſeudo-dictamnus acetabul. moluccæ 184
verticillatus inodor. 184
Pſeudo-melanthium, v. Lychn. ſeget. maj. 92
Pſeudo-glycyrrhiza Rivini 208
Pſeudo-narciſſus hiſpan. v. Narciſſ. maj. tot. lut. 26
Pſeudo-nardus, v Lavandula latifol. 190
Pſeudo-orchis bifol. v. Ophrys 238
C. B. v. Helleborine ſylv. 238
Pſeudo-viburnum american. v. Camara Riv. 202
Pſyllium officinarum 69
Ptarmica lutea, ſuaveolens 140
vulgar. fol. longo ſerr. 140
pleno flore 140
Ptarmica altera Matth. v. Stœbe Riv. 171
auſtriaca Cluſ. v. Stœbe Riv. 171
Pulegium anguſtifolium 186
latifolium 185
cervinum, v. Puleg. anguſtif. 186
Pulegium ſylv. v. Calamintha pulegii odore 188
Pulmonaria anguſtifol. fl. cœruleo 7
flore albo 7
folio non maculoſo 6
Pulmonaria cretica, v. Bugloſſoides 177
gallica, v. Hierac. muror. laciniat. 162
Pulſatilla fol. craſſiore & maj. fl. 129
Punica flore pleno, majore 133
quæ malum granat. fert 133
Pyramidalis læv. v. Campanula pyramyd. 23
Pyrethrum flore bellidis 137
Pyrola flore viridi C. Schefferi & Knauthii 236
folio mucronato Rivini 236
fruteſcens, arbuti folio C. B. 236
major & elatior 236
minima, vel IV. Cluſii 236
rotundifolia, major C. B. 236
minor 236

rola alsines flore, v. Trientalis Cord. & Riv. 15
rus sylvestris 113

Q.

Quamoclit, v. Convolvulus orient. 23
Quercus altera, tenerius dissecta 264
latifolia. exotica 264
mas 264
uinquefolium fol. argent. 84
lupini folio, argent. 84
majus, repens 84
min. rep. lanuginos. 84
luteum 84
montan. seric. hirs. obs. 85
rectum album 84
inquefolium fragif. rep. v. Pentaphylloides 85

R.

Adicula, sativa, v. sub Raphano maj. & min. 57
Radiola, v. Linoides 72
nunculus aquatic. capillaceus 82
cotyledon. fol. 82
fol. rotundo 82
aquatilis, albus, fluitans 82
arvensis, echinatus 82
asphod. rad. fl. sangv. 83
subphœnic. 83
hortensis, inclinans 83
longifolius, palustr. maj. 82
minor 83
montan. fol. aconiti 81
nemorosus, vel sylvaticus 81
palustris, apii folio 81
serratus 83

Ranunculus pratenſis, erectus, acris 81
dulcis 81
rad. verticilli 81
repens hirſutus 81
Ranunculus aquat. cotyled. fol. v. Hydrocotyle 221
arvenſis cum adhuc aliis v. ſub Adonis ſpec. 127
aſphodeli rad. maj. v. Thora maj. 53
globoſus, v. Trollius 130
nemoroſus moſchatella dict. v. Moſchatellina 40
purpur. v. Nemoroſa fl. purp. 128
paluſtr. fol. ſagittæ v. Sagitta 48
plantag. fol. v. Aliſma anguſtifol. 48
phragmites, lut. v. Nemoroſa fl. min. lut. 128
tridendatus, vern. fl. ſ. cærul. v. Hepat. fl. ſ. 127
vernus, rotundif. maj. v. Ficaria vulg. 127
Rapa ſativa, oblonga 65
rotunda 65
Raphaniſtrum diſpermum 57
fl. albo ſtriato 56
ſegetum, flore luteo 57
ſiliqua articulata 57
Raphanus major oblongus 57
orbicularis vel rot. 57
minor, oblongus 57
Raphanus aquaticus, v. Siſymbr. aquat. raphan. fol. 63
ruſticanus, ſ. ſylv. v. Armoracia 67
Raphaniſtroides, v. Raphaniſtrum diſpermum 57
Rapiſtrum aquat. v. Siſymbr. aquat. raph. fol. 63
arvenſ. fol. auric. v. Napus ſylv. 65
arvorum, v. Eruca arv. vulg. 64
orbiculatum Lobel. v. Rapa ſativa rot. 65
v. ſub Raphaniſtri ſpeciebus 57
Rapunculus corniculatus Riv. 201
ſpica breviore 201
alopecuroides, longa ſpica 201

apunculus eſculentus, v. Campan. rad. eſcul. 24
hort. pyramid. v. Campan. pyramidal. 23
nemoroſus anguſtif. v. Campan. nemor. 24
perſicæ fol. v. Campanula talis 24
ſcabioſæ capitulo, v. Rapuntium 24
vulgar. campanulat. v. Camp. rad. eſcul. 24
apuntium capitulis ſcabioſæ 24
egina prati Dod. v. Ulmaria Cluſ. 81
eſeda fol. calcitrapæ, fl. albo 234
vulgaris 234
eſta bovis, v. Anonis 214
habarbarum monach. v. Lapath. hort. latif. 46
Tournefort. v. Lapath. exot. 44
hagadiolus alter Cæſalpini 170
hamnus fol. ſubrot. v. Paliurus 109
Tournef. v. Cervi ſpina Riv. 74
hus, v. Sumach Arab. & off. 108
ibes, v. Groſſularia 40. ſeq.
icinus vulgaris 263
ogga Dod. v. Secale 244
orella vulgaris & offic. 90
oſa alba, vulgaris, major 111
campeſtris, ſpinoſiſſima, fl. albo 112
lutea, multiplex 112
ſimplex 112
máxima, multiplex 111
minor, rubello flore 111
punicea Cornuti 112
purpurea 111
rubra, ſimplex 111
ſaturatius rubens 111
ſylveſtr. pomifera, major 112
variorum colorum 111
verſicolor 111
oſa de Jericho v. Thlaſpi roſa de Jer. dict. 66
hierichuntina, v. Thlaſpi roſa de Jer. dict. 66
turcica, v. Roſa punicea Cornuti II. 112

Roſea Rivini & officinarum 72
Roſmarinus fol. variegato 189
hort. anguſtif. 189
argenteus 189
ſpontaneus, latiore folio 189
Roſmarin. ſylv. Matth. v. Ledum roſmar. fol. 101
Ros ſolis, fol. ſubrot. v. Rorella 90
Rubeola Tournefortii 5
Rubia tinctorum ſativa 34
Rubia cinanchica, v. Rubeola Tourn. 5
cœrulea arvenſ. v. Aſperula cœrul. arv. 5
erecta quadrifol. v. Aſperula 4
montana anguſtif. v. Gallium mont. 3
parva fl. cœrul. v. Aſperula hexaphyll. purp. 5
prat. lævis, acut. fol. v. Aſper. læv. 4
Rubus alpinus, fol. ribes 115
humilis J. B. 115
idæus non ſpinoſus 115
ſpinoſus fr. rubro 114
albo 115
odoratus Cornuti 115
repens fructu cæſio 115
vulgaris ſ. rubus fructu nigro 114
Ruſcus anguſtifolius fr. folio innaſc. 125
latifolius fr. fol. innaſcente 125
officinarum 125
Ruſcus anguſtifol. fr. ſummis ramul. innaſc. v. Smilax læv. 126
Ruta hortenſis altera 71
latifolia 71
Ruta muraria Tourneſ. v. Muraria Riv. 279

S.

SAbina baccifera J. B. 311
vulgaris Park. 311

Sabina ſylv. Trag. & Matth. v. Lycopodium ſabinæ facie 281
Sagitta aquatica major 48
minor, anguſtifolia 48
latifolia 48
Salicaria hyſſopi folio latiore 118
trifolia caule hexagono 118
vulgaris, purpur. fol. obl. 118
Salix folio amygdalino utrinque virente 267
aurito 267
longiſſimo, anguſtiſſ. 267
ex rotunditate acuminato 268
fragilis 267
humilis anguſtifolia 267
capitulo ſquamoſo 267
latifolia, erecta 267
latifolia repens 267
rotunda 267
montana major, fol. laurinis 267
oblongo, incan. acuto folio 267
platyphyllos 268
ſativa lutea, fol. crenat. 267
ſubrotunda, argent. fol. 267
vulgaris alba, arboreſc. 266
nigricans fol. longo 266
rubens 266
Salvia altera perelegans 180
cretica, baccifera 179
latifolia, ſerrata 180
major 179
foliis ex lut. & virid. varieg. 180
verſiculoribus 179
minor aurita 180
fol. variegatis 180
non aurita 180
Sambucus fructu in umbella nigro 35
viridi 35
foliis laciniatis 35

Sambucus humilis ſive Ebulus 35
racemoſa rubra 35
Sambucus aquat. fl. pl. v. Opulus fl. globoſo 33
ſimpl. v. Opulus Ruell. 33
paluſtris, v. Opulus Ruellii 33
roſea, v. Opulus, fl. globoſo 33
vulgar. v. Sambuc. fr. nigro 35
Sampſuchus, v. Thymbra 190
Sanguiſorba canadenſis fl. albo 50
major, pratenſis 50
minor, montana 50
Sanicula officinarum 225
Sanicula alpina, lutea C. B. v. Auriculà urſi fl. purp. 14
purpurea v. Auricula urſi fl. purp. 14
fœmina v. Aſtrantia 226
montana, v. Geum rotundif. maj. 97
fl. calcari donato. v. Pinquicula 192
Santolina foliis obſcure virentibus 158
teretibus, incarnis 158
Sarſaparilla, v. Smilax aſpera 126
Satureja ſativa 189
Satyrium Rivini 241
Satyrium tryphyllon Tabern. v. Orchis maſcula Riv. 238
Saxifraga muſcoſa, trifido folio 98
rotundifolia, alba 98
ſedi folio, anguſt. ſerr. 98
verna, annua, humil. 98
Saxifraga anglicana, v. Spergula graminea 58
aurea, v. Chryſoſplenium 57
graminea puſill. fl. parv. v. Spergula perennis 58
v. ſub tit. Pimpinellæ 230
Scabioſa alpina, fol. centaur. maj. 175
capite globoſo 175
multifido folio fl. flaveſc. 174
peregrina, rubra, capit. obl. 175
pratenſis hirſuta & offic. 174
flore albo 174
ſtellata, fol. laciniato 175

Scabiosa fol. integro hirs. v. Succisa 175
major squamatis capit, v. Jacea vulg.lacin. 147
Scandix semine rostrato 223
Scirpus equiseti capitulo, crassior & habilior 256
majori 256
omn. minim. cap.breviori 256
longiori 256
palustris altissimus 256
Sclarea hispanica Tabern. 179
pratensis, fol. serrat. fl. albo 179
amplo 179
cœruleo 179
rubente 179
Tabernæmontani 179
vulgaris lanuginosa ampl. fol. 179
Scolymus Tournefortii 170
Scoparia Riv. v. Chænopod. linif. villoso 273
Scordium C. B. vel officinar. Tourn. 177
Scordium alterum, v. Scorodonia 177
Scorodonia Riv. 177
Scorodoprasum II. Clus. v. Allium sat. alt. 122
Scorpioides bupl. fol. v. Campoides hispida Riv. 215
Scorzonera angustifolia altera 168
latifolia, altera 167
humilis 168
sinuata 167
Scorzonera nigra, v. Chondrilla cœrul. 166
Scrophularia aquatica, major 196
flore luteo 196
folio urticæ 196
nodosa fœtida 196
sambuci folio 196
Scrophularia minor, v. Ficaria 127
Scylla 121
Secale hybernum, majus 244
Securida dumetor. maj. v. Coronilla fl. vario 216
lutea, major 215

Sedum minimum lut. non acre 102
minus, luteum, fol. acuto 102
teretifolium album 102
paluſtre, ſubhirſut. purpur. 102
parvum, acre, fl. luteo 102
Sedum alpin. trifido fol. v. Saxifraga muſcoſa 98
gangrinum, v. Semper viv. alpin. 132
minus, fruticoſ. alter. v. Chenopod. marit. fruticoſ. 273
ſerratum, v. Saxifr. ſedi fol. 98
tritactyloides tector. v. Saxifraga verna 98
Selago, fol. & facie abietis 282
Semper vivum arboreſcens 132
tectorum majus 132
minus 132
Semper vivum v. ſub Sedi ſpeciebus 102
Senecio min. vulgaris 154
Senecio-Carduus, apulus Column. v. Crupina Belgar. 148
Senecio incanus, pinguis, v. Jacobæa viſc. & hirſ. 143
Serpentaria mas, v. Biſtorta 78
Serpillum anguſtifol. hirſutum 189
citratum Rivini 189
vulgare majus 189
minus 189
Serratula ſylvatica 152
Seſeli pratenſe Rivini 225
Seſeli æthiopicum veterum, v. Bupleur. arboreſc. 226
Sideritis flore albo, barba luteola 186
luteo Rivini & offic. 187
perennis ſupina 186
Sideritis arvenſis, anguſtif. rubra, v. Galeopſ. patula ſeget. 183
ſambucifol. v. Scrophularia tal. 196
Sigillum Salomonis, v. Polygonatum 38
Silaum, v. Seſeli pratenſe 225. 226
Sinapi ſemine albo & ruffo 64

Sina-

Sinapi plures ſpec. v. ſub Erucæ ſpec. 64
Siſarum germanorum 228
Sium erucæ folio, v. Cicutaria 229
minim. v. Cardamine ann. 62
Siſymbrium aquaticum fol. prof. lacin. 63
Matthiol. 63
raph. fol. 63
erucæ fol. glabro fl. lut. 63
minus 63
pleno 63
paluſtre repens 64
Siſymbricum annuum, v. Accipitrina 64
v. ſub Cardamin. ſpec. 62
Sium ſ. apium pal. foliis oblong. 230
aquaticum, minim. ſupinum 230
latifolium C. B. 230
Smilax aſpera, fr. rubente 126
lævis, fol. obl. acuto 126
Smilax hort. ſive Phaſeolus maj. v. Phaſeolus vulg. 213
unifolia humill. v. Unifolium 73
Sol atiſſimus, rad. tuberoſa eſcul. 135
virgæ aureæ foliis 135
ampliſſimo nutante flore 134
foliis hydrophylli 135
virgæ aur. fol. rad. tuberoſa 135
Solanum fruticoſum, bacciferum 37
officin. acinis luteis 36
nigricante 36
ſcandens ſ. Dulcamara 36
fl. albo 36
foliis variegatis 37
ſpinoſum, indic. fl. borrag. 37
tuberoſum, eſculentum 37
Solanum fœtidum, v. Stramoneum 30
halicacabum vulg. v. Alkek. Tourn. 38
Indicum Comer. v. Alkek. Ind. 38
magnum, virginianum v. Phytolacca 115
manicum, v. Belladonna 204

Solanum pomiferum, v. Lycoperſicum 37
quadrifolium baccif. v. Paris 74
racemoſum, ceraſor. forma. v. Lycoperſ. fr. rubro 37
ſomnifer. Vet. v. Alkek. maj. 38
veſicarium, v. Alkek. Tourn. 38
Solidago, v. Jacobæa nemor. 142
Sonchus æthiopicus perianth. membran. 165
aſper, arboreſcens 165
laciniat. creticus 165
fol. dent. leon. 164
non laciniatus C. B. 164
dipſac. fol. 164
lævis, folio integro 166
laciniatus fl. ſulph. 165
latifolius 165
minor, pauc. laciniis 165
quartus, fl. cœrul. 166
repens, multis hierac. majus 165
tingitanus, papav. fol. 164
Sonchus plur. ſpec. v. ſub Chondrillæ tit. 166. 167
Sophia Chirurgorum Lob. v. Accipitrina 64
Sorbus ſativa 112
Sorbus Aria cognom. vid. Cratægus, alp. alni fol. 109
aucuparia & ſylv. v. Aucupar. Riv. 112
legitima, v. Roſea punicea Corn. 112
torminalis, it. ſylv. Cratægus, fol. laciniato 109
Sparganium minimum 260
non ramoroſum 260
ramoſum 260
Spartium arboreſcens, v. Geniſta juncea 215
Spartum parvum Lobel. v. Gr. loliaceum minim. 246
Speculum, fl. cœruleo arvenſ. ſ. veneris 34
Spergula graminea 58
perennis 58
uuicaulis 58
Spergula marina noſtras, v. Arenaria maritima 89

Sphondilium vulgare, hirſutum 221
Spicant Tragi 279
Spica officinar. v. Lavandul. latif. 190
Spina acida, v. Berberis off. 125
alba, tomentoſa latif. ſylv. v. Carduus toment. 150
infectoria Matth. v. Cervi ſpina 74
lutea, v. Scolymus 170
ſtella Tabern. v. Calcitrapa 149
Spinacia vulgar. capſ. ſem. acul. 262
non acul. 262
Spiræa hyperici folio non crenato 103
ſalicis folio 103
Split fl. luteo 217
rad. rotunda, cava Rivini 216
non cava 217
Spongia ramoſa, fluviatilis 308
Squamaria Rivini 193
Stachys alpina 183
arv. minima Riv. 183
Stachys pal. fœtida, v. Galeopſ. pal. 183
Staphylinus Rivini 224
ſylveſtris 224
Staphylodendron Matthiol. 98
Statice 75
Stellaria aquatica 43
minor 44
Stœbe flore pleno 171
Rivini 171
Stœbe, v. ſub Jaceæ ſpeciebus 148
Stœchas fol. ſerrato 190
purpurata 190
Stœchas, v. Elichryſum 155
Stramoneum ſive Datura 30
fl. purpuraſcente 30
fructu rotundo 30
Strychnodendros v. Solan. frut. bacc. 37
Succiſa hirſuta 175

Sumach Arabum & offic. 108
Sycioides americana 33
Symphytum maculoſ. v. Pulmon ang. 7
minus, borrag. fac. v. Omphal. pum. 10
Tournef. ſ. maj. off. v. Conſol. Kiv. 6
Syringa fl. cœrul. major 18
laciniato folio 19
liguſtri folio 18
maj. flore albo 18
Syringa alba C. B. v. Philadelph. 70
Tournefortii, v. Philadelphus 70

T.

TAgetes indicus flore ſimplici fiſtuloſo 171
minimus 171
minor fol. pleno 170
multipl. flore 170
ſemifloſculis 171
ſimplici flore 170
maximus rectus fl. ſimplici 170
max. multipl. 170
Tamariſcus germanica Lobel. 95
Tamarix germanica v. Tamariſcus tal. 95
Tanacetum hortenſe fol. & od. menthæ 157
officinarum 157
minus, alb. odore camph. v. Millefol. nobile 140
vid. ſub. Tageti ſpec. 170
Taraxacon officin. v. Dens leon. latiore fol. 159
Tarchon, v. Abrotanum linifol. 158
Taxus 271
Telephium, v. ſub Fabariæ ſpeciebus 103
Tertianaria, v. Caſſida paluſtris 180
Teſticulus hircinus Tabern. v. Orchis odore hirci min. 239
morionis mas Dod. v. Orchis morio mas 239
odoratus, v. Orchis ſpiral. 240

tralix, v. Erica ſpuria 31
ucrium Bœticum 177
ucrium ſupinum, v. Veron. min. 197
ıalictrum alpinum aquileg. foliis 55
majus flavum 55
ſiliqua anguloſa 55
montanum, anguſtifol. 55
pratenſe, majus 54
ea 110
ıelephium, rad. roſ. ſpir. majus, v. Roſea Riv. 72
ıelypteris Dioſcoridis 276
paluſtris, non ramoſa 277
ıerebinthus 269
ıaſpidium alpinum fol. globular. 218
arvenſe, minimum 218
fol. iberidis 218
ılaſpi arvenſe, perfoliatum maj. 66
ſiliquis latis 66
perfoliatum, minus 66
roſa de jericho dictum 66
vulgatius 66
ılaſpi minus, v. Alyſſum incan. lut. 68
v. ſub Alyſſi 68. & Thlaſpid. ſpec. 218
ıora major Camerarii 53
ıya Theophraſti Ereſi 271
ıymelæa linariæ folio, v. Paſſerina Tragi 51
v. ſub Laureolæ ſpec. 32
ymbra hyſpanica, majoranæ folio 190
ymus vulgaris fol. latiore 189
yſſelium anguſtifol. Riv. 222
lia fœmina, folio majore 80
minore 80
montana, maximo folio 80
ictorius flos J. B. v. Geniſta, tinct. C. B. 215
mus prior Cluſii 32
thymalus maritimus, v. Unicetoxic. marit. 20
v. ſub Eſulæ ſpec. 218. ſeq.

Tordu-

Tordylium maximum Tournef. 220
Tormentilla radice repente 53
ſylveſtris 53
Toxicodendron Tournef. 80
Trachelium minus, v. Campan. prat. 23
Tourn. v. Cardinalis Riv. 201
Tradeſcantia ſ. Ephemerum Virgin. 48
Tragium cret. Bellon. v. Hyper. frutic. 99
Tragopogon pratenſe, lut. maj. 168
purpuro cœruleum 168
Tragopogon laciniat. lut. v. Scorz. lacin. fol. 168
Tragorchis, v. Orchis odore hirc. min. 239
Tragoſelinum, v. ſub tit. Pimpinellæ 230
Tribuloides Tournefortii 49
Tribulus aquaticus C. B. v. Tribuloides Tourn. 49
min. v. Potamog. fol. criſp. 52
Trichomanes ſ. Polytrichum off. 378
Tridactyloides tector. fl. alb. v. Saxifr. verna 98
Trientalis Cordi & Rivini 15
Trifoliata paludoſa, v. Menyanthes 17
Trifolium anguſtifol. fl. albo 206
aſphaltites, ſ. bituminoſum 207
fragiferum Friſicum 207
glomerulis oblongis 207
montanum, purpur. majus 207
ſpica longiſſ. rubente 206
pratenſe album 206
fl. albo min. & fœm. 207
purpureum 206
Trifolium acetoſum, v. Acetoſella 101.102
cochleat. echin. v. Cochleat. echin. aculeis 214
creticum ſpinoſum, v. Fabagonia 102
echinata arv. v. Cochleata ech. min. 214
fibrinum Tab. v. Menyanthes 17
fruticans, v. Jaſmin. lut. 34
hepaticum, v. Hepatica 127
paluſtre, v. Menyanthes 17

ifolium ſylv. lut. v. Falcata Riv. 213
v. Lagopus 207. & Lupulin. 207
iglochim maritimum, fr. breviore 47
Rivini 47
initas Matthioli. v. Hepat. fl. cœrul. 127
initatis flos, v. Viola tricolor 233
iorchis minor, lutea 240
iorchis odorata min. v. Orchis ſpira alba odor. 240
ipolium majus cœrul. v. After marit. pal. cœrul. 144
ticum æſtivum 243
hybernum, ariſtis carens 243
rufum hexaſtichon 243
ſpica multiplici 243
typhynum, ſimpl. folliculo 243
ticum vaccinum, Dod. v. Melampyrum 193
ollius 130
bera cervina 305
Matthioli 305
bera terræ, v. Tubera Matthioli 305
lipa præcox lutea 119
lipa capenſis vulgo, v. Hæmanthus 27
nica hort. varia, ſimpl. & plena 93
latifolia, flor. umbellatis 94
montana, altiſſima 94
ſileſiaca, flore majore 93
ſinenſis, fl. ſimpl. pulcherrimo 93
ſupina, fl. pl. incarnato 94
minore 93
ſylv. anguſtif. umbell. hirſuta 94
faſciculato flore 94
ſupina, fl. eleg. micantibus 94
unico 94
vulgaris multiflora 94
ritis fol. infer. cichoraceis 61
hirſuta, montana, alba 62
Leucoji folio 62
vulgaris, ramoſa 61

Tuſſilago officinarum 141
Typha paluſtris, major 260
clava gracili 260
Typha Lobel. v. Typha pal. maj. 260
Typha media Cluſ. v. Thypha pal. clav. gracili 260

V.

Vaccaria Dod. v. Lychnis ſegetum rubra 92
Vaccinium altiſſimum 39
foliis buxi 39
oblongis, crenat. 39
Rivini 39
Valeriana aquatica, minor, fl. min. 173
foliis calcitrapæ 174
major, odorata rad. 173
paluſtris maj. 173
min. 173
ſylveſtris major 173
Valeriana rubra v. Phu fol. glaſti 174
Valerianella arv. præcox, humilis 174
ſerot. altior 174
Veratrum fl ferrugineo 123
Verbaſcum anguſtifolium, ramoſum 195
mas, latifolium, lut. 195
nigrum, fl. albicantibus 195
luteo-purpur. 195
Verbaſculum, v. ſub Primulæ ver. ſpec. 13
Verbena communis 191
Verbeſina curaſſav. hierac. fol. 136
fol. tripartito diviſis 135
ſemine bi- vel tri-dentato 135
Vermicularis craſſula min. off. v. ſedum min. teretifol. 102
Veronica americana erecta 199
anguſtifolia, ſcutellata 198
floſcul. caulicul. adhæſ. 198

:ronica foliis chamædryos altera 198
Riv. 198
cymbalariæ Tourn. 198
rutæ Rivini 198
minor, foliis imis rotund. 197
officinarum 197
pratenſis, ſerpillifolia 199
ſpicata, anguſtifolia 198
latifolia 198
ſupina facie teucrii 198
teucrii folio 197
pratenſis, ſerpillifolia 199
ronica aquatica, v. ſub Beccabungæ ſpeciebus 199
mas, v. Veronica off. 197
icaria Volckam. v. Capnoides Riv. 215
urnum Matth. & Tournef. 32
ia anguſtif. Riv. 211
dumetorum, maxima 211
minima Rivini 211
ſativa, alba 211
vulgaris, ſem. nigro 211
ſylveſtris, lutea 211
ia lutea, fol. convolv. minoris, v. Aphaca Lobel. 211
v. ſub Craccæ ſpec. 212
torialis longa Cluſ. & officin. v. Moly alp. latif. caule macul. 122
oſa Tournefortii, v. Panicum marit. 245
ca flore albo 21
pleno purpureo 21
Rivini 21
:a pervinca off. v. Vinca Riv. 21
etoxicum Dodon. 20
flore nigricante 20
foliis variegatis 21
fruticoſum 20
maritim. ſalicis folio 20
volubile, fol. acutioribus 20

Viola alpina, apetalos 233
bicolor arv. fl. candido & lut. 234
inodora, flor. variegatis 233
martia, alba 233
inod. ſylv. fol. maj. 232
mucron. 232
multiplici flore 233
officinarum 232
paluſtris ang. perſicæ fol. mucronat. 233
fol. trachelii, glabris 233
rotundifol. fl. pl. pal. cœrul. 233
ſylvatica inod. fl. purp. 233
latifolia 232
tricolor 233

Viola barbata Dalech. v. Tunica ſylv. ang. 94
indica ſcand. v. Cardamindum majus 230
lunaris I. Tab. v. Bulbonac. ann. ſiliq. rot. 70
II. Tab. v. Bulbonac rad. rediv. 70
mariana, v. Campanula hort. 23
matronalis v. Heſperis hort. 61

Virga paſtoris, v. Dipſacus 176
Virgaurea anguſtif. panicula ſpecioſa 146
canadenſis, hirſuta 145
ſ. Doria 145
limonii folio 145
virginiana, annua 146

Virgaurea latifolia, v. Jacobæa nemor. 142
Viſcaria Rivini 101
Viſcum baccis albis 33
polycoccon Camerar. 33

Vitex Rivini 201
Vitis apiana 110
laciniatis foliis Corn. 110
ſubhirſuta 110
vinifera 110

itis Canadenſis Munt. v. Toxicodendron 80
Idæa paluſtris, v. Oxycoccus 74
Tournef. Tabern. J. B. v. ſub Vaccinii ſpeciebus 39
lmaria Cluſii 81
lmus campeſtris & Theophr. 266
carpini folio 266
folio latiſſimo 266
longioribus flor. & ſem. petiolis 266
mbilicus veneris, v. Cotyledon Dioſc. 31
minor I. & II. Tabern. v. Saxifr. ſedi fol. 98
nifolium Dodonæi 73
rtica urens, maxima 263
minor 263
pilulas ferens 263
rticæ pl. ſpec. v. ſub tit. Galeopſ. 182. 183. & Lamii 181
va moſchatellina, v. Vitis apiana 110
ulneraria ad fluvium Pfrim, v. Conyza fol. primver. 154
Tournef. v. Anthyll. Riv. 208
vularia hortulan. v. Ruſcus latifol. 125

X.

Xyloſteum alpinum, foliis alni Riv. 203
folio ceraſi Rivini 203
fructu nigo 203
Rivini 203
xyphium Tournefortii 26

Y.

Yucca fruteſcens fol. mucronatis 124
Yucca fol. aloës C. B. Yucca fruteſc. 124
Yucca nova, glorioſe elata Lob. v. Yucca fruteſc. 124

Z.

Zazintha Tourn. & Matth. 169
Zizipha ſativa J. B. v. Ziziphus Dod. 109
Ziziphus Dodonæi 109

Register der Teutschen Nahmen.

A.

Abbiß 175
Ackeley 131
Aker-Raute 205
Akerstrauß-Graß 254
Aker-Zwiebeln 120
Aker-Mennig 80
Adonis-Röslein 127
Aberaute 158
Abereiß 158
Agley 131
Ahorn 129
Aland 141
Alleluja 101
Allermanns-Harnisch 122
Alraun-Männlein 37
Aloe 200
Alp-Kraut 154
Amarellen 107
Ampffer
Buch-Ampffer 101
Sauer-Ampffer 46
Anblat 193
Andorn, schwartzer 182
weisser 187
Anemon-Röslein 128
Angelica 222
Anis 229
Apffel-Baum 113
Apostem-Kraut 174
Apricosen 107
Arlß-Beeren 109
Aron 203
Artischocken 150
Ascher-Wurtz 235
Aspen 268
Attich 35
Augen-Trost 195
Augen-Trost-Graß 87

B.

Bach-Bungen 199
Münts 185
Bär-Lap 280
Wurtz 221.225.226
Bären-Klau 221
Oehrlein 14
Baldrian 173
Bambergische Hasel-Nüsse 265
S. Barben-Kraut 63
Basilien-Kraut 178
Batenige 186

Baum
Apffel-Baum 113
Birn-Baum 113
Blasen-Baum 215
des Lebens 271
Eiben-Baum 271
Eich-Baum 264
Elster-Baum 265
Erlen-Baum 265
Esch-Baum 269
Färber-Baum 108
Faul-Baum 35
Fichten-Baum 270
Flieder-Baum 35
Granat-Apffel-B. 133
Hirschhorn-Baum 108
Hürrlitzgen-Baum 73
Kihn-Baum 270
Lien-Baum 270
Linden-Baum 80
Linsen-Baum 215
Lorbeer-Baum 73
Mandel-Baum 107
Maulbeer-Baum 271
Myrrthen-Baum 114
Näglein-Baum 18
Papel-Baum 268
Quitten-Baum 112
Rüst-Baum 266
Sade-Baum 311
wilder 283
Schling-Baum 32. 108
Sperber-Baum 112
Spill-Baum 74
Spindel-Baum 74
Tann-Baum 270
Tax-Baum 271
Ulm-Baum 266
Baum
Weiden-Baum 266
Zwerg-Bäume 113
Baum-Lungen-Kraut 297
Bauren-Senff 66
Beer
Arls-Beeren 109
Hind-Beeren 114. 115
Hohl-Beeren 114
Johanns-Beeren 40
Irr-Beeren 204
Knack-Beeren 86
Krammet-Beeren 271
Maul-Beeren 271
Moos-Beeren 74
Preussel-Beeren 39
Quitsch-Beeren 112
Stachel-Beeren 40
Sumpff-Beeren 74
Toll-Beeren 204
Trunckel-Beeren 39
Tunckel-Beeren 39
Wacholder-Beeren 74
Bein-Holtz 36
Welle 6
Beiß-Kohl römischer 275
Benedicten-Wurtz 86
Berg-Lavendel 178
Schlüssel-Blumen 14
Scordien 177
Bertram, weisser 140
Wurtz 137
Besem-Kraut 64
Betonien braune 186
grosse 186
wasser 196
Bettlers-Läuse 28
Beutel-Schnitter-Kr. 67

Beyfuß 158
türckischer 273
Bieber-Hödlein 127
Klee 17
Biebernell 50
Biesem-Blum 146
Knopff 146
Bilsen-Kraut 200
Biltzen 302
Bimsen 256
Bingel-Kraut 262
Bintzen 116. 256
Bircke 265
Blasen-Baum 215
Blatter-Zug 54
Blut-Kraut 50
Nuß 265
Wurtz 104
Bolerellen 104
Bocks-Bart 168
Horn 213
Kraut 99. 272
Bohnen
Feig-Bohnen 213
Plaisir-Bohnen 213
Sau-Bohnen 212
Spargel-Bohnen 216
türckische Bohnen 213
Borragen 10
Borretsch 10
Bovist 304
Braunellen 180
Braun-Wurtz 196
Brenn-Kraut 54
Brößlinge 86
Brombeer-Strauch 114
Bruch-Kraut 274
Brunn-Leber-Kraut 295
Brüßken 125
Brust-Beeren 109
Wurtz 109
Buch-Ampffer 101
Buche 264
Stein-Buche 265
Buhl-Kraut 272
Burtzel 95
Bux-Baum 264

C.

CAnarien-Saat 247
Capuzinerle 230
Cardebenedicten 152
Carven 227
Castanien Roß 285
Celeri 229
Centifolien 117
Chamillen 139
Christ-Wurtz 131
Christoph-Wurtz 75
Citronen-Baum 114
Kraut 187
Coriander 229
Creutz-Beer 74
Blümgen 204
Kraut 3
Cucumern 41
Cunrad 99
Cupreß 270
Cymbel-Kraut 197
Cyper-Graß 257
Cypreß Feld 178

D.

DEutsche Pimper-Nüsse 98

Deutscher Ingber 203
Dill 222
Diptam gemeiner 235
rechter 191
weisser 235
Distel
Frauen-Distel 150
Gänse-Distel 165
Lauff-Distel 222
Marien-Distel 150
Raden-Distel 222
Stern-Distel 149
Weh-Distel 150
Donner-Kraut 103
Näglein 94
Reeben 188
Dorant 196
weisser 140
Dorn
Indianischer Schleh-Dorn 18
Sauer-Dorn 25
Schwartz-Dorn 107
Weg-Dorn 74
Weiß-Dorn 109
Dort 254
Dosten 191
Wasser-Dost 154
Dotter 69
Dotter-Blum 106. 159
Dragoncell 158
Dragun 158
Dreck-Säck 112
Drey-Blat 17
Dreyfaltigkeits-Blum 233
Dürr-Wurtz 154

E.

EBer-Wurtz 172
Eckern 264
Buch-Eckern 264
Egel-Kraut 14
Ehren-Preiß 197
Eiben-Baum 271
Eiche 264
Stech-Eiche 36
Ein-Beer 74
Blatt 73
Eisen-Hart 191
Hütlein 234
Kraut 191
Eisopen 191
Elster-Baum 265
Eltz-Beer 109
Endivien 169
Engel-Blum 187
süß 279
Entian schwartzer 221
weisser 223
Entzig 223
Ephen 110
Eppich 230
Erbsel-Beeren 125
Erbsen
Pischel-Erbsen 209
Zucker-Erbsen 209
Erd-Beeren 86
Feigen 210
Kiefer 178
Nüsse 210
Pinn 178
Rauch 205
Schwamm 305
Erlen 265
Esche 269
Esch-Lauch 123

sels-Gurcken 41
Kürbiß 41
Milch 218
pe 268
er-Blum 159
ter-Nessel 263

F.

Ackel-Kraut 195
Färber-Baum 108
Röthe 34
Scharten 152
Wurtzel 34
l-Kraut 276
en
Krafft-Faren 279
Kein-Faren 157
Wein-Faren 110
Wurm-Faren 157
en-Kraut 276
Saamen 217
nen-Kraut 209
l Baum 34
-Bohnen 213
Wartzen-Kraut 127
en Indianische 133
-Cypreß 178
Kätzlein 157
Kümmel 189
Lattig 174
Quendel 189
Rosen 111
Rieß 12
244
el 224
u-Fenchel 222
sser-Fenchel 16

Fenich wilder 245
Fette-Henne 103
Feuer-Lilien 118
Fichten-Baum 270
Filipendul-Wurtz 129
Fingerhut 200
Fingerhut-Kraut 200
Flachs 105
Dotter 69
Kraut 197
Seide 22
Flieder-Baum 35
Fliedern 35
Fliegen-Schwamm 301
Flocken-Blum 147
Flöh-Kraut 69. 77. 78
Floramor 97
Fönchel 224
Fönich 244. 245
Forellen-Salat 167
Frauen-Haar 22
Schüchlein 217
Freisam-Kraut 193. 233
Frosch-Löffel Kraut 47
Fuchs-Schwantz 244
Fuchs-Schwantz-Graß 245
Fünff-Blatt 84
Finger-Kraut 184

G.

GAmanderlein 177
Gänse-Blum 138
Distel 165
Fuß 271
Kraut 85
Zunge 98

Gänserich 85
Gartenheil 158
Garten-Kresse 66
Gauchheil 15
Geiser-Wurtz 137
Geiß-Bart 81
Fuß 225
Raute 214
Gelb Creutz-Kraut 3
Gelbe Hornungs-Blum 26
Ritter-Spohren 230
Ruben 224
Violen 60
Wasser-Lilien 26
Gemeiner Diptam 235
Gemsen-Wurtz 141
Geniſt 215
Genſter 215
S. Georgen-Wurtz 193
Gerſch 225
Gerſten-Walch 254
Gicht-Baum 41
Roſen 130
Rübe 39
Glaß-Kraut 234
Schmaltz 310
Gleiß 229
Gliedeweich 217
Glitſch 194
Glöcklein 23. 131
Gneiß 229
Gold-Blume 81
Knöpffgen 195
Wurtz 56. 118
Görlein 228
Gottes-Gnade 200
Granat-Apffel-Baum 133
Graß
Eyer-Graß 257
Spaniſch-Graß 253
Vieper-Graß 167
Wege-Graß 77
Wilde-Manns-Graß 245
Graß-Blume 93
Grind-Kraut 154
Wurtz 45
Gritzel 228
Groß Miltz-Kraut 279
Groſſe Klette 152
Neſſel 263
Groſſer Huf-Lattig 153
Grundheil 15
Guckucks-Baum 93
Blume 238
Gülden-Klee 127
Wald-Meiſter 3
Güldner Wieder hon 278. 285
Wund-Kraut 145
Gundermann 188
Günſel 187
Güntzel 187
Gurcken 41
Eſels-Gurcken 41
Hunds-Gurcken 33
Gürtel-Kraut 280
Mooß 280
Guter Heinrich 272

H.

Haarſchar 280
Haarſtrang 222

Haber 244
Lattig 142
Pflaumen 106
Habichts-Kraut 160
Händel-Kraut 198
Schwamm 302
Hafer-Wurtz 167
Hage-Buchen 265
Dorn 109
Hahn-Hoden 74
Hahnen-Fuß 81
Kam 97. 194. 206
Kopff 206
Halb-Pferd 45
Halbe-Gäule 45
Halm-Rüblein 65
Hammels-Möhren 221
Hanff 263
Hanff-Männgen 192
Harn-Kraut 197. 274
Hart-Rieber 73
Riegel 73
Hartheu 99
Hasel-Nuß 265
Staude 265
Wurtz 49
Hasen-Fuß 207
Kohl 165
Oehrlein 226
Pappeln 226
Pfödgen 207
Haupt-Kraut 58
Haus-Lattich 132
Wurtz 132
Hayn-Büchen 265
Hechel-Kamm 223
Heck-Rosen 111
Hecken-Nüsse 265
Hederich 64
Heide 71. weisse 101
Heide-Korn wild 79
Heidel-Beer 39
Heiden-Bien-Kraut 101
Isop 95
Heidnisch Wund-Kr. 145
Heil aller Welt 15
Heiter-Nessel 263
Helck-Kraut 63
Herbst-Blume 28
Hermigen 139
Herum-Drath 240
Hertz-Gespan 184
Gesperr 184
Hetter-Nessel 263
Heu-Hechel 214
Himmel-Schlüssel 13
Stengel 16
Hind-Beeren 114
Läuffte 169
Hindsch-Kraut 36
Hiobs-Thränen 261
Hirsch-Brunst über der Erde 302
Hirsch-Brunst unter der Erde 305
Holder 33. 35
Horn-Baum 108
Mangold 7
Wurtz 221
Zunge 279
Hirsen
schwartzer Hirsen 224
Sprall-Hirsen 244
Stein-Hirsen 8

Hirsen
Wald-Hirsen 194
Wilder Hirsen 245
Hirten-Tasche 67
Hirtz-Brunst 305
Hohl-Beeren 114
Wurtz 217
Holder 35
Holler 35
Holtz-Apffel-Baum 113
Holunder 35
Spanis. Holunder 18
Hopffen 263
Hopffen-Klee 207
schwartzbrau-
ner 207
Hornungs-Blume 121
Huck auf die Magd 18
Huff-Lattig 142
grosser 153
Huhechel 214
Hunde-Seich 67
Hunds-Gurcken 33
Kopff 196
Petersilgen 229
Till 139
Violen 232
Zunge 9
Hüner-Biß 87
Darm 87
Hürrlitzgen-Baum 73
Hyacinth 28
Hynsch-Kraut 157

J.

Jacobs-Blum 142
Jehoras-Blümgen 36.
203
Jeßmin 33
wilder 71
Indianische Feigen 133
Kresse 230
Schleh-Dorn
18
Ingber, deutscher 203
Johanns-Beeren 40
Blum 141
Blut 76
Kraut 98
Träublein 40
Irr-Beeren 204
Isop 191
Heiden-Isop 95
Kirch-Isop 95
Jüden-Kirschen 38

K.

Kälber-Kern 228
Kropff 228
Kalbs-Nase 196
Kalmuß 261
Kanne-Kraut 282
Kappiß-Kraut 58
Karthen-Distel 175
Katzen-Klee 207
Kraut 191
Müntz 191
Pfodgen 156
Träuble 102
Wurtzel 173
Käysers-Crone 119
Salat 158
Kellershals 32
Keusch-Lamm 202
Kihn-Baum 270

Kinder-Mord 311
Kingerten 36
Kirsch-Baum 73
Kirschen
Jüden-Kirschen 38
saure Kirschen 107
schwartze, süsse Kirschen 108
Weichsel-Kirschen 107
Klapper-Rosen 56
Klatsch-Rosen 56
Kleb-Kraut 4
Lychnis 101
Klebrich 4
Klee
Bieber-Klee 17
Güldner Klee 127
Katzen-Klee 207
Sauer-Klee 101
Schnecken-Klee 214
schwartzer Hopffen-Klee
Siechel-Klee 207
Stein-Klee 208
Sumpff-Klee 17
ein Entian 16
Schildbesen-Kraut 68
iner Maßholder 129
tte 152. große ib.
ster-Beeren 40
aben-Kraut 103
ack-Beeren 86
blanch 122
achen-Knoblauch 177
Schlangen-Knoblauch 122
blauch-Kraut 61
Knoten-Kraut 196
Kohl-Raben 59
Rüben unter der Erde 59
Kolben 260
Körbel-Kern 228
Kraut 228
Korn 244
Heide-Korn 79
türckisch Korn 261
Korn-Blume 146
Körner-Baum 73
Krähen-Fuß 81
Kräutl. Patientia 45
Krafft-Faren 279
Wurtz 153
Krammet-Beeren-Staude 271
Kratz-Beeren 114
Krausemüntz 185
Krause Endivgen 169
Petersilien 229
Kraut-Holder 35
Krebs-Wurtz 78
Kreen 67
Kresse, braune 63
Garten-Kreß 66
Indianische 230
Winter-Kreß 63
Kröten-Balsam 185
Müntz 185
Till 139
Küchen-Schell 129
Küchern 210
Kuh-Weiden 193
Weitzen 193
Kuhmehlen 139

Kühn-Post 101
Kümmel
Feld-Kümmel 189
Kloß-Kümmel 226
Schwartz-Kümmel 131
Wiesen-Kümmel 227
wilder Kümmel 226
Kunigund-Kraut 154
Kürbiß 42

L.

Lab-Kraut 2
Lachen-Knoblauch 177
Lactucke 167
Lattig
Brand-Lattich 142
Feld-Lattich 174
Huff-Lattig 142
Lämmer-Lattig 174
wilder Lattig 167
Lavendel 190
wilder 178
Lauff-Distel 222
Leber-Kraut 127
Bruñ-Leber-Kraut 295
Edel-Leber-Kraut 127
Stein-Leber-Kraut 295
Stern-Leber-Kraut 4
Leichel 61
Lein 105
Lein-Dotter 69
Kraut 197
Leoparden-Wurtz 53
Leucojen-Stangen 60
Liebstöckel 225
Lien-Baum 54
Linnen 54
Lilien
Blaue Lilien 25
Feuer-Lilien 118
gelbe Wasser-Lilien 26
Schwertel-Lilien 25
Speck-Lilien 203
Wasser-Lilien 130
weisse Lilien 118
wilde Lilien 118
Limonen 114
Limonien 114
Linde 80
Linden-Baum 80
Linder-Marck 177
Linsen 209
Pfennig-Linsen 209
Linsen-Baum 215
Löffel-Kraut 65
Löwen-Fuß 51
Zahn 159
Lorbeer-Baum 73
Rosen 21
Lulch 245
Lungen-Kraut 7
Baum-Lungen-Kr. 297
Lupinen 213

M.

Mägde-Baum 311
Måler-Kraut 139
Mäuß-Dorn 125
Oehrlein 164
Schwantz 83
Mag-Saamen 55
gehöruter 56
Majoran 190
Winter Majoran 191

Mandel-Baum 107
Mangold 7
Manns-Treu 222
Marien-Distel 150
Flachs 247
Mantel 51
Müntz 157
Schüchlein 237
Maruncken 106
Maßholder kleiner 129
Maßlieben 138
Mauer-Raute 279
Pfeffer 102
Mayen-Blümlein 38
Medesüß 81
Meel-Fäßgen 109
Feistigen 109
Meer-Rettig 67
Meer-Zwiebel 121
Meiran 190
Meirich 87
Meister-Würtz 222
Meliloten 208
Melisse 187
Fremde Melisse 182
Türckische Melisse 182
Melonen 42
Melte 274. 275
Scheiß-Melte 272
Stinckende Melte 272
Wilde Melte 271
Merck 230
Wasser-Merck 230
Metz-Blume 121
Viole 232
Wurtz 89
Meteln 110
Metterich 139
Meyer 87
Meyer-Kraut 23
Miltz-Kraut 279
großes 279
Mistel 33
Mohn 55
Mohr-Rüben 224
Möhren 224
Pasternat-Möhren 221
Mönchs-Kappen 234
Kopff 159
Pfeffer 202
Mond-Kraut 280
Raute 280
Mooß-Beeren 74
Morcheln 302
Morgen-Stern 31
Motten-Kraut 101
Mund-Holtz 36
Rosen 111
Müntze
Bach-Müntze 185
Berg-Müntze 188
Kröten-Müntze 185
Muscateller-Kraut 179
Träublein 110
Wein 110
Mutter-Wurtz 141
Myrobalanen-Pflaumen 106
Myrten-Baum 114

N.

Nachtschatten 36
schwartzer 199
Wald-Nachtschatten 204
weisser 196

Nacht-Viol 61
Nackende Hure 28
Nadel-Körbel 223
Näglein-Baum 18
Nagel-Kraut 164
Narcissen 27
Narren-Kappen 234
Kolben 260
Natter-Wurtz 78. 167
Zunge 280
Nelcken 93
Cartheuser-Nelcken 94
Pech-Nelcken 101
Nessel brennende 263
große 263
heiter 263
römische 263
taube 181
todte 181
Neun-Krafft 153
Spitzen 271
Niederholder 35
Nieß-Wurtz schwartze 131
weisse 124
Nuß
Bambergis. Hasel-Nüsse 265
Blut-Nüsse 265
Heck-Nüsse 265
Pimper-Nüsse 98
Stachel-Nüsse 49
Wall-Nüsse 264
Wasser-Nüsse 49
Welsche Nüsse 264
Nüßgen-Salat 174

O.

Ochsen-Auge 136
Borche 214
Zunge 276
Odermennig 80
Oel-Rötzgen 131
Ohr-Löffel-Kraut 100
Orant 191
Oster-Blumen 129
Lucey 202

P.

Palmen 36
Pappeln 10
Roß-Pappeln 153
Papel-Baum
schwartzer 268
weisser 268
Zitter-Papeln 268
Papel-Weide weisse 268
Pasternack 221
Pasternat-Möhren 221
Paßions-Blum 134
Pech-Nelcken 101
Perlen-Kraut 76
Pestilentz-Wurtz 153
Peterlein 229
Wasser-Peterlein 229
Petersilgen-Wein-Stock 110
Petersilien 229
Hunds-Petersilien 229
krauße Petersilien 229
S. Peters-Kraut 274
Pfaffen-Hödlein 74. 127
Pfañe-Kuchen-Kraut 157
Pfeffer-Kraut 67
Mönchs-Pfeffer 262
Spanischer Pfeffer 37
Wasser-Pfeffer 78

Pfennig-Kraut 14. 66
Linsen 209
Pferde-Schwantz 281
Pferdts-Ampffer 45
Pferſich 107
Pferſing-Kraut 77
Pfingſt-Roſen 130
Pflaumen & ejus ſpec. 106
Pimper-Nüſſe 98
Pinat 262
Pinet 262
Pinn-Holtz 35
Piſchel-Erbſen 209
Piſir-Bohnen 213
Pley 185
wilder 188
Pmerantzen 113
Ponien 185
wilder 188
Prſt 221
Kraut 101
Ptulack 95
Pßlinge 86
Pußlinge 86
Puſſel-Beeren 39
Puelle 180

Q.

Quecken 250
Quendel 189
Quendel-Quendel 189
Quelchen 189
Quetſchen 106
Quitſch-Beeren 112
Quitten-Baum 112

R.

Raden 92
Raden-Diſtel 222
Radieß 57
Radießgen 57
Ramſel 122
Rapüntzgen 174
Raß-Wurtzel 39
Ratten-Schwantz 238
Raute 71
Geiß-Raute 214
Mauer-Raute 279
Mond-Raute 280
Wein-Raute 71
Wieſen-Raute 54
Wilde Raute 205
Rettig 57
Waſſer-Rettig 63
Rein-Faren 157
Weiden 268
Revier-Kraut 157
Riebels-Kraut 65
Riet 255
Rinds-Auge 136
Ringel-Blum 138
Ritter-Spohren 234
Roberts-Kraut 231
Rocken 244
Rohr 255
Römiſch Kohl 275
Römiſche Camillen 139
Neſſel 263
Roß-Caſtanien 235
Kümmel 226
Papeln 153

Roßmarin 189
wilder 101. 178
Rosen
Eßig-Rosen 111
Feld-Rosen 111
Heck-Rosen 111
Klapper-Rosen 56
Klatsch-Rosen 56
Mund-Rosen 11
Pfingst-Rosen 130
See-Rosen 130
Stock-Rosen 11
von Jericho 203
wilde Rosen 111
Rosen-Wurtz 72
Rothe Rüben 275
Tanne 270
Rother Kopff-Kohl 59
Steinbrech 129
Rüben
Gelbe Rüben 224
Mohr-Rüben 224
Steck-Rüben 65
Stieckel-Rüben 166
Weisse Rüben 224
Zaun-Rübe 39
Rübsen 65
Ruprechts-Kraut 231
Rüst-Baum 266
Rüster-Baum 266
Rütter-Spohren 230
Rüßken 125

S.

Säusam 52
Säu-Tod 271
Sade-Baum 311
wilder 283
Safflor 159
Saffran 26
Sage-Baum 311
Salat
Endivgen-Salat 169
Forellen-Salat 167
Käysers-Salat 158
Rößgen-Salat 174
Salbey 179
Creutz-Salbey 180
Wilde Salbey 179
Saltz-Kraut 310
Sammet-Blume 170
Sanickel 225
Saphier-Kraut 64
Saturey 189
Sau-Bohne 212
Distel 165
Fenchel 222
Kraut 36
Sauer-Ampffer 46
Dorn 125
Kirschen 107
Klee 101
Scabiosen 174
Schaben-Kraut 195
Schabzüger-Kraut 208
Schachtel-Halm 282
Schacht-Kraut 100
Schaff-Garbe 140
Rieppe 140
Schalotten 123
Scham-Kraut 272
Scharbeck 127
Scharbocks-Klee 17

Scharlach-Kraut 179
Scharten-Kraut 152
Scheiß-Melte 272
Schell-Kraut 56. 127
Schilff-Rohr 255
Schirling 229
Schlaff-Kraut 178
Schlag-Kräutlein 178
Schlangen-Knoblauch 122
Mord 167
Zunge 280
Schleh-Dorn, Indian. 18
Schlehen-Hecken 107
Schling-Baum 32. 108
Schnee-Glöcklein 121
Tropffen 121
Schlüssel-Blum 13
blaue 7
Schmaltz-Kraut 167
Schmergel 127
Schmertz-Wurtz 103
Schminck-Wurtz 177
Schmirgel 272
Schnecken-Klee 214
Schnee-Bälle 33
Schnitt-Lauch 123
Zwiebel 123
Schoten 209
Schuppen-Wurtz 63. 193
Schwalben-Wurtz 20
Schwamm
Erd-Schwamm 305
Liegen-Schwamm 301
Rindel-Schwamm 302
Tarfen-Schwamm 305
Schwartz-Dorn 107
Kümmel 131
Wurtz 6
Schwartze Nieß-W. 131
süsse Kirschen 108
Schwartzer Andorn 182
Entian 221
Hirsen 244
Nach-Schatte 36
Papel-Baum 268
Schwefel-Wurtz 228
Schwelcken 33
Schwertel 260
Schwertel-Lilien 25
Schwindel-Körner 229
See-Blume 130
Puppen 130
Rose 130
Seidel-Bast 32
Seiffen-Kraut 92
Sellerie 229
Senff 65
Thurm-Senff 61
Wege-Senff 65
Seven-Baum 311
Sichel-Klee 213. 225
Kraut 225
Sieben-Baum 311
Finger-Kraut 85
Geruch 208
Gezeit 208
Stunden 208
Siegmars-Wurtz 12
Silber-Blatt 70
Sinau 51
Sirenen 18
Sonnen-Blum 134
Drat 168

Sonnen-Günsel 95
Thau 90
Wendel 169
Spanisch Graß 253
Spanischer Holunder 18
Pfeffer 37
Spargel-Bohnen 216
Spargeln 126
Speck-Lilien 203
Speichel-Wurtz 137
Sperber-Baum 112
Speren-Stich 16
Spicanard 190
Spicant 279
Spick 190
Spierling 112
Spill-Baum 74
Spillinge 106
Spinat 262
Spindel-Baum 74
Spinetsch 262
Spinn-Blum 28
Sprall-Hirsen 244
Körner 219
Kraut 217
Stab-Wurtz wilde 158
Stachel-Beer 40. seq.
Kraut 214
Nüsse 49
Stall-Kraut 214
Stangen-Leucojen 60
Violen 60
Staudrich 273
Stechende Winde 126
Stech-Eiche 36
Körner 150
Palmen 36
Steck-Rübe 66
Stein-Brech weisser 98. 278
Büchen 265
Hirse 8
Klee 208
Leber-Kraut 295
Saame 8
Etern aus Bethlehem 120
Distel 149
Leber-Kraut 4
Stickel-Rüben 66
Stinckende Hure 272
Melte 272
Stock-Rose 11
Stoltzer Heinrich 272
Storch-Schnabel 103. 231
Storchs-Blum 128
Streich-Kraut 234
Stunden-Blum 170
Sumpff-Beeren 74
Klee 17
Süß-Holtz 217
wildes 279

T.

Täberich 254
Täschel-Kraut 67
Tag und Nacht 193
Tamarisken 95
Tanne rothe 270
weisse 270
Tartuffel 37
Taube Nessel 181
Tauben-Kraut 191
Kropff 205
Rock 282

Tausend-Blatt 140
Gülden-Kraut 17
Korn 274
Taxs-Baum 271
Teich-Kolben 260
Terpentin-Wurtz 53
Teuffels-Abbiß 175
Augen 127
Klau 280
Milch 218
Teutsche Pimper-Nüsse 982
Thurm-Kohl 61
Kraut 61
Senff 61
Thymian 189
Till 222
Toback, türckischer 19
Todte-Nessel 181
Todten-Beeren 204
Violen 21
Tollingen 130
Tolpelgens 108
Tormentill 53
Trameiner-Wein 110
Tranickel 225
Trauben-Krvut 273
Treib-Körner 213
Trespen 245
Truckel-Beer 39
Tuberosen 28
Türckisch Korn 261
Türckische Bohnen 213
Melisse 182
Veilgen 213
Türckischer Beyfuß 273
Bund 118
Toback 19

V.

VEh-Distel 150
Veilgen türckische 213
Vergieß mein nicht 7
Vieper-Graß 167
Viol
Gelbe Viol 60
Hunds-Viol 232
Mertz-Viol 232
Nacht Viol 61
Stangen-Viol 60
Todten-Viol 21
Ulm-Baum 266
Unholden-Kraut 21
Unkraut 262
Unser Frauen Bethstroh 2
Unser lieben Frauen Nachts-Mantel 51
Vogel-Kraut 87
Nest 224
Wicken 211

W.

WAcholder-Stäude 271
Wachtel-Weitzen 193
Wald-Hirse 194
Mangold 236
Meister 3. 4.
Nacht-Schatten 36
Rebe 54. 204
Stroh 2
Wall-Nuß 264
Wasser Betonien 196
Dost 154
Lilie 16
Männgen 130

Wasser-Merck 230
Nüsse 49
Peterlein 229
Pfeffer 78
Rettig 63
Wegerich 47
Weber-Karthen 175
Wege-Dorn 74
Graß 77
Wege-Breit 69
Senff 65
Tritt 77
Wart 169
Wegericht & ejus spec. 69
Weichsel-Kirschen 107
Weid 50
Weide 266
Pappel-Weide 268
Weisse Weide 268
Weiderich brauner 118
Rößlein 29
Wein-Faren 157
Fränckischer & rel. spec. 110
Raute 71
Weiß-Wurtz 38
Weisse Heidel-Beer 39
Hind-Beer 115
Lilie 118
Nieß-Wurtz 124
Papel-Weide 268
Rieben 224
Tanne 270
Wiederthon 124
Zippeln 123
Zwiebeln 123
Weisser Andorn 187
Bertram 140
Weisser Diptam 235
Dorant 140
Entzian 223
Entzig 223
Nacht-Schatten 196
Pappel-Baum 268
Steinbrech 98
Weitzen
Buch-Weitzen 79
Dünckel-Weitzen 243
Kroll-Weitzen 243
Kuch-Weitzen 243
Sommer-Weitzen 243
Winter-Weitzen 243
Well-Kraut 195
Saamen 64
Welsche Nuß 264
Welscher Kirsch-Baum 73
Wermuth 159
Wetscherlewetsch 225
Wetter-Rößlein 31
Weyrauch 269
Wicken & ejus spec. 211
Wiederstoß 100
Wieder-Thon, gülden 278 285
weisser 124
Wieder-Tod 278
Wiesen-Blum 105
Geld 14
Klee 206
Kohl 153
Kümmel 227
Raute 54
Zeitlosen 28
Wild Heiden-Korn 79
Manns-Graß 245

Wild

ild Süß-Holtz 217. 279
ilde Cucumern 41
Lilie 118
Melte 271
Ochsen-Zunge 176
Salbey 179
Stab-Wurtz 158
lder-Apffel-Baum 113
Birn-Baum 113
Fenich 245
Hirse 245
Jeßmin 71
Kümmel 226
Lattig 167
Lavendel 178
Lilie 118
Möhren-Saamen 224
Poley 188
Raute 205
Rhebarber 45
Roßmarin 101. 178
Sade-Baum 283
Sperber-Baum 112
nd-Rößlein 128
nde, große 22
nter-Grün 21. 236
Kresse 63
Majoran 21
Zwiebeln 123
bel-Dosten 188
sching 59
schen 215
hlgemuth 191
lfs-Beer 74
Fuß 184
Klauen 280
Wolffs-Milch 218
Trapp 184
Wurtz 234
Woll-Kraut 226
Wuhl-Kraut 272
Wund-Kraut gülden 145
heidnisch 145
Wurm-Faren 157
Saamen 157
Wüterich 229

Z.

Zahn-Kraut 63
Wurtz 137
Zatrey 189
Zaun-Gilge 202
Rübe 39
Zehr-Wurtz 203
Zeißgen-Kraut 187
Zeitlosen 28
Ziegen-Bart 302
Zippeln weisse 123
Zitter-Papeln 268
Wurtzel 45
Zucker-Birn 113
Erbsen 209
Wurtz 228
Zunder oder Schwam 305
Zwerg-Bäume 113
Zwetschen 106
Zwey-Blatt 238
Zwiebel 123
Schnitt-Zwiebel 123
Weisse Zwiebel 123
Winter-Zwiebel 123

INDEX PLANTARVM FLORENDI TEMPORA DOCENS.

FEBRVARIVS.

NArciſſus major, *multiplex.* Leucojum hortenſe. Aconitum Helleborus nig. ang. *hortenſis.* Helleboraſter. Corylus ſativa fr. alb. *rotundo*, oblongo. *ſilv. ſive vulgaris.* Lichen arbor. ſ. pulmonar. *ampliſſimus.*

MARTIVS.

Pulmonaria fol. non macul. *fl. albo* Omphalodes pumila verna. Primula veris maj. *hortenſ.* conſtant. Auricula urſ. fl. lut. *purpur.* Primula pratenſ. Vinca Riv. & ejus ſpecies. Crocus vern. ang. *latifol.* latifol. flav. Hyacinthus Orientalis, Laureola & ejus ſpecies. Viſcum bacc. alb. Alyſſum vulgare *fol. veron.* ſeget. fol. auric. *elatius* Cornus vulgar. *ſylveſtris.* Quinquefol. minus. Cyperella nemorenſ. Ornithogal. luteum *anguſt. bulboſ.* lut. maj. Leucojum ſylvatic. Hepatica fl. ſimpl. cœrul. *ſub purpureo*, argenteo, *pleno cœruleo* purpureo Nemoroſa fl. roſ. *purpur*, minore Pulſatilla fol. craſſ. Aconitum Holleborus nig. ang. *hortenſis.* Tuſſiligo offic. Split rad. tot. cava, *non cava.* Viola offic. *mart. inodora*, inod. ſylv. *alba*, multiplex. Buxus arboreſcens. Populus alba, *nigra*, Fraxin. excelſſ. Cupreſſ. meta infaſtig. *ram. extra ſe ſparg.* Thya, juniperus vulg. Taxus, Muſcus apocarp. ſaxat. brev. *terreſtr.* Muſcus capillac. minim. *med.* minor, *min. cal. long.* maj. *fol. rot.* lanugin. Muſcus coronat. Muſcus argent. Muſcus terreſtr. vulgat. Fungoides alpin. *arborenſe*, turbinatum. Ceteræ muſcorum lichenumque ſpecies primo Vere, æſtate & autumno vigent.

APRI-

APRILIS.

Pulmonaria anguſtifol. *fl. cæruleo* Myoſotis ſylvatica rec. *minor. arvenſ.* Gentianella alpina verna, Chamæiris ſat. viol. *minor*, Muſcari minus, Aſarum offic. Chryſoplen. Spergula unicaul. Keiri lut. max. *magn.* vulgar. *pleno* purpureum, *ſylveſtre* Heſperis hort. Bauh *fl. vir.* Turritis vulgar. Cardamine pratenſ. *ſylv. hirſ.* Napus ſylveſtr. Thlaſpi arv. & ejus ſpecies Cochlear. fol. ſubrotund. Burſa paſt. naj. *major*, eleg. fol. *media*, Ranuncul. nemer. *aſphod. rad.* Quinquefol. min. *anguſtif.* Alſine hirſuta magn. fl. *vaſe.* long. Arenaria verna, *fug.* teretifol. Saxifraga rot. *verna* Acetoſella vulg. Caltha pal. fl. ſimpl. Caltha flore pleno. Prunus ſylv. *præcox.* Armenica fr. major. Perſica molli carne, *africana*, Amygdal. ſativ. Cyperella cap. pſyllii, *latifolia* Fritillaria præcox, Dens canis, Ornithog. anguſtifol. *lut. min.* Adonis mont. perenn. Ficaria vulg. Dens leon. lat. fol. *ampl. fol.* ang. fol. *fol. min.* Lamium fol. oblongo, *vulgare* alba lin. notat. Squamaria, Veronica fol. rutæ, *cymbal.* chamædr. *floſc.* Orobus ſylvat. purp. vern. Split. rad. rot. cava, *non cava.* Thlaſpid. alpinum, *arvenſe*, Eſula offic. *degener*, Geranium cicutæ folio, Viola mart. & ejus ſpecies Orchis fœtida ſylv. præcox, *palmata ſamb. odore*, Gramen anthoxanth. *ſpicat. glum. var.* paniculat. minim. Cyperoides latifol. *nigro-lut. maj.* nigro-lut. min. *ſpicis variis* Mercurialis montana, Carpinus, Alnus rot. fol. *alpin. min.* Ulmus camp. *fol. latiſſ.* Salix vulg. alba, *vulg. nig.* vulg. rub. *ſativa lut. fol. amygd. utr. vir.* fol. amygd. utr. aurit. *fol. longiſſ.* humil. ang. *humil. cap. ſquam.* hum. latifol. *fragilis*, mont. maj. *ſubrot. arg. fol.* latifol. rep. *roundifol. rot.* fol. ex rotund. acum. platyphyllos, Fraxinus excelſ. Morus fr. nigro, *albo.* Lycopodium offic. *alt. fol. junip.* Equiſetum pal. long. ſet. *ſylvat. ten. ſet.* arvenſe long. ſet. Selago fol. & facie abiet. Muſcus apocarpos ſaxat. *apocarp. ſylveſtris*, acaul. *minim. cal. long.* Moſchatellina Tournefort. Groſſularia vulgatiſſ. *hortenſis* cum reliqv. ſpec.

MAJUS.

Gallium alb. latif. *montan. altiſſ.* Aparine vulgaris. *ſem. coriandr.* Aſperula ſylvatica, Conſolida Riv. Myoſotis pal. maj. *fl. albo* Lithoſpermum min. rep. *maj. erect.* Bugloſſum anguſtif. maj. *latif.* Cynogloſſ. maj. vulg. Omphalodes Tournef. Anagallis fl. phœn. *fl. cœrul.* Menyanthes, Apium criſpum Arum polyphyll. Riv. Bulbonac rad. red. Bupleur. min. Fab. Col. Boletus. Cyperella ſylv. & ſaxat. Fraxinella Polygonatum ſpic. fertile. Pinguicula Geſneri Pſeudo-acacia vulg. Parietaria min. Prunus myrobalanus. Thora major. Camerar. Thalictrum majus flav. *alpin.* majus ſiliqv. Tunica Sileſiaca fl. maj. *ſinenſ. fl. ſimpl.* Vicia anguſtif. *minima*, ſylv. lut. Vaccinum fol. obl. cren. Xyphium. Acacia indica, farneſ. Syringa fl. cœrul. maj. *maj. fl. albo* linguſtri fol. *lacin. fol.* Apocynum æthiopic. fruteſc. Vincetoxicum maritim. *frut. fol. ſubrot.* Polemonium fl. cœrul. Iris vulg. germ. *lutea ſativa* lutea variegata, *pratenſ. anguſt.* graminea, *tenuifol.* paluſtr. bulb. *bulboſa* Narciſſus fl. ſimpl. *juncifol.* Lilio-narciſſus. Lilio-aſphodelus phœn. *lut.* Hyacinth. indic. Muſcari Cluſii, *nemorenſe*, pannic. monſtr. Viburnum Matth. Tinus prior. Opulus Ruellii, *fl. globoſo.* Frangula Dodonæi, *polycarpos* Lilium convall. offic. *fl. rub.* Polygonatum latifol. vulg. *latif. fl. maj.* latifol. fl. dupl. *anguſtif. non ramoſ.* Vaccinium Riv. *fol. buxi*, altiſſim. *fol. oblongis.* Bryonia nigra. Acetoſa arboreſc. Tradeſcantia, Chamelæa tricocc. Claſtum ſ. *Iſatis ſylveſtris*, Alchymilla vulgar. Potamogeton rotund. *alpin.* fol. criſp. Chelidonium, Raphan. minor Braſſica capit. alb. *capit. rubr.* Braſſica alba, *alba vel virid.* gangylod. *fimbriata* ſeleneſ. lat. *ſeleneſ. ang.* cauliſl. *arvenſis*, campeſtris, *alpina* rad. napi. Keiri inc. maj. *inc. maj. coccin.* incan. min. *purpur.* fl. albo, *plen. ſerrug.* maj. fl. pl. ex purp. Heſperis montana Alliaria Matth. Turritis fol. cichor. *hirſuta* Cardamine annua, *fl. maj.* Dentaria heptaphyll. Syſimbr. erucæ fol. glab. min. *erucæ fol. fl. lut.* erucæ fol. glabro, fl. pleno. Accipitrina Riv. Eruca arvenſis Thlaſpi vulgat. Coronopus Ruelli. Alyſſum incan. lut. ſerp. maj. *incan. lut. ſerp. fol. min.* Bulbonac ann. *annum ſiliq. rot. fl. albo* Philadelpus Roſea Riv. *fl. pleno.* Oſſea, Laurus

is latifol. *vulg.* vulgaris fol. undulato. Unifolium Evonymus vulg. Cervi ſpina, Paris, Oxycoccus, Chriſtophoriana, Chamæſyris, Cotinus, Tilia, fœmina, *fol. min. montan. max.* Chrymopogon. Ranunculus nemoroſus, *pratenſ. rep.* pratenſ. erect. *prat. rad. vertic.* montan. *paluſtris*, arvenſis, *aquat. cotyl.* aquatic. capill. *aquatic. fol. rot.* aquatilis, *longifolius*, paluſtr. ſerrat. *hortenſis*, aſphod. rad. fl. ſang. *aſphod. rad. fl. ſulph.* Quinquefol. min. rep. lut. *min. rep. lanugin.* fol. atgent. Pentaphylloid. ſup. *argent.* rectum, Fragaria vulg. *fr. albo*, fr. parvi prun. Caryophillata vulgar. *aquatica.* Alſine montana, *prat. gram. fol. ampl.* longifolia, *pal. gram. fol.* linifol. magn. fl. *nemor. fol. ſtrictiſſ.* Arenaria teretifolia, *plantag. folio.* Lychnis pratenſis Tunica ſupina fl. pl. min. *ſupin. fl. pl. incarn.* ſylveſt. vulg. Helianthemum vulgare fl. lut. *annuum*, fol. plantag. Cameraria. Geum rotundifol. *fol. ſubrot.* Saxifraga rot. *verna*, muſcoſa, *ſedifol.* Staphylodendron Muſcipula pratenſ. *biſpan.* Ciſtus rot. fol. Ledum roſmar. Acetoſella fl. lut. Spiræa hyperici fol. Prunus ſativ. *fructu maj.* fructu min. *fructu max.* fructu parvo, Armeniaca, Amygd. ſativa, Ceraſus ſat. fr. rot. *fr. maj.* fr. albo, *fr. acido*, maj. ſylveſtris, *racemoſa* hortenſis, *pumila* Padus germ. *exotic.* Paliurus, Oxyacantha. Vitis lacin. *vinif.* ſubhirſuta, *baccis violaceis*, *apiana alpina.* Meſpilus germ. Roſa rubra, *ſatur. rub.* purpur. *verſicolor*, maxima, *alba vulgar.* Cratægus fol. lacin. Aucuparia, *alpin. alniſol.* Cydonia, Pyrus ſylveſtr. Malus ſylveſtr. *mala ſylveſtria*, Cacubalus, Rubus vulgaris, *idæus*, alpin. *odorat.* repens, Cyperella altiſſima, *ſerotina*, Martagon ſylvaticum, orientale, Corona imperialis, *fl. pulchre luteo.* Tulipa præcox, Ornithogalum medium, *anguſtifol.* luſitanicum latif. fl. cœrul. *luſitan. latif. fl. albo*, fl. cœrul. Leucojum ſerotin. Moly latif. fl. albo, *pyrenaicum*, ſylvaticum, Aſphodelus luteus Phalangium, Berberis, Ruſcus officinar. *latifolius*, anguſtifolius, Smilax aſpera, *lævis*, Anemone ſylveſtr. *tenuifol.* Acer montan. *platanoid.* campeſtre, Pœonia fol. nigric. *fœmina*, Aſteriſcus fl. nutante, Chamæmelum nobile, Doronicum, Jocobæa montana, *maritima*, Cyanus montan. Cirſium ſingul. capit. Elichryſum ſpicat. *montan.* Hieracium narbonenſe, *majus.*

dent. leon. fol. fl. ſuave rub. Hieracii aſp. ſpecies, Hieracium luteum, *alpinum* Valeriana pal. min. *aquat.* arvenſis *ſerotina.* Globularia. Echioides fl. albo, Ajuga fol. integris, Lamium fol. oblongo, *vulgare* Galeopſis ſ. urtica iners, Bugula Dodonæi, *montana*, Meliſſophyllum, Calamintha, Chamæciſus, *fl. purpureo*, Serpillum vulgare, Orobauche *maj.* Criſta Galli maj. *humilior*, Scrophularia fol. urticæ, *ſambuci fol.* Cymbalaria, Veronica ſupina, *minor*, ſpicata anguſtif. floſcul. caul. adhær. *ſpicata*, pratenſis. Ariſtolochia rotunda, cretica, Periclymenum vulg. perfoliat. Xyloſteum, *fol. ceraſi*, fl. nigro, *alpin*, *fol. alni*, Arum vulgare, *maculatum*, maximum, Polygala maj. cœrul, *vulgar.* major, Orobus ſylv. purp. Lathyrus pratenſis, *pal.* ſiliqua hirſ. *fol. pinn.* Vicia dumetorum, Pſeudo acacia, Geniſta juncea, Ferrum equinum comoſ. Lotus tetragonolobus, *fruticoſ. ang.* Eſula Rivini, *dulcis*, Caucalis chærephyll. Sanicula, Podagraria, Aſtrantia. Myrrhis annua, *perenn.* fœtens, *paluſtris* Cerefol. offic. *ſylveſtre* Cynapium, Apium hortenſe, Pimpinella ſax. maj. umbell. *ſax. maj. alc.* Geranium Robert. *lucidum* cicutæ fol. *cretium africanum.* Viola Alpin. Napellus fl. luteo, Fraxinella, Hypocaſtanum, Calceolus, Damaſonium, *fl. rubra*, Helleborine recent. *Rivini*, anguſtifol. *altera*, Ophrys, Nidus avis, Orchis maſcula, *militaris major*, ſpica conglobata. *odore hirci breu. odore hirci minor*, morio mas, *morio fol. ſeſſilibus* fucum referens, Satyrium, Palmata anguſtif. Orchis palmata ſamb. odore, Orobanche ſpuria, Gramen anthoxanth. *ſpicatum*, panicul. minimum, *ſylvaticum pan. mil.* Cyperoides latifol. *polyſtach. flav.* ſpica parva, *ſylvar.* paluſtre, ſpica pendula Carex maj. *ſpic. comp.* ſpic. min. comp. *nemoroſ.* polycephalos, Typha paluſtr. Spinacia vulg. capſ. acul. *vulg. capſ. non aculeata.* Fagus Quercus, Nux juglans, Carpinus, Betula Abies fœmina, *taxi folio*, tenui folio. Pinus ſylveſtr. Morus fructu albo, chenopodium fol. triang. Parietaria, Ophioglooſſum vulgat. Equiſetum ſylvat. *paluſtre breu.* paluſtre min. *fol. nud.* Moſchatellina, Rubus alpinus *nigr. dict.*

JVNIVS.

Mirabilis Rivini, Gallium alb latifol. sylvatic. *album la-pratense*, album supinum, Androsace Tournef. Alchylla alp. Acorum legit. A[illegible]sarum Riv. Cuscuta min. & maj. bago, Helianth. fl. macul. Juncus nemoros. fol. artic. Peraria angustif. Rapa sativa rot. Scirpus equiset. cap. crass. [illegible]pa sectilis. Cytisus latif. Cracca sylv. rotundif. Capnoi[illegible]s Tourn. Osmunda maj. & pal. Pyrolæ species, Tribuloi[illegible]s Tourn. Toxicodendron. Asperula lævior, *quadrifolia* [illegible]*lustr.* alpina quadrif. *cærulea arv.* hexaphyll. purp. Rubeo[illegible], Cerinthe minor, Asperugo Tourn. Lappula Rivini, Borago officinar Malva sylv. fol. rot. *sylv. fol. sinuat.* mauitiana, *crispa* s. lacin. arborea, *rosea fol. subrot.* rosea [illegible]ol. subrot. fl. pleno, Nummularia supina & off. Anagallis [illegible]l. phœniceo, *fl. cæruleo*, lutea nemor, *spuria s. minim.* Glau[illegible]coides maritima, Myriophyllum Rivini. Plantaginella, Syringa lacin. fol. Apocynum erect. in canum. *erect. latifol.* Vincetoxicum, *fl. nigricante*, volubile fol. acut. Nerion indicum angust. *florib. rubesc.* Convolvulus major, *lusitanicus*, Orientalis, Campanula vulgat. *pyramidata*, pratensis, *media*, hortensis *persicæ folio*, nemorosa, *rad. esculenta* minor. Polemon. fl. cœruleo, Hyacinthus indicus. Muscari nemorense, Onagra, Chamænerion altissim. *palustr.* glabr. latif. maj. *glabr. latif. minus*, palustr. hirs. mag. *pal. hirs. parvo flore*, Ketmia Syrorum, *ægyptiac.* Bammia Riv. Abutilon, Jasminum vulg. *hispan.* s. Gelsemin. *luteum*, indicum. Rubia tinctorum, Alaternus, Sambucus fructu nigr. *fructu viridi*, humilis, fol. laciniat. Aquifolium Ligustrum. Solanum. officin. acin. nigr. *offic. acin. luteis*, scandens s. dulcamara, *scand. fl. albo*, scand. fol. variegatis, Capsicum siliq. longis, Alkekengi Tourn. *fol. chenopod.* fol. stramonei, *indicum. maj.* Vaccinium altiss. Bryonia nigra, Lapathum fol. acut. plano, *fol. acuto crispo*, fol. acuto rubente, *minimum*, sylvestre, *maximum*, aquaticum, *exoticum*, fol. ampl. Acetosa pratensis, *fol. crisp.* hispanica, *arvensis*, americana, *rotundifolia*, Triglochim Riv. Alisma Riv. *angustifolium*, Sagitta aquatica major, *aquatica min. latifol.* aquatica min. angustifol. Tradescantia, Isatis sylv. Plantago angustif. maj. *angustif.*

guſtiſ. min. Rapiſtrum arvenſe, Alchymilla montana, Potamogeton rot. *alpinum*, anguſtifolium, *puſillum*, Flammula Dod. *ſurrecta*, ſepium fol. integris, *ſepium fol. dentatis*, panonica, Clematis fl. ſimpl. *purpurea*, Thalictrum pratenſe, *montanum*, Papaver. erratic. maj. *erratic. pleno flore*, erraticum minus. *erratic. capite long.* Glaucium fl. luteo, Raphaniſtrum ſegetum, *ſiliq. artic.* Spergula perennis, *graminea*, Braſſica campeſtris, Heſperis montana, Syſimbrium aquatic. *paluſtre*, Eruca arvenſis, *rapifolio*, Sinapi alb. Rapa ſativa oblonga, *ſativa rotunda*, Thlaſpi vulgat. *roſa de jericho*. Naſturtium hortenſe vulgat. *latifol.* hortenſe criſpum, Iberis Matthioli, Coronopus Ruellii, Armoracia Riv. Lepidium latifol. Alyſſum incanum luteum ſerp. fol. maj. *incan. lut. ſerp. fol. min.* ſegetum, Ruta hortenſis latifol. *hortenſ. altera* Erica vulg. fl. alb. *vulg. fl. purpur.* Roſea Rivini, Limonium maritimum, Statice, Lynoſyris, Knawel, Polygonum latifolium, *oblongum* breve, Perſicaria Orientalis, *mitis mac.* mitis non mac. *mitis cum mac. ferr.* urens, *minor*, ſalic. folio, *paluſtris*, Fagopyrum vulg. Tilia fœmina, *fol. min.* Drymopogon, Ulmaria, Ranunculus prat. erectus, dul. *prat. repens*, prat. erect. acris, *prat. rad. verticill.* paluſtr. apii folio, *paluſtris ſerratus*, arvenſis, *aquaticus*, aquatilis, *longifol. pal. major*, longifol. pal. minor, *hortenſis*, aſphod. rad. fl. ſanguineo, *aſphod. rad. fl. ſubphœniceo*, Quinquefolium lup. folio, *fol. argenteo*, rectum, Pentaphylloides ſupinum, *argenteum*, paluſtre, *rectum*, Caryophyllata vulgaris, Alſine altiſſima *media*, pratenſis gr. fol. anguſt. *longifolia*, Arenaria campeſtris, *plantaginis folio*, Rorella, vulgaris. Lychnis hirſuta fl. coccineo, major, *hirſuta fl. incarnato maj.* coronaria, *ſylv. alba ſimplex*, alba multiplex, *ſylv. ſive aquatica*, purpurea, *ſegetum major* ſegetum rubra, *notiflora*, ſylveſtris *ſ. ſaponaria fl. pleno*, pratenſis, Tunica ſupina fl. pleno minore, *ſupina fl. pl. incarnato*, latifolia, *ſylveſtris vulgaris*, ſylv. faſciculatis floribus, Tamariſcus, Portulaca latifolio, Cameraria, Geum rotundum, Saxifraga muſcoſa, *ſedi folio*, Staphylodendron, Hypericum vulgare, *villoſum*, eleganti folio, *minus, erect.* Muſcipula pratenſis, *montana*, hiſpanica, Viſcaria Riv. Ciſtus fol. ſalviæ, *rotundifolius*. Ledum roſmarini folio,

Sedum

Sedum min. teretifol. alb. *luteum fol. acuto*, minimum lut. non acre, *paluſt. ſubhirſutum*, Fabaria officinarum, Spiræa ſalicis folio, Linum ſativum latif. african. Paliurus Dodonæi, Vitis lacin. fol. *vinifera*, ſubhirſuta, *baccis violaceis*, a. piana, Azederach, Roſa rubra ſimplex, *ſaturat. rubens*, purpurea, verſicolor, *maxima multiplex*, alba vulg. maj. *ſylveſtris var. colorum*, ſylveſtr. pomifera major, *campeſtris ſpinoſiſſima fl. albo*, lutea ſimplex, *lutea multiplex*, punicea, Cratægus fol. laciniato, Aucuparia Riv. Cydonia fr. breviore, Cacubalus, Rubus vulgar. ſ. fructu nigro, *odoratus*, repens fr. ceſio, Cyperella ſerotina fl. albic. Juncus lævis panicula ſparſa maj. *panic. non ſparſa*, paluſtr. humilior, *pratenſis humillimus*, fol. articulatis fl. umbellat. 1. 2. *parvus* cum pericarp. rot. *nemoroſ. fol. articul.* Lilium album vulg. *purpuro-croceum*, Martagon ſylvaticum, *orientale fl. miniato*, Ornithogalum luſitan. latif. fl. cœrul. *luſit. latif. fl. albo*, Moly alpin. caule mac. Allium ſativum, *ſativ. alterum*, ſylveſtre, campeſtre, *ſylveſtre bulbif.* ſylv. capitat. Porrum rad. granulata, *ſectivum* Cepa bicornis tenuifolia, *vulgaris fl. & tun. purp.* vulg. fl. & tun. candidis, *oblonga*. Phalangium fl. majore, *parvo flore*, narbonenſe, Berberis offic. Adonis arv. fl. phœn. *Ochroleuco*, Filipend. offic. Nymphæa lut. maj. *alba maj.* Trollius, Nigella arvenſ. corn. *cretica latifolia*, fl. maj. pl. cœrul. Aquilegia ſylv. *hortenſis*. Ficoides afr. proc. *africana erecta*, peregrina procumb. Sempervivum tectorum maj. *minus* Punica quæ mal. granat. *fl. pleno majore*, Opuntia, *maxima fol. ſpinoſo*, fol. ſpin. longiſſ. Leucanthemum vulgare, *vulg. caule virid.* ſylvatic. tanaceti folio, *fruteſc.* Aſteriſcus ann. fol. ad fl. rigid. Chamæmelum vulg. Millefolium purp. majus, *fl. luteo* Ptarmica vulg. fol. oblong. ſerrato, *pleno flore*, lutea ſuaveolens, Doronicum offic. Arnica Schrœderi, Jacobæa vulg. lacin. *altiſſ. fol. erucæ*, paluſtr. altiſſima, *ſenecion. fol. incano*, viſcoſa & hirſuta, *maritima*, pal. altiſſ. ſuaveol. fol. integr. *paluſt. altiſſ. ſuaveol. fol. diſſec.* After luteus hirſ. ſalic. fol. Cyanus florid. odor. turcic. ſ. orient. maj. *florid. odor. turcic. ſ. orient. maj. fl. albo*, 2. fl. lut. *ſegetum fl. cœrul.* ſeget. fl. albo, *hortenſ. fl. incarnato* 2. fl. rubro, 3. *purpureo* hortenſ. diſco purpureo, *immaculat.*

maculat. cand. purpuraſc. fl. *dilute jantbino*, jacea vulg. lacin. fl. purp. *fol. cichor.* candicantibus foliis, *fol. eruca lanugin.* Crupina belgar. Calcitrapa, Card. lanceatus latifol. *lanceat. latif. fl. albo*, nutans, *acanthoides*, albis macul. notat. Cinara hortenſ. fol. non acuſeat. *aculeata*, Cirſium fingul. capit. parv. *arvenſe ſonchi folio* pratenſe polycephalon, Lappa ſ. bardana offic. *ſ. bardana maj. fl. albo*, major montana, Cnicus ſylv. hirſut. *pratenſ. acanthi folio*, prat. humilior, fl. purp. Petaſites maj. & vulg. Eupatorium cannabinum, *novæ angliæ urt.* novæ angliæ bæton. Conyza maj. vulgaris, *linariæ folio*, Elichryſum, ſ. ſtœchas citr. ang. *ſ. Stœch. citr. latif.* ſpicatum, *annuum fl. conglob.* Filago ſ. impia, *vulg. fl. per. caul. ſparſ.* altera, *minor*, paluſtr. cap. nigr. Tanacetum fol. criſpis, hortenſe fol. & od. menthæ, Abſinthium pontic. ſ. roman. offic. *pontic. tenuifol.* arboreſcens, Echinopus maj. Hieracium narbonenſe caul. aphyll. *maj. creticum*, dent. leon. folio, *amygd amar. olens*, dent. leon. fol. Monoclonon, *aſperum maj. fl.* latifol. glabr. *min. dent. leon. fol.* luteum hirſutum, *latifol. præmorſa rad.* alpin. latif. *mororum fol. piloſiſſ.* muror. laciniat. Piloſella montana, hiſpida, *peregrina fl. ſat. croc* officinarum, Sonchus aſper, *aſper arboreſc.* aſper laciniatus, *tingitanus papab. fol.* æthiopic. perianth. membr. *lævis laciniatus, latifol.* læv. lacin. ff. ſulphureo, *læv. minor*, min. fol. integro, Chondrilla cœrulea, *juncea viſcoſa*, ſonchi folio fl. purpuraſc. maj. Lactuca ſativa *ſyl. coſta ſpinoſa*, ſylv. odore viroſo, Scorzonera latifolia ſinuata, *latif. altera*, anguſtifolia altera, *latif. humilis*, laciniatis foliis, Tragopogon pratenſe, *purpuro-cæruleum* Cichorium latifol. *eriſpum*, Lampſana Dodon. Rhagadiolus alter, Hyoſeris latifolia, Stœbe Rivini, *flore pleno var. color.* Valeriana maj. *ſylveſtris major*, paluſtris major, *fol. calcitrapæ*, Phu fol. glaſti, *fol. anguſtiore.* Scabioſa pratenſis hirſuta, *prat. fl. albo*, Echium vulgare, Echioides flore pullo, Chamædrys minor repens, min rep. fl. albo Teucrium Bæticum, Iva moſchata, Marum Cortuſi, Horminum coma purp. viol. *ſylveſtre latifolium*, ſalvifol. min. Sclarea vulg. lanuginoſa, *pratenſ. fol. ſerrat.* prat. fol. ſerr. fl. ſuave rub. *prat. fol. ſerr. fl. albo* Salvia major an Sphacel. *maj. fol. verſic-* maj. ex lut.

&

& viridi var. *altera pereleg.* latifolia ſerrata, Caſſida paluſtr. Galeopſis procerior fœtida, *paluſtr. beton.* Pſeudo-dictamnus acet. mol. Menthaſtrum fol. rugoſo, *ſpicat. fol. criſpo*, ſpicat. fol. long. Mentha ſylv. long. *rotundifolia* pal. rotundifol. criſpa, arvenſis verticill. Pulegium latifol. *anguſtifol.* Marrubiaſtrum ſiderit. fol. cardiac. fol. Marrubium alp. Meliſſa hortenſis, Clinopod. orig. ſimile. Acinos Rivini. Roſmarinus hort. ang. fol. *hort. ang. fol. argent.* ſpontaneus, *folio variegato* Thymus vulg. Serpill. vulg. maj. *vulgare minus*, citratum, Origanum ſylv. Scrophularia fol. urticæ, Veronica offic. *ſupina*, Digitalis purp. *lutea*, Gratiola offic. Hyoſcyamus alb. min. Camara Riv. Belladonna maj. fol. & florib. Trifolium lagopoides, *montanum purp.* Lupulinum Riv. *minimum*, montanum *glomerulis obl.* aſphaltit. Pſeudo-Glycyrrhiza, Orobus ſylv. oblong. Impatiens Riv. Eſula pal. Riv. *fol. amygdali*, Fœniculum vulg. *dulce* Bupleurum fol. rigido, *fol. ſubrot.* arboreſcens. Carum Rivini, Myrrhis latifol. Pimpinella ſaxifraga maj. umb. *ſaxif. maj. altera*, Orchis palmata, paluſtr. Vitex, Gramen ſecalinum majus, *ſpicatum ariſtis pennatis.* ſpicat. glum. criſtatis, *ſpicat. ſpica cylindracea*, dactylon anguſtif. *paniculatum proliferum*, avenaceum panic. ſparſa, *aven. locuſt. villoſ.* aven. arvenſe Cyperoides polyſtach. Filix ramoſa minor, Lunaria *racemoſa*.

JVLIVS.

Cruciata hirſuta Aſperula lævior acut. *alpina quadrif.* cœrul. arvenſis, *hexaphyllos purp.* Malva montana moll. *fruteſc. fol. rot.* ſylveſtr. altiſſ. *paluſtr. moll. & incan.* Nummularia erecta, Trientalis, Alcea fol. rot. lacin. Alkekengi maj. fl. & fr. verticill. Amaranth. maj. pan. vir. *ſpicat. ſeric.* Aſparagus ſativ. Artemiſia, Corindum Tournef. Camphora hirſ. Dipſacus fol. laciniato, Libanotis Riv. Lepidium anguſtif. Malva paluſtr. moll. & inc. Stachys alpina Serpillum hirſ. latif. Sium latif. *minim.* Semper vivum alpin. Periploca Tournef. Thalictrum prat anguſtif. Gentianella perenn. Centaureum fl. phœn. *fl. albo*, purpur. min. Nicotiana maj. latif. Petum Riv. Convolvulus min. arv. *purpur. fol. ſubrot.* indicus

indicus fl. albo p. Campanula fol. chii, *hort. fol. & fl. obl.* Stramoneum ſ. Datura, *fl. purpurante*, fructu rot. Abutilon, Sycioides americana, Solanum fruticoſum *tuberoſum*, Stellaria aquatica, Circæa Lutet. *minima*, Lapath. fol. acuto fl. aureo, *fol minus acuto*, Paſſerina, Potamogeton fol. anguſtiſſ. *gramineum*, fol. pennat. *longo ſerrat. fol.* capillac. *fol. penn. alt.* Tormentilla ſylv. Raphaniſtrum *ſeget. ſiliq. artic.* diſpermum, Raphanus maj. orbic. *maj. oblong.* Turritis leucoj. fol. Syſimbrium aquatic. raphani folio, *aquatic. fol. in prof. lac.* Eryſimum vulgare, *alterum*, Alyſſum fruticoſum, Hypopitis Riv. Linoides ſ. radiola, Knawel fol. & fl. alb. Fagopyrum vulg. erect. Agrimonia offic. *orientat.* Quinquefol. maj. rep. Arenaria paluſtris, *arvenſis*, maritima Lychnis ſylv. alba, *annua*, Tunica montana altiſſ. *ſylv. ſupina.* Amaranth. max. *max. ſem. rub.* ſylv. max. *pan. incurva*, ſimpl. panicula, Hypericum minus ſup. *villoſum erect.* elegant. non ramoſ. *aſcyron dictum*, fruticoſum, Juncus acutus pan. ſp. *alpinus, fol. rigid.* foliatus, minim. Salicaria vulg. purp. Veratrum fl. ferrugin. Tucca fruteſc. Butomus fl. roſeo. Sol fol. hydrophylli Verbeſina ſem. bi- vel tridentato fol. *fol. tripartito div.* curaſſ. Chryſanthem. arvenſe fol. glauc. Bupthalm. tan. min. Leucanthem. ſylv. tan. fol. Calend. multifl. max. *maj. polyanth.* ſativa polyanth. prolifera, *minor arv.* africana, Matricaria vulg. *fl. pleno* Millefolium, vulg. alb. *vulg. purp.* nobile Helenium offic. Aſter paluſtr. *arvenſis*, maritimus, *luteus maj.* Virgaurea Lin. fol. *canadenſis humill.* canad. hirſuta, Cyanus florid. od. turc. maj. *fl. od. turc. maj. fl. albo* luteo flore, Carduus tomentoſus, *capite rot.* Cirſium pratenſe aſphod. rad. Serratula ſylvatica Santolina fol. teretibus, *fol. obſ. virent.* Abrotanum mas ang. maj. *mas ang. min.* campeſtre caul. alb. *linifolio*, Dracunculus hortenſis, Abſinth. pontic. ſ. Roman. Carthamus offic. Hieracium ſtuticoſ. latif. *frutic. arg.* Piloſella montana hiſpida, maj. repens, Sonchus aſper non lacin. *aſp. lacin.* tingitan. *lav. lacin. latifol.* læv. lacin. fl ſulph. *lav. minor* læv. fol. integro, læv. quart. Chondrilla ſonchi folio fl. lut. Scolymus, Tagetes max. rect. fl. ſimpl. *min. fl. max.* indic. min. ſimpl. fl. *ind. min. multipl. fl. ind. min.* fl. pleno *ind. min. fl. ſer.*

ſer. hirſ. obd. ind. fl. ſimpl. Carlina acaulos maj. fl. *caulesc.* Heracantha, Scabioſa multifido folio, *ſtellata fol. lacin.* Dipſacus ſativ. *fol. laciniato*, ſylv. aut virga paſt. maj. *ſylv. cap. minore*, Echioides fl. cœrul. Scordium, Ocimum, vulg. *caryophyllat. maj.* Sclarea hiſpanica, Dracocephalon americanum, Brunella major, cœrul. magno fl. Cedronella, Moluccа lævis, Mentha paluſtr. fol. obl. Stœchas fol. ſerr. purpur. Origan. heracleotic. Nepetha, Verbena comm. Lentibularia Melampyrum criſtat. Criſta galli ang. fol. Verbaſcum mas, *nigr. fl. ex lut.* nigr. fl. alb. Veronica ang. ſcutell. *americana*, Periclymenum perfol. Pſeudo-Dictamn. Cochleata echinata, acul. ſurſ. & ſeorſ. Orchis odorata moſchata. Filix non ramoſa dentata Plantago maritima fol. gramin. Salicaria hyſſopi folio latiore.

ÆSTAS.

Gallium lut. Craſſa Rivini, *minor*, Solanum ſpinoſ. Lycopersicum Galeni, *fruct. rubr.* Vaccinium fol. buxi, Elaterium Riv. Momordica vulg. Cucumis vulg. Melo vulg. *reticulat.* Pepo oblong. *vulg.* rotund. *fr. pila palm.* fr. min. *fr. ſubrot.* turbinato, varieg. *turb. alb.* minimo, *parvo*, ovato flav. *ob. flav. alt.* ov. varieg. Melopepo clypeiform. Angaria citrull. dict. Cucurbita longa, Stellaria min. Aſcyrum exig. fol. Calcitrapa ſ. Solſtitial. fl. lut. Cerinthe fl. ex rubr. purp. Cotyledon Dioſc. *æthiopic.* Erica ſpuria. Filicula ſaxatil. non ramal. reſl. Gelſeminum Ind. tetraph. Horminum ſylv. ſalvif. min. Linum catarct. Polygonum litoreum, min. caryoph. Sideritis ſupin. Speculum fl. cœrul. Stachys arvenſ. min. Riv. Zazintha Tourneſ. Lapath. hort. fol. obl. *hort. latifol.* Plantago latiſ. glabr. *latiſ. incan.* lat. roſ. fl. exp. *roſ. fl. in ſpic.* Sanguiſorba maj. *canadenſ.* minor, Papaver hort. ſem. alb. *hort. nig. ſem.* fl. pl. viol. *fl. pl. dil. viol.* criſta fl. & ſem. alb. *triſt. fl. ex albo.* Gruinalis prat. fol. ran. *prat. max.* mont. hæmatod. *mont. hæmatod. fl. var.* pet. eleg. *pet. fuſc.* pet. nigro-fuſc. *fol. malvæ rot. id. malv. rot. fl. ped.* arvenſ. Citreum vulg. Aurant. acri med. Limon vulg. Myrtus latiſ. *anguſtiſ.* fol. minim. *Myrthus Tarent.* Moly montan. Granadilla, *fol. tricuſpidi*, Sol ampliſſ. Chryſanthemum fol. matr. *maj. fl. part. candido*, Bell. ſylv. min. *ſ. min. fl. alb.* ſyly. min. fl. purp.

hortenſ. fl. pl. mag. h. fl. pl. p. *h. fl. pl. rubro* h. fl. pl. alb. *h. prolif.* h. rubra, Jacea nig. prat. *n. ang.* latif. *alba*, Chironia Riv. Cirſium acaul. Cnicus atract. Elichryſum ſ. Stœchas, *americ.* Lactuca ſylv. alt. Scabioſa capit. glob. Sclarea Tabern. Salvia min. aurit. *non* aurita Brunella fol. lacin. fl. alb. Lamium fol. caul. amb. Beton. arv. Calamintha vulg. *pul. od.* Thymbra hiſp. Lavand. latif. *anguſtif.* fol. diſſecto, Hyſſop. off. cœr. *vulg. alb.* rub. fl. Melampyrum ſylv. *montan.* Blattaria lut. *fl. purp.* fl. albo, Scrophul. nodoſa, *aquatic. maj.* Antirrhin. vulg. *arv.* Linaria valent. *triphylla cœrul.* punita, Belatine fol. ſubrotundo, *fol. acuminato*, Beccabunga offic. *minor*, fol. obl. maj. *fol. obl. min.* Gelſemin. Cardinalis, Gladiol. germ. Ariſtolochia rot. *multiflora*, Periclymenum perfol. *virginian.* Fumaria Dioſc. Onobrychis fol. vic. Trifol. pratenſe, purp. *prat. alb.* mont. ſpic. long. *fl. alb. min.* Lagopus, Meliot. offic. *fl. alb.* fl. cœrul. *minim.* Lens vulg. *major*, Piſum maj. *umbell.* arvenſe, Lathyrus ſativ. *ſylveſtr.* latifol. *anguſtif.* ſiculus, *arvenſis*, tingitan. Aphaca Lob. Niſſolia. Vicia ſativa, *ſat. alba* Crocea Riv. *ſylvat.* fl. ochrol. *minor*, min. ſiliq. gem. Faba fl. candido, *rotunda*, Lupin. ſativ. fl. alb. *ſylv. purp.* ſylv. fl. lut. *anguſtifol.* Phaſeol. vulg. *egyptiac.* punic. fl. Fœnum græc. Falcata Riv. *incana Rib.* ſativ. fl. cœrul. Glycyrrhiza offic. Galega vulg. Anonis ſpinoſa, *ſpin. carens*, Colutea veſicar. Geniſta tinctor. *ſpart. min.* Securidaca lut. Hedyſar. clypeat. Campoid. hiſpida, *ſiliq.* Lotus corniculata, *ſiliquoſ.* Coronilla mont. *fl. varieg.* maj. Split. fl. lut. Balſamina, Aſtragalus lut. Glaux, Thlaſpid. fol. iberid. Eſula foliſequa, *rotundifol.* tenuifol. *maj.* latif. Melianth. afric. *minor*, caule craſſo Tordylium max. Cervaria Paſtinaca ſativa, ſylv. latif. Sphond. vulg. Eryngium vulg. latif. Peucedanum germ. Imperatoria, Anethum hort. Angelica ſativ. *ſylv. maj.* Incida, *tenuifolia*, Laſerpitium fol latior. *minus*, Scandix ſem. roſtr. Echinophora, fl. magno, *ſem. mag.* ſem. parvo, Caucalis vulg. Staphylin. *ſylv.* Meum fol. anethi, Oenanthe aquat. Falcaria, Leviſticum, Seſeli prat. Bupleurum mont. Perfoliata offic. Phelandrium, Odorata Riv. Siſarum german. Cicuta maj. Cicutaria Riv. Aniſum, Coriandrum maj. Pimpinella ſaxifraga Cordamind. maj. *min.* Geran. cicutæ fol. *afrisan. arb.* afr. alchim.

chim. *triſte* afr. max. *batrachoid. fl. ſang.* Viola tricolor, *bicolor arb.* Reſeda vulg. *fol. calcitr.* Laureola herba, Napellus fl. cœrul. Delph. ſeget. *elat.* vulgare, *hortenſe*, Orchis palm. prat. max. *fl. viridi.* Triticum hybern. *ſpic. mult.* typhin. Secale hybern. *polyſtichum*, Avena vulg. *elatior*, ſem. nigro, Milium ſem. lut. *albo*, nigro, Panicum germ. *vulgare* ſpic. mult ariſt. *ſ. ſp. ſimpl.* v. ſp. ſimpl. molli, *maritim.* Gram. loliac. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. *latifol.* ſecalin. prat. *ſpicat. ſpart.* ſpic. ſem. mil. *ſpic. ſpic. cylindr. long.* ſpic. ſpic. cyl. ten. 2. *anthoxant.* panicul. latif. *p. m.* p. ſp. craſ. *p. aquat.* pratenſe 1. 2. 3. 4. 5. 6. *xerampel.* canin. *panic. eleg.* pan. mil. *aquatic.* 1. 2. *p. arud.* 1. 2. pan. locuſt. max. *p. min. loc.* capillat. *ſegetum* Arundo vulg. *indica*, Cyperus rot. Scirpus pal. *equiſeti cap.* omn. min. 1. 2. Cyperoid. anguſtif. *ſpica pend.* Carex mont. *polyſtach.* Spargan. ram. *non ram.* minim. Mays gr. aut. Lacryma jobi Merculialis teſtic. *ſpicata*, Urtica urens max. *min.* pil. fer. *pilulifera* Cannabis ſativa, eretica, Lupul. mas, *fœmina* Ricinus vulg. Chenopod. pes anſerin. 1. 2. *fol. ſinuat.* fœtidum, *anguſtifol.* fol. latin. *beæ fol.* ſuaveolens, 1. 2. *linifol.* annuum, Blitum alb. Herniaria glabra, Atriplex hort. 1. 2. *latifol.* maritima, *auguſto folio*, fol. haſtato, ſylv. fr. roſ. Beta alba, *rubra* 1. 2. Thelypteris 1. 2. Filix ſaxat. ram. *ſax. cornic.* Polypodium Spicant. Phyllitis, Aſplenium, Muraria, Lycopod. ſabinæ fac. Muſcus ſquamoſ. fr. hypoph. Jungermannia nemoroſa, fol. ſubrot. 1. 2. ſylvatica, Lichen petræus, minim. *cruſtaceus* 1. 2. cruſtæ modo arb. ad. 1. 2. *pulmonar.* 1. 2. pyxidat. *cinerus arb.* cin. latif. Fungus lamellat. 1. 2. *eſculento fim.* capreolin. *echinatus* 1. 2. ramoſus. Fungoides coccin. 1. 2. peziza Lycoperdum max. *capite cylindr.* ſanguin. *bulgare*, pyriforme, *verrucoſum.* Agaricus ped. equini facie, *auriculæ forma*, varii coloris, *lich. facie*, foliatus, *digitat. maj.* min. Algæ ſpecies.

AVGVSTVS.

Sambucus racemoſa, Tormentilla fad. rep. Aſter ramoſ. ann. Canna Indica fl. lut. Coralloides & ejus ſpec. Dictamnus cret. off. Hæmanthus Jacea auſtriaca III. Cluſ. Leucanth. fl. bellid. Lampſana ſylv. elat. Lagopus capit. rubr. Nymphoides Tourn. Nerion fl. rubro pl. *flore alb.* Natrix. Virga aur. ang. *virgin. ann.* Fagopyrum ſcandens. Parnaſſia

Tournef. Sol. altiſſ. virg. aur. Aſter atticus cœrul. *novæ Angliæ*, anguſtifol. *canadenſ.* autumnalis virginianus, Virgaurea ſ. Doria, Majorana vulgar. Euphraſia offic. *ramoſa* 1. 2. Orchis ſpiralis alb. Gramen dactylon rad. rep. *anguſtif.* Indicum, *paniculat. autumn.* 1. 2. Cyperus minim. 1. 2. Fungus poroſ. max. Trigloch. marit.

SEPTEMBRIS.

Gentianella cœrulea oris piloſ. *autumnal. annua*, Gentiana anguſtif. autumn. Crocus ſativus, Colchicum. comm. Frangula Dodon. Amaranthoid. Ind. fol. ocym. Apios amer. Cornut. Sol altiſſ. rad. tuberoſa, Fungoid. vulgatiſſ. *peziza dict.*

ERRATA.

Pag. 9. lin. 12. leg. anguſtif. & lin. 31. Lappula p. 17. lin. 13. l. Camburg & penult. l. darauf p. 19. lin. 5. l. Syringa p. 27. lin. 22. l. folio p. 30. lin. 20. l. Goſſypium p. 37. lin. 17. l. purpureis, p. 47. lin. 18. l. baſi, & lin. 35. l. offic. p. 51. lin. 20. l. Lauteolas, p. 55. lin. 9. l. rhabarbaro, p. 63. lin. 9. l. Helck-Kraut p. 76. lin. 35. l. ſucco p. 77. lin. 17. l. lilitoreum p. 83. lin. 34. l. Myoſurus, p. 98. lin. ult. l. mire, p. 139. lin. 4. l. foliis, p. 144. lin. 14. l. nec. p. 148 lin. 20. l. Helffta, p. 154. lin. 8. l. metis, p. 167. lin. 11. l. Lactucke, p. 172. lin. 20. l. forſan, p. 178. lin. 7. l. Schlaff-Kraut, p. 181. lin. 22. eſt ſuperflua, p. 208. lin. 24. poſt confricantium adde: cruentant p. 268. lin. 27. l. Alber-Knöpffe, p. 277. lin. 1. l. papicolarum & lin. 2. l. Salvatoris, p. 303. lin. 5. l. candidiſſimus p. 304. lin. 15. l. Fungus, p. 305. lin. 6. l. polyglottum.

Reliqua B. L. corriget & excuſabit.

Nachricht an den Buchbinder.

I. Die Tabelle muß vor pag. 1. kommen.
II. Das Kupffer Num. I. ad pag. 210.
III. = - - - - = II. ad pag. 238.
IV. = - - - - = III. ad pag. 308.